

Cycocel[®] 750

AUGIMO REGULIATORIUS

Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l (65,8%)
Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

Cycocel 750 – sisteminio veikimo augimo reguliatorius žieminiams kviečiams, rugiams, kvietrugiams, vasariniams kviečiams, avižoms ir raudoniesiems eraičiams (*Festuca rubra*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui



PAVOJINGA

Kenksmingas susilietus su oda.

Toksiškas prarijus.

Gali ėsdinti metalus.

Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Saugoti nuo vaikų.

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Prarijus, nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba 8 687 53378

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

Pakuotė: 10 l
Registracijos numeris: AS2-41AR(2019)
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

Užregistravo: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210 74 50

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Cycocel 750 yra augimo regulatorius, pasižymintis sisteminiu veikimu, naudojamas kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, raudonuosiuose eraičinuose. Apdorojus javus Cycocel 750, sustorėja stiebo sienelės, sutrumpėja ir sustiprėja apatiniai tarpbambliai, trumpėja šiaudo ilgis ir javai tampa atsparesni išgulimui bei sunkiau pažeidžiami stiebalūžės sukėlėjų. Jis taip pat padidina šaknų sistemos apimtį, o tai užtikrina geresnį maisto medžiagų ir dirvos drėgmės įsisavinimą. Cycocel 750 pagerina krūmijimąsi, padidina produktyvių stiebų skaičių. Sutrumpėjus stiebui, javai mažiau išgula, lengvesnis tampa derliaus nuėmimas, mažėja džiovavimo išlaidos, gerėja kokybė ir didėja derlius.

Suvėlinus purškimą žieminiuose kviečiuose, naudokite mažiausias rekomenduojamas normas. Nerekomenduojame naudoti Cycocel 750 vėlesniuose kaip antro bamblio tarpsniuose. Nepatartina Cycocel 750 naudoti netrėštuose ir blogai besivystančiuose pasėliuose ar lengvuose priesmėlio dirvožemiuose.

AUGALAI IR NORMOS

Žieminiai kviečiai

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha Cycocel 750 purškama krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai kviečiai

Norma: 0,8-1,25 l/ha Cycocel 750 purškama krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Žieminiai rugiai

Norma: 1,0-2,0 l/ha Cycocel 750 purškama krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32). Didžiausią normą naudokite aukštaūgėse rugių veislėse ir gerai įtrėštuose, turtinguose maisto medžiagomis dirvožemiuose. Lengvose, mažai trėštose dirvose ir žemaūgėse rugių veislėse naudokite mažiausią normą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Žieminiai kvietrugiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Cycocel 750 purškama krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vasariniai miežiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Cycocel 750 purškiama krūmijimosi viduryje – bamblėjimo pradžioje (BBCH 25-32). Vasariniuose miežiuose Cycocel 750 netrumpina stiebo ir neapsaugo nuo išgulimo! Jis tik pagerina krūminimąsi ir šaknijimąsi. Kad miežiai neišgultų, bamblėjimo tarpsnyje (BBCH 32-39) naudojamas augimo reguliatorius Terpal.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Avižos

Norma: 1,0 – 1,5 l/ha Cycocel 750 purškiama bamblėjimo pradžioje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 30-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Pastaba: naudojant vėliau nei antro bamblio tarpsnyje Cycocel 750 gali smarkiai pažeisti avižas.

Raudonieji eraičinai (*Festuca rubra*)

Norma: 1,2 – 2,0 l/ha Cycocel 750 purškiama krūmijimosi viduryje – iki antro bamblio tarpsnio (BBCH 25-32).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha.

Tirpalo paruošimas

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švairiu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Cycocel 750, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas turi būti sunaudojamas iškart pat po jo paruošimo!

Maišymas

Dėl maišymo su kitais produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Purškimas

Cycocel 750 galima naudoti, kai vidutinė paros temperatūra siekia +5° C. Geriausiai Cycocel 750 veikia, kai yra geros augimo sąlygos (šilta, pakankamai drėgmės, o vidutinė paros temperatūra siekia +8 - 10° C). Nerekomenduojama purkšti, jei prognozuojamos šalnos, iškart po šalnų, po stiprių liūčių ir vėjo ar tais atvejais, kai yra pažeistas augalų vaškinis sluoksnis. Po purškimo 1-2 valandas turėtų nelyti.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Varpinės žolės

Purškiant javus su varpinių ir ankštinių žolių išėliu, jokios neigiamos įtakos išėliui nepastebėta.

Naudojant priešvarputinius herbicidus, tokius kaip Focus Ultra, darykite vienos savaitės pertrauką prieš naudojant Cycocel 750.

Sėjomaina

Po Cycocel 750 panaudojimo, nuėmus derlių, galima auginti bet kokius augalus.

Jeigu po Cycocel 750 panaudojimo augalus tenka atsėti, 8 savaites negalima sėti salotų, dobilų arba saulėgrąžų.

Sandėliavimas

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 2 metus ir ilgiau. **Dėmesio!** Cycocel 750 ardo aliuminį. Vengti kontakto su šarmais.

Saugos priemonės

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pirmoji pagalba

Suteikiant pirmąją pagalbą laikytis atsargumo priemonių. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, paguldyti į stabilią padėtį. Užterštus drabužius nuvilkti nedelsiant.

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 15 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (200-300 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Gamintojo atsakomybė

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

® BASF registruotas prekės ženklas