

QUICK 5% EC

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga - kvizalofop-P-etilas, 50 g/l (5.3 %).

Koncentruota emulsija.

Quick 5% EC - sisteminio veikimo ariloksifenoksiopropionatų grupės herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių bei pašarinių runkelių, saulėgražų, sojų, burokėlių, morkų, gumbinių salierų, valgomųjų krienų, bulvinių saulėgražų (topinambų), paprastųjų pastarnokų, valgomųjų ridikų, griežčių, ropių, svogūnų, česnakų, Shallot svogūnų, salotų, japoninių garstyčių, gražgarsčių, pupelių, lęšių, sėjamųjų avinžirnių, lubinų pasėliuose, taip pat kriaušių, svarainių soduose.

Quick 5% EC paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui saulėgražų, sojų, burokėlių, morkų, gumbinių salierų, valgomųjų krienų, bulvinių saulėgražų (topinambų), paprastųjų pastarnokų, valgomųjų ridikų, griežčių, ropių, svogūnų, česnakų, Shallot svogūnų, salotų, japoninių garstyčių, gražgarsčių, lęšių, sėjamųjų avinžirnių, lubinų pasėliuose, taip pat kriaušių, svarainių soduose **registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.**

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGAS

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

Neskatinti vėmimo.

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Laikyti užrakintą.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

Pakuotė: 5 l.

Registracijos Nr. 0464H/13

Partijos Nr. žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas:

SHARDA EUROPE b.v.b.a.

Jozef Mertensstraat 142,

1702 Dilbeek

Belgija

Tel. +32(0)2 466.44.44

Faks. +32(0)2 463.36.58

Platintojai:

AB „Kauno Grūdai”

H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550, Kaunas

Tel.: +370 37 223317, Faks.: +370 37 223305,

El.paštas: info@kggroup.eu

UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6,

LT-57234, Kedainiai,

Lietuva,

Tel/fax: (8 347) 41551

UAB „Agrochema”

Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r.

Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:

info@agrochema.lt www.agrochema.lt

AB ”Linas Agro”

Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva

Tel.: +370 45 507354

Faks.: +370 45 507351 www.linasagro.lt

UAB “Agrokoncernas”,

Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas;

Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244;

el. paštas: info@agrokoncernas.lt

UAB “Baltic Agro”
 Ukmergės g.322,
 LT-12106 Vilnius
 Tel.: 8 5 2701187
 el. paštas: biuras@balticagro.lt

UAB “Agrodema”
 Žirmūnų g. 139
 LT-09120 Vilnius, Lietuva
 Tel.: +370 52402291
 info@agrodema.lt
 www.agrodema.lt

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Quick 5% EC – sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir vienamečių vienaskilčių piktžolių (išskyrus vienmetę miglę) naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, cukrinių bei pašarinių runkelių, saulėgrąžų, sojų, burokėlių, morkų, gumbinių salierų, valgomųjų krienių, bulvinių saulėgrąžų (topinambų), paprastųjų pastarnokų, valgomųjų ridikų, griežčių, ropių, svogūnų, česnakų, Shallot svogūnų, salotų, japoninių garstyčių, gražgarsčių, pupelių, lešių, sėjamųjų avinžirnių, lubinų pasėliuose, taip pat kriaušių, svarainių soduose. Herbicidas veikia piktžoles daugiausiai per lapus, todėl yra naudojamas jau sudygusioms piktžolėms naikinti. Veiklioji medžiaga greitai įsiskverbia į lapus ir su augalų sultimis pernešama į meristemą, kur stabdomas tolimesnis augalo vystymasis. Veiksmingumas pastebimas praėjus 10–14 dienų po nupurškimo **Quick 5% EC**. Jo veiksmingumą lemia aukštesnė oro temperatūra ir didesnė santykinė oro drėgmė. Piktžolės pabala, paskui pagrindiniai ūgliai pamažu žūva (tampa lengvai ištraukiami).

Quick 5% EC veiksmingumas nuo dirvos tipo nepriklauso. Dėl sisteminio poveikio veiklioji medžiaga veikia ir pernešta į daugiamečių žolių po žeme esančius audinius, neleidžia augalams atželti. Palankios sąlygos (šiluma ir oro drėgmė) spartina augalų žūtį.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai ir vasariniai rapsai:

Normą 1,0-1,5 l/ha - visų rūšių javų pabiroms, vienaskiltėms vienmetėms piktžolėms tokioms kaip pelinis pašiaušėlis (*Alopecurus myosuroides*), dirvinė smilguolė (*Apera spica-venti*).

Normą 2,0-2,5 l/ha - paprastajam varpučiui.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l/ha.

Quick 5% EC naudoti reikia tada, kai dauguma piktžolių jau yra sudygusios. Rekomenduojama žieminius ir vasarinius rapsus, kai vienametės vienaskiltės piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsniuose (BBCH 12–29), paprastieji varpučiai yra 10-15 cm aukščio iki tol, kol kultūriniai augalai uždengia piktžoles, ir herbicidas ant jų nebegali patekti. Pasėliui apdoroti naudojama įprastinė purškimo technika.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Lietus, praėjus 2 val. po panaudojimo neigiamos įtakos produkto veiksmingumui nebeturi. Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo yra 90 dienų

Cukriniai ir pašariniai runkeliai:

Norma 2,0 l/ha.

Purškama, nuo pirmųjų lapelių išsiskleidimo iki 4 tikrųjų lapelių tapsnio, (BBCH 11-14), kai piktžolės dviejų lapelių –krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–300 l /ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Saulėgražos:

Norma 2,0 l/ha.

Purškama, nuo pirmųjų lapelių iki 6 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 10–16), kai piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l /ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Soja:

Norma 2,5 l/ha.

Purškama, nuo pirmųjų lapelių tarpsnio iki kol pasimato pirmasis vegetatyvinis šoninis ūglis (BBCH 11–21), o piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l /ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Burokėliai:

Norma 2,0 l/ha.

Purškama, nuo pirmųjų lapelių išsiskleidimo iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 11–39), kai piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–400 l /ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Morkos, gumbiniai salierai, šakninės petražolės, valgomieji ridikai, pastarnokai ir valgomieji krienai:

Norma 2,0 l/ha.

Purškama nuo pirmųjų lapelių iki kol šaknis pasiekia būdingą formą ir dydį (BBCH 11–49), o piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 40 dienų.

Bulvinės saulėgražos:

Norma 2,0 l/ha.

Purškama nuo pirmojo lapelio iki 9 ir daugiau pastebimai pailgėjusių tarpubamblių (BBCH 10–39), kai piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.
 Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 Karencijos laikotarpis 45 dienų.

Griežčiai:

Norma 2,0 l/ha.
 Purškti nuo pirmo lapelio iki tarpuvagių uždengimo (BBCH 12-39), piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.
 Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.
 Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 Karencijos laikotarpis 40 dienų.

Ropės:

Norma 2,0 l/ha.
 Purškiama nuo pirmo lapelio iki kol šaknis pasiekia būdingą formą ir dydį (BBCH 10-49), o piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.
 Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.
 Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 Karencijos laikotarpis 40 dienų.

Svogūnai, česnakai, Shallot svogūnai:

Norma 1,75 l/ha.
 Purškiama, nuo visiškai matomo pirmojo lapelio tarpsnio iki kol matomi 9 ar daugiau lapelių (BBCH 11–19), kai piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.
 Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.
 Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 Karencijos laikotarpis 42 dienų.

Salotos, gražgarstės, japoninės garstyčios:

Norma 2,0 l/ha.
 Purškiama kai visiškai išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai iki kol jaunesni lapai nebesiskleidžia (BBCH 12-39), o piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.
 Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l /ha.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.
 Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
 Karencijos laikotarpis 28 dienų.

Pupelės:

Norma 2,0 l/ha.
 Purškiama, kai visiškai išsiskleidę 2 tikrieji lapeliai iki devynių ir daugiau pastebimai pailgėjusių tarpubamblių (BBCH 12-39), o piktžolės yra dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.
 Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 49 dienos.

Lėšiai:

Norma 2,0 l/ha.

Purškiama, nuo pirmųjų lapelių išsiskleidimo iki žydėjimo pradžios (BBCH 11–59), kai piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 49 dienos.

Avinžirniai:

Norma 2,5 l/ha.

Purškiama, kai augalai turi 2 lapelius iki devynių ir daugiau pastebimai pailgėjusių tarpubamblių (BBCH 12-39), o piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 49 dienos.

Lubinai:

Norma 2,0 l/ha.

Purškiama, nuo pirmųjų lapelių išsiskleidimo iki žydėjimo pradžios (BBCH 11–59), kai piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 49 dienos.

Kriaušės, svarainiai:

Norma 2,5 l/ha.

Purškiama, kai vaisiai pasiekia pusę savo veislei būdingo dydžio iki brendimo pradžios, kai atsiranda veislei būdinga spalva (BBCH 75-81), o piktžolės dviejų lapelių–krūmijimosi tarpsnyje.

Paprastojo varpučio naikinimui purkšti, kai paprastieji varpučiai yra 10–15 cm aukščio.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 300–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Karencijos laikotarpis 35 dienos.

PASTABOS

Daugelis kultūrinių augalų yra jautrūs herbicidui, todėl purkšti reikia taip, kad tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.

Vengti purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose, traktoriaus sustojimų purškimo metu.

SĖJOMAINA

Vegetacijos metu produktas greitai suskyla dirvoje, todėl jis nesukelia jokio pavojaus kitais metais auginamiems augalams. Visus žemės ūkio augalus galima auginti praėjus 4 savaitėms po panaudojimo.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Kvizalofop-P-etilas arba kitos tos pačios cheminės grupės veikliosios medžiagos (ariloksifenoksiipropionatų cheminė grupė – HRAC grupė 1), kurių veikimas yra nukreiptas į augalų Acetil CoA karboksilazės fermento slopinimą, tuose pačiuose laukuose yra naudojamos daugelį metų, todėl gali išsivystyti šioms medžiagoms atsparūs biotipai.

Atsparumo išsivystymo galima išvengti arba bent jau jį sulėtinti naudojant tinkamas žemės dirbimo priemones bei šį produktą keičiant kitaip veikiančiais herbicidais arba maišant su produktais, kurių veikimo principas yra kitoks. Todėl ariloksifenoksiipropionatų cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš naudojimą produktą reikia gerai suplakti pakuotėje. Į purkštuvą pripilti pusę purškimui skirto vandens ir įjungti maišyklę. Reikiamą produkto kiekį supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Supilti likusį vandenį ir vėl išmaišyti. Tuščias pakuotes tris kartus išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. Paruoštą tirpalą būtina išpurkšti nedelsiant. Jei purškimo metu daromos pertraukos, prieš imantis darbo iš naujo, reikia kruopščiai išmaišyti tirpalą purkštuve.

MAIŠYMAS

Dėl Quick 5% EC maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į produkto platintoją/us arba registracijos savininką.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Dėl ypatingai didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems Quick 5% EC kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą. Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu ir tam skirtomis plovimo priemonėmis.

LAIKYMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, temperatūroje, atokiau nuo maisto produktų, pašarų, elektros prietaisų, atviros ugnies, tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo šalčio. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo ($\geq 0,4$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio. Esant pavojui jų įkvėpti, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančias standartą LST EN 14387).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į apdorotus plotus būtina mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PRIŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, alkoholiams atsparios putos, anglies dioksidas (CO₂), sausi milteliai. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugantį kostiumą ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: Specifiniai apsinuodijimo požymiai nežinomi. Priešnuodžio nėra.

Veiklioji medžiaga kvizalofop-P-etilas priklauso ariloksifenoksiopropionatų cheminei grupei.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

® - registruotas Sharda Cropchem Limited Ltd.