

**REGISTRUOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI, KURIŲ VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS NURODYTOS REGLAMENTO (EB)
NR.2021/1165 I PRIEDE DĖL JŲ TINKAMUMO NAUDOTI EKOLOGINĖJE ŽEMDIRBYSTĖJE**

Insekticidai

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas, būdai	Paskutinis apdoravimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Naudojimo apribojimai
1. NeemAza T/S Trifolio M GmbH AS2-52I(2016) 2025-08-31	Azadirachtinas A 10 g/l	2,5	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	4	2	
		3,0	Vaistiniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,5–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu iki visiškos brandos tarpsnio (BBCH 89)	14	4	
		3,0	Prieskoniniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,4–0,6 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	14	3	Nenaudoti laiškiniams česnakams.
		2,0–3,0	Pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, baklažanai, moliūgai, auginamiems šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,3 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu	3	3	
		3,0	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	0,15 proc. tirpalu purkšti vegetacijos metu		4	Nenaudoti dekoratyviniams spygliuočiams.
		3,0	Obelys	Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai	Purkšti vegetacijos metu iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69)		4	

2. Fibro Belchim Crop Protection NV 0465I/13 2026-08-15	Parafino aliejus 797 g/l	10	Bulvės	Amarai, kaip virusų pernešėjai	Purkšti vegetacijos metu		8	Pakuotė: 5 l, 20 l.
		20-30	Obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos	Rausvosios sodinės erkės	Purkšti vegetacijos metu		1	
		20-30	Kriaušės	Kriaušinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu		Jeigu purškiam a 2 kartus naudoti 20 l/ha	
		10	Šilauogės	Amarai, skydamariai, erkės, pumpurinės erkės, sodinės erkės	Purkšti pavasarį nuo pumpuro srogimo pradžios (matomos pirmos lapų viršūnėlės) iki pirmieji žiediniai pumpurai atsiskiria nuo ištįsusios skrotelės (BBCH 07-57) arba rudenį prasidėjus senėjimo tarpiniui iki nukrenta visi lapai (BBCH 90-97)		2	
3. Pygrain New Newpharm S.r.l. AS2-48I(2023) 2027-06-15	Piretrinai 18,61	50 – 67 ml/t	Sandėliuojami grūdai (kviečiai, spelta kviečiai, kvietrugiai, ryžiai, kukurūzai, miežiai, avižos, rugiai, sorgai)	Mažasis buožiaūsis milčius, aruodinis straubliukas, grūdinis gaubtavabalis	Apdoroti grūdus sandėliuose		1	Grūdus galima naudoti praėjus 2 dienoms po apdoravimo

Augalų augimo inhibitoriai

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami augalai	Apdoravimo laikas	Paskutinis apdoravimo terminas iki naudojimo	Didžiausias apdoravimų skaičius	Naudojimo apribojimai
---	---	-----------------	--------------------	-------------------	--	---------------------------------	-----------------------

laikas								
1.	Argos Arysta LifeScience Benelux sprl AS2-35AI(2022) 2025-07-31	Apelsinų aliejus 843,2 g/l	100 ml/t	Bulvėms (maistinėms ir skirtoms krakmolui) profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose)	Apdoroti sausas bulves praėjus 30 dienių po derliaus nuėmimo ir prieš pasirodant pirmiesiems dygimo požymiams	-	9	Apdoravimo metu laikymo patalpose neturi būti žmonių. Apdoravimo metu ir mažiausiai 24 valandas po apdoravimo visi patalpų įėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl įeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdoravimo ir dar 0,5 valandos, kol patalpos vėdinamos. Nenaudoti sėklinėms bulvėms.
2.	Biox-M Xeda International S.A. AS2-40AI(2020) 2027-01-31	Šaltmėčių aliejus 948 g/l	390 ml/t. Pirmą kartą purškiama 90 ml/t praėjus 6–15 dienių po derliaus nuėmimo, vėliau 10 kartų po 30 ml/t.	Bulvėms profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose)	Praėjus 6–15 dienių po derliaus nuėmimo, bulvės apdorojamos saugojimo metu	12 dienų	11	Apdoravimo metu laikymo patalpose neturi būti žmonių. Apdoravimo metu ir mažiausiai 24 valandas po apdoravimo visi patalpų įėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Laikymo patalpos turi būti paženklintos įspėjamąja informacija. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdoravimo. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl įeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos. Nenaudoti sėklinėms bulvėms, nesandėliuoti sėklinių bulvių patalpose, kuriose anksčiau buvo naudojamas Biox-M.

Beicai

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/t, l/t	Apdorojami augalai	Ligos, kenkėjai	Apdoravimo būdai
1.	Integral Pro BASF UAB AS2-62BB(2019) 2027-09-16	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600 6,8 proc.	1,6	Žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsukai	Fomozė, skatina natūralią apsaugą nuo spragių	Beicuoti naudojant 1,6–5 l/t tirpalo

Fungicidai

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma (kg/ha, l/ha)	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Ligos	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis)	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	VitiSan Andermatt Group AG AS2-61F(2021) 2037-10-31	Kalio hidrokarbonatas 994,9 g/kg	2,5 kg/ha 1 metro lajos aukščio	Obelys, kriaušės, svarainiai	Rauplės, vaisių puvinys	Nuo rauplių purkšti, kai atsiskiria pirmieji lapai iki kol vaisiai įgauna jiems būdingą spalvą (BBCH 10–85), nuo vaisių puvinių purkšti, kai vaisių dydis apie 40 mm iki visiškos vaisių brandos – vaisiai tinkami skinti (BBCH 74–87)	1	6	Jautrioms veislėms gali atsirasti pažeidimų ant vaisiaus odelės, todėl rekomenduojami purškimai mažame plote. Nemaišyti su vario turinčiais preparatais.
			2,5 kg/ha 1 metro lajos aukščio	Juodosios aronijos	Rauplės, uogų puvinys	Nuo rauplių purkšti, kai atsiskiria pirmieji lapai iki kol uogos įgauna jiems būdingą spalvą (BBCH 10–85), nuo uogų puvinių purkšti, kai uogų dydis apie 40 mm iki visiškos vaisių brandos – vaisiai tinkami skinti (BBCH 74–87)	1	6	Jautrioms veislėms gali atsirasti pažeidimų ant vaisiaus odelės, todėl rekomenduojami bandomieji purškimai mažame plote. Nemaišyti su vario turinčiais preparatais.
			3,0 kg/ha	Vynuogės	Tikroji miltligė	Purkšti, kai išsiskleidžia antrasis lapas iki žydėjimo pradžios	1	6	

					(BBCH 12–61)			
			6,0 kg/ha	Vynuogės	Tikroji miltligė	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61–71)	1	6
			9,0 kg/ha	Vynuogės	Tikroji miltligė	Purkšti nuo uogų vystymosi pradžios iki uogos yra žirnio dydžio, formuojasi kekės (BBCH 71–75)	1	6
			12,0 kg/ha	Vynuogės	Tikroji miltligė	Purkšti, kai uogos yra žirnio dydžio, formuojasi kekės iki uogų brandos (BBCH 75–85)	1	6
			5,00 kg/ha	Braškės lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59–89)	1	6
			5,00 kg/ha	Gudobelės, cidonijos, raugerškiai, mėlynės, spanguolės, šilauogės, serbentai, šaltalankiai, šėivamedžiai, agrastai	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59–89)	1	6
			5,00 kg/ha	Avietės, gervuogės lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 59–89)	1	6
			3,00 kg/ha	Salotos, cikorijos lauke ir šiltnamiuose	Tikroji miltligė	Purkšti nuo tikrojo lapo tarpsnio iki kol pasiekama tipinė lapų masė (BBCH 12–49)	1	10

			2,5 kg/ha (kai augalo aukštis iki 50 cm)	Ankštinės pupelės (lauke ir šiltnamiuose) , pomidorai šiltnamiuose, baklažanai šiltnamiuose, agurkai šiltnamiuose, cukinijos šiltnamiuose, melionai šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedpumpurių tarpsnio (BBCH 51)	1	6	
			3,75 kg/ha (kai augalo aukštis 50– 125 cm)	Ankštinės pupelės (lauke ir šiltnamiuose) , pomidorai šiltnamiuose, baklažanai šiltnamiuose, agurkai šiltnamiuose, cukinijos šiltnamiuose, melionai šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedpumpurių tarpsnio (BBCH 51)	1	6	
			5,00 kg/ha (kai augalo aukštis daugiau kaip 125 cm)	Ankštinės pupelės (lauke ir šiltnamiuose) , pomidorai šiltnamiuose, baklažanai šiltnamiuose, agurkai šiltnamiuose, cukinijos šiltnamiuose, melionai šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedpumpurių tarpsnio (BBCH 51)	1	6	
			5,00 kg/ha	Agurkai, cukinijos,	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedpumpurių	1	6	

				moliūgai lauke		tarpsnio (BBCH 51)			
			5,00 kg/ha	Smidrai lauke	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti jaunus augalų plotus ir derančius laukus po derliaus nuėmimo		6	
			5,00 kg/ha	Svogūnai, laiškiniai svogūnai, česnakai, tuščialaiškiai česnakai lauke	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti jaunus augalų plotus ir derančius laukus po derliaus nuėmimo		6	
			2,5 kg/ha (kai augalo aukštis iki 50 cm)	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius		10	
			3,75 kg/ha (kai augalo aukštis 50–125 cm)	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius		10	
			5 kg/ha (kai augalo aukštis daugiau kaip 125 cm)	Dekoratyvini ai augalai lauke ir šiltnamiuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius		10	
			2,5 kg/ha (kai augalo aukštis iki 50 cm)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius		10	
			3,75 kg/ha (kai augalo aukštis 50–125 cm)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynuose	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius		10	
			5 kg/ha (kai augalo aukštis)	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys	Tikroji miltligė	Purkšti vegetacijos metu, profilaktiškai arba pastebėjus		10	

			daugiau kaip 125 cm)	medelynuose		pirmuosius infekcijos požymius			
--	--	--	----------------------	-------------	--	--------------------------------	--	--	--

BIOLOGINIAI PREPARATAI

	Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
1.	Dipel DF Sumitomo Chemical Agro Europe SA AS2-11I(2017) 2024-04-30	<i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> štamai ABTS-351	0,5–1,0 kg/ha	Gūžiniai kopūstai, brokoliai, briuseliniai ir žiediniai kopūstai	kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinių baltukų, ropinių baltukų lervos.	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			0,5–1,0 kg/ha	Žirniai	žirnių vaisėdžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			1,5 kg/ha	Obelys	tinkiasparnių lapsukių, obuolinių vaisėdžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus
			0,5–1,0 kg/ha	Kmynai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	kmyninių kandžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			0,5–1,5 kg/ha	Šaltalankiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	šaltalankinių musių, neporinių verpikų lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha.	Svogūnai, česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	kopūstinių baltukų, svogūninių kandžių, minamusių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai, agurkai, šparaginės pupelės šiltnamiuose	minamusių, pelėdgalvių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	minamusių, pelėdgalvių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
2.	Integral Pro	<i>Bacillus</i>	1,6 l/t	Žieminiai ir vasariniai rapsai,	Fomozė, skatina natūralią	Beicuoti naudojant 1,6–5 l/t tirpalo

	BASF A/S AS2-62BB(2019) 2027-09-16	<i>amyloliquefacie</i> <i>ns</i> MBI600 6,8 proc.		žieminiai ir vasariniai rapsukai	apsaugą nuo spragių	
3.	Lalstop G46 WG Danstar Ferment AG AS2-70BF(2021) 2035-03-31	<i>Clonostachys</i> <i>rosea</i> J1446 900 g/kg	125–300 g/ha	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti, kai dauguma žiedų su vainiklapiais suformuoja tuščiavidurį kamuolį, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 59–73), ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,01–0,1 g/m ²	Braškės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedų atsivėrimo, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 60–73), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.
			100–1000 g/ha	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	juodasis stiebo puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.
			100–1000 g/ha	Pomidorai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.
			100–1000 g/ha	Paprikos auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki

			g/1000 augalų			išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,5–1 g/m ²	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12) ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			2-2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
			20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,01–0,1 g/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai,	šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

			saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje		
		20–25 g/1000 augalų	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai, saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje	šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.
		100–1000 g/ha	Baklažanai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos. (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.
		100 g / 30000–40000 daigų	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
		200–300 g/ha	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą.
		200–300 g/ha	Melionai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
		200–300 g/ha	Melionai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą.
		20–50 g/m ³	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
		0,5–1 g/m ²	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.
		0,05 % tirpalas	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
		2–2,5 kg/ha	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
		0,1–1	Gūžinės salotos, romaninės	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos

			kg/ha	salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje		lapų masės susiformavimo BBCH (15–49), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,5–1 g/m ²	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingo gūžės dydžio, formos ir kietumo BBCH (15–49), ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,3–0,4 kg/ha	Lapinės salotos, gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami lauke	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 2 kartus.
			20–50 g/m ³	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,5–1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–25 g/1000	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp.,	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo iki būdingos lapų masės susiformavimo

		augalų, 5 augalai/m ²	šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	(BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
		0,01–0,1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
		20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
		pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.
		20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.
		0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
		0,05 % tirpalas	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

		20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, kai išsiskleidę 9 ir daugiau lapų (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 2 kartus.
		20–50 g/m ³	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sodinant (BBCH 00), įterpiant į vazoną ar substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
		50–100 g/10 m ²	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Rhizoctonia spp.)	Nuo tarpsnio, kai lapų viršūnėlės viršija žvynelius iki išsiskleidžia trečiasis lapas (BBCH 09–13), ne daugiau kaip 1 kartą.
		20–25 g/1000 augalų	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki stolonų ir jaunų augalų vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
		12,5 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą.
		0,05 % tirpalas	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
		20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios (BBCH 10–61) ne daugiau kaip 2 kartus.
		12,5 g/1000 augalų	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą.
		0,05 % tirpalas	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
		25–30 g/1000 augalų	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki ūglių vystymosi pradžios (BBCH 10–31) ne daugiau kaip 2 kartus.
		200–300 g/ha	Avietės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo tarpsnio, kai daugelis lapų yra išsiskleidę iki uogų byrėjimo tarpsnio (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.
		0,05 % tirpalas	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
		25–30	Gervuogės ir avietės auginamos	stiebo ir pašaknio puvinys	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4

			g/1000 augalų	lauke ir tuneliuose	(Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.
			300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo pirmųjų žiedų atsivėrimo iki uogos pradeda kristi (BBCH 60–89), ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,05 % tirpalas	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.
			25–40 g/1000 augalų	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.
			300–400 g/ha	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki daugelis uogų įgauna būdingą spalvą (BBCH 60–85), ne daugiau kaip 3 kartus.
			300–400 g/ha	Serbentai auginami lauke	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško sužydėjimo (BBCH 60–65), ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,05 % tirpalas	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1-2 kartus.
			300–400 g/ha	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnių pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.
			0,5–1 g/m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos derlingųjų vegetatyvinių augalo dalių vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 4 kartus.
			0,1–1 kg/ha	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos / vaisiai pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.

				kopūstai auginami šiltnamyje		
			50–100 g/100 m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	šaknų gumbas (Plasmodiaphora brassiceae)	Naudoti prieš pat daigų persodinimą, nuo trijų lapelių iki penkių lapelių tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			300–400 g/ha	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	šaknų gumbas (Plasmodiaphora brassiceae)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po persodinimo (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 2 kartus.
			0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo arba persodinimo metu, nuo trečiojo iki penktojo matomo lapelio tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo matomų devynių ir daugiau lapelių tarpsnio (BBCH 19), ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–50 g/m ³	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,5–1 g/m ²	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.
			20-25 g/1000 augalų	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki lapai visiškai sunyksta, ropelės visiškai sausos (svogūnams, česnakams) / būdingo stiebo dydžio susiformavimo (porams) (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo, ne daugiau kaip 1 kartą.
			200–300 g/ha tunelyje ir šiltnamyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo lapo pagrindo storėjimo iki svogūnėlis ar stiebas pasiekia 50 % laukiamo dydžio (BBCH 41–45), ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui, sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

				spp.)		
			0,01–0,1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki visiškos brandos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.
			20–50 g/m ³	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją, įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,5–1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti persodinimo metu, nuo sudygimo iki išsiskleidusių penkių lapelių (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki būdingo lapkočio dydžio susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,4 g/l tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos šiltnamyje	juodasis puvinys (Thielaviopsis basicola)	Naudoti po derliaus nuėmimo, prieš atžėlimą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			0,2–0,4 g tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos šiltnamyje	juodasis puvinys (Thielaviopsis basicola)	Naudoti prieš augimo skatinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			300–400 g/ha	Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, šakninės petražolės auginamos lauke	fuzariozė, rizoktoniozė (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Purkšti nuo sėjos iki išsiskleidusių devynių ir daugiau lapelių (BBCH 00–19), ne daugiau kaip 2 kartus.
			300–400 g/ha	Žaliosios pupelės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo trijų tikrųjų lapelių išsiskleidimo iki stiebo augimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 2 kartus.
			20–50 g/m ³	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama prieš sodinimą, įterpiant į dirvą / substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.
			50–100 g/100 m ²	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama sodinimo metu, nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus.

			300–500 g/ha	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjainukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purškama nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus.
			100–1000 g/ha	Obelys	obelų paprastasis vėžys (<i>Neonectria ditissima</i>)	Purškama pavasarį, nuo ramybės periodo iki žalių lapų viršūnėlės viršija pumpurų žvynus (BBCH 00–09). Rudenį purškama kai 50 % lapų pakeitę spalvą iki ramybės pradžios (BBCH 95–99), ne daugiau kaip 2 kartus.
4.	Madex Pro Andermatt Group AG AS2-62BI(2021) 2024-04-30	<i>Cydia pomonella granulovirusas</i> DSMZ GV-0013 ($\geq 3 \times 10^{13}$ viruso dalelių/l)	100 ml/ha	Obelys	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 8 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
			50 ml/ha	Obelys	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 6 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
			100 ml/ha	Kriaušės, graikiniai riešutai, svarainiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 8 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
			50 ml/ha	Kriaušės, graikiniai riešutai, svarainiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 6 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
5.	Mycostop Danstar Ferment AG AS2-42BF(2018) 2024-04-30	Streptomyces atmaina K61 32 proc. pagal masę; nominaliai 5×10^8 kfv/g produkto	2–10 g/100 m ²	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sodinukai	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Auginimo substratas sudrėkinamas, substratas mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu
			2–10 g/100 m ² lysvėse	Vaisinės daržovės (pomidorai, agurkai, paprikos)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinimo metu <i>Mycostop</i> į auginimo substratą supilamas per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.
			5–20 g/1000 augalų	Vaisinės daržovės (pomidorai, agurkai, paprikos)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinimo metu <i>Mycostop</i> į auginimo substratą supilamas per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.
			1–10 g/100 m ² lysvėse	Dekoratyviniai augalai (vazoniniai augalai, skinamos gėlės, įšaknydinti ūgliai)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Auginimo substratas sudrėkinamas, mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.
			5–20 g/1000 augalų	Dekoratyviniai augalai (vazoniniai augalai, skinamos gėlės, įšaknydinti ūgliai)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliamas šlapiasis	Auginimo substratas sudrėkinamas, mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.

					puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	
			1 g/1000 augalų	Lapinės daržovės ir prieskoninės žolelės hidroponinio auginimo sistemose	Fusarium sp., Pythium sp. ir Phytophthora sp sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinus augalus vandeninis Mycostop tirpalas supilamas į cirkuliuojantį maitinamąjį tirpalą
			2–8 g/1 kg sėklų	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklos	Fusarium sp., Pythium sp. ir Phytophthora sp sukeliamas šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklos prieš sėją sausiai apdorojamos
			1–10 g/1 m ³	Substratas, skirtas sodinukų, lapinių daržovių ir prieskoninių žolelių auginimui, įmaišant į auginimo terpę.		1–10 g/1 m ³
6.	PMV-01 De Ceuster Meststoffen NV AS2-112V(2019) 2031-08-07	<i>Pepino mozaikos viruso</i> padermės CH2 izoliatas 1906 (>5 × 10 ⁵ viruso genomo kopijų/μl)	4 arba 8 l/ha	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki pirmosios kekės žydėjimo (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. Esant didelei rizikai pomidorams būti užkrėstiems Pepino mozaikos virusu naudoti didesniąją normą.
7.	Serenade Aso Bayer AG AS2-3F(2017) 2025-08-15	<i>Bacillus subtilis</i> QST 713	8 l/ha	Braškės, auginamos lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Braškės, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 5 kartus
			1 proc. tirpalas	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Pomidorai, paprikosauginami šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sausligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus

		4-8 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Miltligė, bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Baklažanai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		10 l/ha	Morkos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Puvinys	Laistyti dirvą iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą
		8 l/ha	Morkos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Morkų alternariozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus
		8 l/ha	Porai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus
		8 l/ha	Agurkai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		1 proc. tirpalas	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
		10 l/ha	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
		3,2 l/ha	Cukinijos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		8 l/ha	Burokėliai, ridikėliai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, juodasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		1 proc. tirpalas	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami	Diegavirtė	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą

			lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)		
		10 l/ha	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
		8 l/ha	Gūžiniai kopūstai, kininiai kopūstai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, juodasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Salierai, šakninės petražolės, pastarnokai, krienai, kaliaropės, batatai, ropės, smidrai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Pankoliai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		1 proc. tirpalas	Salierai, petražolės, pastarnokai, česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė, puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
		10 l/ha	Salierai, petražolės, pastarnokai, česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė, puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
		8 l/ha	Cikorija (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		8 l/ha	Pupelės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Laiškiniai svogūnai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Lapų dėmėtligė, puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Svogūna, askaloniniai česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Lapų dėmėtligė, puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		8 l/ha	Sojos, kmynai, linai, kanapės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus

		8 l/ha	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		1 proc. tirpalas	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
		10 l/ha	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
		8 l/ha	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		1 proc. tirpalas	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
		10 l/ha	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
		8 l/ha	Vyšnios, slyvos, abrikosai, persikai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, moniliozė, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
		8 l/ha	Kriaušės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Bakterinė degligė, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus
		8 l/ha	Vynuogės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		8 l/ha	Dekoratyviniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
		8 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė, juodasis puvinys, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus

			1 proc. tirpalas	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
8.	V10 Valto B. V. AS2-17V(2022) 2033-03-29	Pepino mozaikos viruso (PepMV) kamienas VC1 (1.5×10^{11} - 7.5×10^{11} viruso genomo kopijų /ml) + Pepino mozaikos viruso (PepMV) kamienas VX1 (1.5×10^{11} - 7.5×10^{11} viruso genomo kopijų /ml)	2% tirpalas (1 l V10 + 50 l vandens), pridedant 8 gramus sintetinio smėlio 1 litrui vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: Nenaudoti pomidorų daigynuose. Purškimo metu pomidorai turi būti 10–30 cm aukščiau.
			10% tirpalas (0,8 l V10 + 8 l vandens), pridedant 15 gramų sintetinio smėlio 1 litrui vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Pomidorų lapai įtrinami nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: Nenaudoti pomidorų daigynuose. Naudojant šį būdą, pomidorai turi būti 10–30 cm aukščiau.

MOLIUSKOCIDAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1.	Ferramol W.Neudorff GmbH KGAS2-58M/2016 2031-12-31	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	1,25–2,5	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	Pakuotė: 200 g, 500 g, 1kg, 2 kg

2.	Ferramol Limacide W. Neudorff GmbH KGAS2-2M(2021) 2031-12-31	Geležies fosfatas9,9 g/kg	1,25–2,5	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	Pakuotė: 200 g, 500 g, 1kg, 2 kg
3.	Limex Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o. AS2-50M(2022) 2031-12-31	Geležies fosfatas 10 g/kg	3	Salotos, gūžiniai, lapiniai, žiediniai kopūstai, braškės dekoratyviniai augalai auginami lauke ir šiltnamyje, takai ir terasos	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	Pakuotė: 150g; 400g; 685g; 900g; 1kg; 1,1kg; 1,5kg; 1,8kg; 2kg; 2,3kg
4.	Ironmax Pro De Sangosse S.A.S. AS2-86M(2017) 2031-12-31	Geležies ortofosfatas 24,2 g/kg	7,0	Žieminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Pupoms, žirniams, šparaginėms pupelėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Prieskoniniams augalams lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Rapsams, linams, kanapėms, saulėgrąžoms, sojoms, garstyčioms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Kukurūzams, saldiesiems kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Moliūgams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
			7,0	Žiediniams kopūstams, brokoliams, gūžiniams kopūstams, briuseliniais	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	

			kopūstams				
		7,0	Ropiniams svogūnams, laiškiniams svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salierams, porams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salotoms, špinatams, lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
		7,0	Cukriniam runkeliams, pašariniam runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
		7,0	Pievoms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Pomidorams, paprikoms, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Agurkams, cukinijoms, arbūzams, melionams,	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	

				auginamiems šiltnamiuose				
5.	SluXX HP W.Neudorff GmbH KG AS2-54M(2016) 2031-12-31	Geležies fosfatas 29,7 g/kg	4,0-5,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti profilaktiškai prieš pasireiškiant šliužams, sraigėms	4	Pakuotė: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.
			7,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus		
6.	Vitrol GB BROS sp. z o.o. AS2-3M(2023) 2036-08-03	Geležies pirofosfatas 24 g/kg	0,7	Braškės ir kiti uogakrūmiai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai, sraigės	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	Pakuotė: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg Neprofesionaliajam naudojimui.
			2,5	Serentis, melsvė ir kiti dekoratyviniai augalai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus		
7.	Vitrol GB Pro BROS sp. z o.o. AS2-5M(2023) 2036-08-03	Geležies pirofosfatas 24 g/kg	7,0	Javai, rapsai ir kiti aliejiniai augalai	Šliužai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus	6	Pakuotė: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g, 700 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 600 kg, 700 kg, 800 kg, 900 kg, 1000 kg.
			7,0	Braškės ir kiti uogakrūmiai (auginami lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)	Šliužai, sraigės	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus		
			25,0	Serentis, melsvė ir kiti dekoratyviniai augalai (auginami	Šliužai	Naudoti pasirodžius kenkėjams arba pastebėjus		

				lauke, šiltnamyje ir tuneliuose)		pirmuosius kenkėjų padarytus pažeidimus		
--	--	--	--	----------------------------------	--	---	--	--

REPELENTAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami augalai	Paskirtis	Apdorojimo laikas
1.	Cervacol extra Cheminova Deutschland GmbH&Co.KG AS2-18R/2015 2024-08-31	Kvarcinis smėlis 251 g/kg	3,0-4,0 kg/1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Atbaido stirnas ir elnius	Tepti lapuočių ir spygliuočių viršutinio ūglio 5-10 cm rudenį pasibaigus vegetacijai
2.	Trico Kwizda Agro GmbH 0462R/13 2024-08-31	Avių riebalai 65 g/l	15 l/ha	rapsai	Saugo nuo elnių, stirnų, briedžių apgraužimo	Purkšti nuo 2 lapelių (BBCH 12) iki žydėjimo pradžios (BBCH 61), ne daugiau kaip 4 kartus.
3.	Wam Extra Witasek Pflanzenschutz GmbH 0434/12 2024-08-31	Kvarcinis smėlis 300 g/kg	2,0 kg/ 1000 augalų	Lapuočių ir spygliuočių želdiniai	Saugo želdinius nuo laukinių žvėrių apgraužimo	Augalai tepami rudenį, pasibaigus lapuočių ir spygliuočių vegetacijai.