

MAŽOS RIZIKOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
1. Ironmax Pro De Sangosse S.A.S. AS2-86M(2017) 2031-12-31	Geležies ortofosfatas 24,2 g/kg	7,0	Žeminiams ir vasariniams javams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	Profesionaliajam naudojimui
		7,0	Pupoms, žirniams, šparaginėms pupelėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Prieskoniniams augalams lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Rapsams, linams, kanapėms, saulėgrąžoms, sojoms, garstyčioms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Kukurūzams, saldiesiems kukurūzams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Moliūgams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Žiediniams kopūstams, brokoliams,	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			gūžiniams kopūstams, briuseliniams kopūstams		pažeidimus ant augalų		
		7,0	Ropinams svogūnams, laiškiniams svogūnams, česnakams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salierams, porams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Salotoms, špinatams, lauke ir šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4	
		7,0	Morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams, raudoniesiems burokėliams, griežčiams, ropėms	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems lapeliams (BBCH 14)	4	
		7,0	Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, ne vėliau kaip išsiskleidus 4 tikriesiems	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos	
		7,0	Pievoms	Šliužai	lapeliams (BBCH 14) Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4		
		7,0	Pomidorams, paprikoms, baklažanams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4		
		7,0	Agurkams, cukinijoms, arbūzams, melionams, auginamiems šiltnamiuose	Šliužai	Naudoti pastebėjus kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų	4		
2.	Ferramol W. Neudorff GmbH KG, AS2-58M/2016 2031-12-31	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	1,25–2,5 g/m ²	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	Neprofesionaliajam naudojimui
3.	Ferramol Limacide W. Neudorff GmbH KG, AS2-2M(2021) 2031-12-31	Geležies fosfatas 9,9 g/kg	1,25–2,5 g/m ²	Uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	Neprofesionaliajam naudojimui
4.	Limex Evergreen Garden Care	Geležies fosfatas 10 g/kg	3 g/m ²	Salotos, gūžiniai, lapiniai, žiediniai kopūstai,	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų	4	Neprofesionaliajam naudojimui

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	Poland Sp. z o. o. AS2-50M(2022) 2031-12-31			braškės dekoratyviniai augalai auginami lauke ir šiltnamyje, takai ir terasos		ir sraigių pakenkimus		
5.	Lalstop G46 WG Danstar Ferment AG AS2-70BF(2021) 2035-03-31	<i>Clonostachys rosea J1446</i> 900 g/kg	125–300 g/ha	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti, kai dauguma žiedų su vainiklapiais suformuoja tuščiavidurį kamuolį, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 59–73)	4	Profesionaliajam naudojimui
			0,01–0,1 g/m ²	Braškės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedų atsivėrimo, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 60–73)	4	
			20–50 g/m ³	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		20–25 g/1000 augalų	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19)	4	
		100–1000 g/ha	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	juodasis stiebo puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85)	4	
		20–50 g/m ³	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
		20–25 g/1000 augalų	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19)	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		100–1000 g/ha	Pomidorai auginami šiltnamyje	pilkkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85)	4	
		20–50 g/m ³	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
		20–25 g/1000 augalų	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19)	4	
		100–1000 g/ha	Paprikos auginamos šiltnamyje	pilkkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85)	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			20–50 g/m ³	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			20–25 g/1000 augalų	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19)	4	
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			0,5–1 g/m ²	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12)	4	
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15)	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			2-2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49)	3	
			20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65)	4	
			20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65)	4	
			0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami	puvinys	Naudoti prieš auginių arba	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)		svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15)		
			0,01–0,1 g/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos pilnai susiformuoja (BBCH 15–89)	4	
			20–50 g/m ³	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai, saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje	šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			20–25 g/1000 augalų	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos,	šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai, saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje		daugiau ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19)		
		100–1000 g/ha	Baklažanai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos. (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus	4	
		100 g / 30000–40000 daigų	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15)	1	
		200–300 g/ha	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
						matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22)		
			200–300 g/ha	Melionai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15)	1	
			200–300 g/ha	Melionai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22)	1	
			20–50 g/m ³	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			0,5–1 g/m ²	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				šiltnamyje	Phytophthora spp.)	pagrindinio stiebo (BBCH 09–12)		
			0,05 % tirpalas	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15)	1	
			2–2,5 kg/ha	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49)	3	
			0,1–1 kg/ha	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo BBCH (15–49)	4	
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			0,5–1 g/m ²	Salotos	puvinys, vytuliai	Naudoti nuo	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdoravimų skaičius	Pastabos
				auginamos šiltnamyje	(Fusarium spp., Phytophthora spp.)	sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12)		
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15)	1	
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49)	3	
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingo gūžės dydžio, formos ir kietumo BBCH (15–49)	4	
			0,3–0,4 kg/ha	Lapinės salotos, gūžinės salotos,	pilkasis (kekerinis)	Purkšti nuo penkių tikrųjų	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				romantinės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami lauke	puvinys	lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 15–49)		
			20–50 g/m ³	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškiniai česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			0,5–1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškiniai česnakai, kalendros, krapai,	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12)	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)				
		20–25 g/1000 augalų, 5 augalai/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškiniai česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49)	3	
		0,01–0,1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai,	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				salierai, gysločiai, laiškiniai česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)		spalvos, sausos ir kietos (BBCH 15–85)		
			20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą	1	
			pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65)	4	
			20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio	4	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			ir svogūnėliai)		(BBCH 13–65)		
		0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15)	1	
		0,05 % tirpalas	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti sodinimo metu	1	
		20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, kai išsiskleidę 9 ir daugiau lapų (BBCH 13–19)	2	
		20–50 g/m ³	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti prieš sodinant (BBCH 00), įterpiant į vazoną ar substratą	1	
		50–100 g/10	Braškės ir avietės	stiebo ir	Nuo tarpsnio, kai	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			m ²	auginamos šiltnamyje	pašaknio puvinys (Rhizoctonia spp.)	lapų viršūnėlės viršija žvynelius iki išsiskleidžia trečiasis lapas (BBCH 09–13)		
			20–25 g/1000 augalų	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki stolonų ir jaunų augalų vystymosi pabaigos (BBCH 13–49)	3	
			12,5 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo)	1	
			0,05 % tirpalas	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu	1	
			20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios (BBCH 10–61)	2	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			12,5 g/1000 augalų	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo)	1	
			0,05 % tirpalas	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu	1	
			25–30 g/1000 augalų	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki ūglių vystymosi pradžios (BBCH 10–31)	2	
			200–300 g/ha	Avietės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo tarpsnio, kai daugelis lapų yra išsiskleidę iki uogų byrėjimo tarpsnio (BBCH 15–89)	4	
			0,05 % tirpalas	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			25–30 g/1000 augalų	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39)	2	
			300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo pirmųjų žiedų atsivėrimo iki uogos pradeda kristi (BBCH 60–89)	3	
			0,05 % tirpalas	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu	1	
			25–40 g/1000 augalų	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39)	2	
			300–400 g/ha	Šilauogės auginamos lauke	pilkasis (kekerinis)	Purkšti nuo žydėjimo	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			ir tuneliuose	puvinys	pradžios iki daugelis uogų įgauna būdingą spalvą (BBCH 60–85)		
		300–400 g/ha	Serbentai auginami lauke	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško sužydėjimo (BBCH 60–65)	3	
		0,05 % tirpalas	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu	2	
		300–400 g/ha	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnių pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39)	2	
		0,5–1 g/m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdoravimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	spp.)	stiebo (BBCH 09–12)		
			20–25 g/1000 augalų	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos derlingųjų vegetatyvinių augalo dalių vystymosi pabaigos (BBCH 13–49)	4	
			0,01-0,1 g/m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos / vaisiai pilnai susiformuoja (BBCH 15–89)	4	
			50–100 g/100 m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	šaknų gumbas (Plasmodiophora brassiceae)	Naudoti prieš pat daigų persodinimą, nuo trijų lapelių iki penkių lapelių tarpsnio (BBCH 13–15)	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
		300–400 g/ha	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	šaknų gumbas (Plasmodiaphora brassiceae)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po persodinimo (BBCH 19–22)	2	
		0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo arba persodinimo metu, nuo trečiojo iki penktojo matomo lapelio tarpsnio (BBCH 13–15)	1	
		300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo matomų devynių ir daugiau lapelių tarpsnio (BBCH 19)	1	
		20–50 g/m ³	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją įterpiant į substratą	1	
		0,5–1 g/m ²	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp.,	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
					Phytophthora spp.)	lapelių (BBCH 09–12)		
			20-25 g/1000 augalų	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki lapai visiškai sunyksta, ropelės visiškai sausos (svogūnams, česnakams) / būdingo stiebo dydžio susiformavimo (porams) (BBCH 13–49)	3	
			0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo	1	
			200–300 g/ha tunelyje ir šiltnamyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo lapo pagrindo storėjimo iki svogūnėlis ar stiebas pasiekia 50 % laukiamo dydžio (BBCH 41–45)	1	
			0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis)	Naudoti šaknų mirkymui, sodinimo metu	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			auginami šiltnamyje	puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)			
		0,01–0,1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki visiškos brandos (BBCH 15–85)	4	
		20–50 g/m ³	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją, įterpiant į substratą	1	
		0,5–1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12)	1	
		0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti persodinimo metu, nuo sudygimo iki išsiskleidusių penkių lapelių (BBCH 10–15)	1	
		20–25 g/1000 augalų	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp.,	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki būdingo lapkočio	3	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
				Rhizoctonia spp.)	dydžio susiformavimo (BBCH 13–49)		
		0,4 g/l tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos šiltnamyje	juodasis puvinys (Thielaviopsis basicola)	Naudoti po derliaus nuėmimo, prieš atžėlimą	1	
		0,2–0,4 g tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos šiltnamyje	juodasis puvinys (Thielaviopsis basicola)	Naudoti prieš augimo skatinimą	1	
		300–400 g/ha	Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, šakninės petražolės auginamos lauke	fuzariozė, rizoktoniozė (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Purkšti nuo sėjos iki išsiskleidusių devynių ir daugiau lapelių (BBCH 00–19)	2	
		300–400 g/ha	Žaliosios pupelės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo trijų tikrųjų lapelių išsiskleidimo iki stiebo augimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–39)	2	
		20–50 g/m ³	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose,	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora	Naudojama prieš sodinimą, įterpiant į dirvą / substratą	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
			lauke ir tuneliuose	spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)			
		50–100 g/100 m ²	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama sodinimo metu, nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39)	5	
		300–500 g/ha	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	pilkkasis (kekerinis) puvinys	Purškiama nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39)	5	
		100–1000 g/ha	Obelys	obelų paprastasis vėžys (Neonectria ditissima)	Purškiama pavasarį, nuo ramybės periodo iki žalių lapų viršūnėlės viršija pumpurų žvynus (BBCH 00–09). Rudenį purškiama kai 50 % lapų pakeitę spalvą iki ramybės pradžios (BBCH 95–99)	2	
6.	PMV-01 De Ceuster Meststoffen	4 arba 8 l/ha	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki	1	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	NV AS2-112V(2019) 2031-08-07	padermės CH2 izoliatas 1906 (>5 × 105 viruso genomo kopijų/μl)				pirmosios kekės žydėjimo (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. Esant didelei rizikai pomidorams būti užkrėstiems Pepino mozaikos virusu naudoti didesniąją normą.		
7.	SluXX^{HP} W.Neudorff GmbH KG AS2-54M(2016) 2031-12-31	Geležies fosfatas 29,7 g/kg	4,0-5,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti profilaktiškai prieš pasireiškiant šliužams ir sraigėms		Profesionaliajam naudojimui
			7,0	Lauko augalai, uogynai, lauko ir uždaro grunto daržovės, dekoratyviniai augalai	Šliužai, sraigės	Naudoti pastebėjus šliužų ir sraigių pakenkimus	4	
7.	V10 Valto B. V. AS2-17V(2022) 2033-03-29	Pepino mozaikos viruso (PepMV) kamienas VC1 (1.5x10 ¹¹ - 7.5x10 ¹¹ viruso genomo kopijų /ml) + Pepino	2% tirpalas (1 l V10 + 50 l vandens), pridedant 8 gramus sintetinio smėlio 1 litrui vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51). Pastaba: Nenaudoti pomidorų	1	Profesionaliajam naudojimui

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma, kg/ha	Apdorojami augalai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas	Didžiausias apdorojimų skaičius	Pastabos
	mozaikos viruso (PepMV) kamienas VX1 (1.5×10^{11} - 7.5×10^{11} viruso genomo kopijų /ml)				daigynuose. Purškimo metu pomidorai turi būti 10–30 cm aukščio.		
		10% tirpalas (0,8 l V10 + 8 l vandens), pridedant 15 gramų sintetinio smėlio 1 litrai vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Pomidorų lapai įtrinami nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51). Pastaba: Nenaudoti pomidorų daigynuose. Naudojant šį būdą, pomidorai turi būti 10–30 cm aukščio.	1	