

AUGALŲ AUGIMO INHIBITORIAI

| Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas | Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis | Naudojimo norma | Apdorojami augalai | Apdoravimo laikas | Paskutinis apdoravimo terminas iki naudojimo | Didžiausias apdorojimų skaičius | Naudojimo apribojimai |
|--|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| 1. 1,4Sight DormFresh Ltd. AS2-68AI(2020) 2025-06-30 | 1,4-dimetilnaftalenas 980 g/kg | 20 ml/t | Bulvėms profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose) | Bulvės apdorojamos saugojimo metu prieš pasirodant pirmiesiems dygimo požymiams | 30 dienų | 6 | <p>Apdoravimo metu laikymo patalpose neturi būti žmonių. Apdoravimo metu ir mažiausiai 24 valandas po apdoravimo visi patalpų jėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Laikymo patalpos turi būti paženklintos įspėjamąja informacija. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl įeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdoravimo ir dar 0,5 val., kol patalpos vėdinamos</p> <p>Nenaudoti sėklinėms bulvėms, nesandėliuoti sėklinių bulvių patalpose, kuriose anksčiau buvo naudojamas 1,4Sight.</p> |
| 2. Argos Arysta LifeScience Benelux sprl AS2-35AI(2022) 2025-07-31 | Apelsinų aliejus 843,2 g/l | 100 ml/t | Bulvėms (maistinėms ir skirtoms krakmolui) profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose) | Apdoroti sausas bulves praėjus 30 dienų po derliaus nuėmimo ir prieš pasirodant pirmiesiems dygimo požymiams | - | 9 | <p>Apdoravimo metu laikymo patalpose neturi būti žmonių. Apdoravimo metu ir mažiausiai 24 valandas po apdoravimo visi patalpų jėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl įeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdoravimo ir dar 0,5 valandos, kol patalpos vėdinamos.</p> <p>Nenaudoti sėklinėms bulvėms.</p> |
| 3. Biox-M Xeda International S.A. AS2-40AI(2020) 2027-01-31 | Šaltmėčių aliejus 948 g/l | 390 ml/t. Pirmą kartą purškama 90 ml/t praėjus 6–15 dienų po derliaus nuėmimo, vėliau 10 kartų po 30 | Bulvėms profesionaliose laikymo patalpose (saugyklose) | Praėjus 6–15 dienų po derliaus nuėmimo, bulvės apdorojamos saugojimo metu | 12 dienų | 11 | <p>Apdoravimo metu laikymo patalpose neturi būti žmonių. Apdoravimo metu ir mažiausiai 24 valandas po apdoravimo visi patalpų jėjimai privalo būti užrakinti ir visos išorinės ventiliacijos angos turi būti sandariai uždarytos. Laikymo patalpos turi būti paženklintos įspėjamąja informacija. Į patalpas draudžiama įeiti mažiausiai 24 valandas po apdoravimo. Pasibaigus poveikio laikui / prieš vėl</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|
| | | | ml/t. | | | | | <p>jeinant į patalpas, jos turi būti kruopščiai išvėdintos.</p> <p>Nenaudoti sėklinėms bulvėms, nesandėliuoti sėklinių bulvių patalpose, kuriose anksčiau buvo naudojamas Biox-M.</p> |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|