

BIOLOGINIAI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
1.	Dipel DF Sumitomo Chemical Agro Europe SA AS2-11I(2017) 2024-04-30	<i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> štamai ABTS-351	0,5–1,0 kg/ha	Gūžiniai kopūstai, brokoliai, briuseliniai ir žiediniai kopūstai	kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinių baltukų, ropinių baltukų lervos.	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			0,5–1,0 kg/ha	Žirniai	žirnių vaisėdžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			1,5 kg/ha	Obelys	tinkliasparnių lapsukių, obuolinių vaisėdžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 2 kartus
			0,5–1,0 kg/ha.	Kmynai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	kmyninių kandžių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus
			0,5–1,5 kg/ha	Šaltalankiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	šaltalankinių musių, neporinių verpikų lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha.	Svogūnai, česnakai(registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	kopūstinių baltukų, svogūninių kandžių, minamusių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai, agurkai, šparaginės pupelės šiltnamiuose	minamusių, pelėdgalvių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
			0,5–1,0 kg/ha	Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	minamusių, pelėdgalvių lervos	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 3 kartus.
2.	Foray 76B Sumitomo Chemical Agro Europe SA AS2-19BI(2024) 2038-06-30	<i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> , štamai ABTS-351	2,0-2,5 l/ha	Miškai (didesni miškai ir miškingi plotai)	Lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ąžuolinių lapsukių) vikšrai.	Purkšti iš oro tik masinio kenkėjų išplitimo metu, kai kitais būdais sunaikinti jų neįmanoma ne daugiau kaip 2 kartus. Pastaba: Būtina iš anksto informuoti gyvenamųjų vietovių gyventojus bei visuomenę apie planuojamus miško purškimus iš oro: jų tikslus, plotus, atlikimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						laiką, naudojamą augalų apsaugos produktą ir saugos būdus. Draudžiama purkšti miškų plotus žmonių poilsio zonose bei arčiau kaip 100 metrų nuo žmonių gyvenamųjų vietų. Nuo visų numatytų nupurkšti plotų ribų ne mažesniu kaip 100 metrų atstumu turi būti išdėstyti gerai matomi pranešimai – įspėjimai, draudžiantys eiti į nupurkštą teritoriją. Perspėjamoji informacija nuimama tik pasibaigus draudimui lankytis miške. Gyventojams eiti į apdorotus plotus ir 100 metrų zoną aplink šiuos plotus galima tik praėjus ne mažiau kaip parai nuo purškimo iš oro. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 50 metrų apsaugos zoną (purškiant aviacine technika) ir 10 metrų (naudojant antžeminius purkštuvus) iki paviršinio vandens telkinių
			2,0-2,5 l/ha	Miškai (žemesni pavieniai dekoratyviniai medžiai, medžių grupės ar miškai, kuriuos galima pasiekti ir tolygiai nupurkšti)	Lapus ir spyglius graužiančių drugių (pušinių verpikų, vienuolių verpikų, ąžuolinių lapsukių) vikšrai.	Purkšti antžeminiais purkštuvais tik masinio kenkėjų išplitimo metu, ne daugiau kaip 2 kartus.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
3.	Integral Pro BASF A/S AS2-62BB(2019) 2027-09-16	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> MBI600 6,8 proc.	1,6 l/t	Žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsukai	Fomozė, skatina natūralią apsaugą nuo spragių	Beicuoti naudojant 1,6–5 l/t tirpalo
4.	Lalstop G46 WG Danstar Ferment AG AS2-70BF(2021) 2035-03-31	Clonostachys rosea J1446 900 g/kg	125–300 g/ha	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti, kai dauguma žiedų su vainiklapiais suformuoja tuščiavidurį kamuolį, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 59–73), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,01–0,1 g/m ²	Braškės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žiedų atsivėrimo, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 60–73), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus
			100–1000 g/ha	Moliūginės daržovės auginamos šiltnamyje (agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai)	juodasis stiebo puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Pomidorai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus
			100–1000 g/ha	Pomidorai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Paprikos auginamos šiltnamyje	diegavirtės, šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus
			100–1000 g/ha	Paprikos auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Baklažanai auginami šiltnamyje	diegavirtės	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,5–1 g/m ²	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						12) ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			2-2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys	Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						(BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,01–0,1 g/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai, saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje	šaknų puvinys	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Agurkai, melionai, arbūzai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai, pomidorai, baklažanai, saldžiosios ir aitriosios paprikos auginamos šiltnamyje	šaknų puvinys	Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus
			100–1000 g/ha	Baklažanai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos. (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			100 g / 30000–40000 daigų	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			200–300 g/ha	Agurkai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą
			200–300	Melionai, moliūgai, aguročiai,	pilkasis (kekerinis)	Purkšti daigų persodinimo metu,

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			g/ha	cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	puvinys, juodasis stiebo puvinys	kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			200–300 g/ha	Melionai, moliūgai, aguročiai, cukinijos, patisonai, ilgmoliūgiai auginami lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys, juodasis stiebo puvinys	Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą
			20–50 g/m ³	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,5–1 g/m ²	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			2–2,5 kg/ha	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,1–1 kg/ha	Gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo BBCH (15–49), ne daugiau kaip 4 kartus

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			20–50 g/m ³	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,5–1 g/m ²	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			2–2,5 kg/ha	Salotos auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingo gūžės dydžio, formos ir kietumo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,3–0,4 kg/ha	Lapinės salotos, gūžinės salotos, romaninės salotos, cikorijos, špinatai, lapiniai salierai auginami lauke	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 2 kartus
			20–50 g/m ³	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir	puvinys, vytuliai (<i>Pythium</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
				čiobreliai)		
			0,5–1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–25 g/1000 augalų, 5 augalai/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,01–0,1 g/m ²	Prieskoniniai augalai auginami šiltnamyje (vaistinės šventagaršvės, bazilikai, lauro lapai, kmynai, salierai, gysločiai, laiškinių česnakai, kalendros, krapai, pankoliai, vaistinės gelsvės, mairūnai, mėtos, raudonėliai, petražolės, rozmarinai, šalavijai, peletrūnai ir čiobreliai)	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų)	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m ²	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Dekoratyviniai augalai auginami šiltnamyje (augalai vazonuose, gėlės auginamos skynimui, auginiai ir svogūnėliai)	puvinys, vytuliai (<i>Fusarium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,05 % tirpalas	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos lauke ir tuneliuose	puvinys, vytuliai (<i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, kai išsiskleidę 9 ir daugiau lapų (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 2 kartus
			20–50 g/m ³	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti prieš sodinant (BBCH 00), įterpiant į vazoną ar substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			50–100	Braškės ir avietės auginamos	stiebo ir pašaknio	Nuo tarpsnio, kai lapų viršūnėlės

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			g/10 m ²	šiltnamyje	puvinys (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	viršija žvynelius iki išsiskleidžia trečiasis lapas (BBCH 09–13), ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Braškės ir avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (<i>Rhizoctonia</i> spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki stolonų ir jaunų augalų vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			12,5 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,05 % tirpalas	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Braškės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys, vytuliai (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios (BBCH 10–61) ne daugiau kaip 2 kartus.
			12,5 g/1000 augalų	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,05 % tirpalas	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Fusarium</i> spp., <i>Pythium</i> spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			25–30 g/1000	Avietės auginamos šiltnamyje	stiebo ir pašaknio puvinys	Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			augalų		(Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	ūglių vystymosi pradžios (BBCH 10–31) ne daugiau kaip 2 kartus
			200–300 g/ha	Avietės auginamos šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo tarpsnio, kai daugelis lapų yra išsiskleidę iki uogų byrėjimo tarpsnio (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,05 % tirpalas	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			25–30 g/1000 augalų	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus
			300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Gervuogės ir avietės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo pirmųjų žiedų atsivėrimo iki uogos pradeda kristi (BBCH 60–89), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,05 % tirpalas	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			25–40 g/1000 augalų	Šilauogės auginamos lauke ir tuneliuose	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus
			300–400	Šilauogės auginamos lauke ir	pilkasis (kekerinis)	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			g/ha	tuneliuose	puvinys	daugelis uogų įgauna būdingą spalvą (BBCH 60–85), ne daugiau kaip 3 kartus
			300–400 g/ha	Serbentai auginami lauke	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško sužydėjimo (BBCH 60–65), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,05 % tirpalas	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1-2 kartus
			300–400 g/ha	Spanguolės auginamos lauke	stiebo ir pašaknio puvinys (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Pythium spp.)	Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnių pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), n daugiau kaip 2 kartus
			0,5–1 g/m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą
			20–25 g/1000 augalų	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	puviniai, vytuliai (Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Pythium spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos derlingųjų vegetatyvinių augalo dalių vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 4 kartus
			0,1–1 kg/ha	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami šiltnamyje	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos / vaisiai pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus
			50–100 g/100 m ²	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai	šaknų gumbas (Plasmodiaphora	Naudoti prieš pat daigų persodinimą, nuo trijų lapelių iki

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
				kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	brassiceae)	penkių lapelių tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			300–400 g/ha	Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, brokoliai, lapiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, kininiai kopūstai, ropiniai kopūstai auginami lauke	šaknų gumbas (Plasmodiaphora brassiceae)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po persodinimo (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 2 kartus
			0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo arba persodinimo metu, nuo trečiojo iki penktojo matomo lapelio tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą
			300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami lauke ir tuneliuose	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo matomų devynių ir daugiau lapelių tarpsnio (BBCH 19), ne daugiau kaip 1 kartą
			20–50 g/m ³	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti prieš sėją įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,5–1 g/m ²	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą
			20-25 g/1000 augalų	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	puvinys, vytuliai (Pythium spp., Rhizoctonia spp., Phytophthora spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki lapai visiškai sunyksta, ropelės visiškai sausos (svogūnams, česnakams) / būdingo stiebo dydžio susiformavimo (porams) (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,05 % tirpalas	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė,	Naudoti šaknų mirkymui sodinimo, ne daugiau kaip 1

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
					kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	kartą
			200–300 g/ha tunelyje ir šiltnamyje	Svogūnai, porai, česnakai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, svogūnų fuzariozė, kaklelio puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo lapo pagrindo storėjimo iki svogūnėlio ar stiebas pasiekia 50 % laukiamo dydžio (BBCH 41–45), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Naudoti šaknų mirkymui, sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,01–0,1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	fuzarinis puvinys, pilkasis (kekerinis) puvinys (Fusarium spp., Botrytis spp.)	Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki visiškos brandos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus
			20–50 g/m ³	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti prieš sėją, įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			0,5–1 g/m ²	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą
			0,05 % tirpalas	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti persodinimo metu, nuo sudygimo iki išsiskleidusių penkių lapelių (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.
			20–25 g/1000 augalų	Lapkotiniai salierai, smidrai, pankoliai auginami šiltnamyje	puvinys, rizoktoniozė (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp.)	Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki būdingo lapkočio dydžio susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus
			0,4 g/l tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos	juodasis puvinys (Thielaviopsis)	Naudoti po derliaus nuėmimo, prieš atžėlimą, ne daugiau kaip 1

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
				šiltnamyje	basicola	kartą
			0,2–0,4 g tirpalas	Cikorijos (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamos šiltnamyje	juodasis puvinys (Thielaviopsis basicola)	Naudoti prieš augimo skatinimą, ne daugiau kaip 1 kartą
			300–400 g/ha	Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, šakninės petražolės auginamos lauke	fuzariozė, rizoktoniozė (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.)	Purkšti nuo sėjos iki išsiskleidusių devynių ir daugiau lapelių (BBCH 00–19), ne daugiau kaip 2 kartus
			300–400 g/ha	Žaliosios pupelės auginamos lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti nuo trijų tikrųjų lapelių išsiskleidimo iki stiebo augimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 2 kartus
			20–50 g/m ³	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama prieš sodinimą, įterpiant į dirvą / substratą, ne daugiau kaip 1 kartą
			50–100 g/100 m ²	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	šaknų ir pašaknio puvinys (Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)	Naudojama sodinimo metu, nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus
			300–500 g/ha	Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjinukai auginami šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose	pilkasis (kekerinis) puvinys	Purškiama nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus
			100–1000 g/ha	Obelys	obelų paprastasis vėžys (Neonectria ditissima)	Purškiama pavasarį, nuo ramybės periodo iki žalių lapų viršūnėlės viršija pumpurų žvynus (BBCH 00–09). Rudenį purškiama kai 50 % lapų pakeitę spalvą iki ramybės pradžios (BBCH 95–99), ne daugiau kaip 2 kartus
5.	Madex Pro Andermatt Group AG	<i>Cydia pomonella granulovirusas</i>	100 ml/ha	Obelys	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 8 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
	AS2-62BI(2021) 2024-04-30	<i>DSMZ GV-0013</i> ($\geq 3 \times 10^{13}$ <i>viruso dalelių/l</i>)	50 ml/ha	Obelys	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 6 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
			100 ml/ha	Kriaušės, graikiniai riešutai, svarainiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 8 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
			50 ml/ha	Kriaušės, graikiniai riešutai, svarainiai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Obuolinio vaisėdžio lervos	Purkšti vegetacijos metu kas 6 saulėtas dienas, ne daugiau kaip 10 kartų
6.	Mycostop Danstar Ferment AG AS2-42BF(2018) 2025-04-30	Streptomyces griseoviridis	2–10 g/100 m ²	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sodinukai	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Auginimo substratas sudrėkinamas, substratas mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu
			2–10 g/100 m ² lysvėse	Vaisinės daržovės (pomidorai, agurkai, paprikos)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinimo metu <i>Mycostop</i> į auginimo substratą supilamas per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.
			5–20 g/1000 augalų	Vaisinės daržovės (pomidorai, agurkai, paprikos)	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinimo metu <i>Mycostop</i> į auginimo substratą supilamas per dirvožemio sumirkymo arba lašinio drėkinimo sistemas.
			1–10 g/100 m ² lysvėse	Dekoratyviniai augalai (vazoniniai augalai, skinamos gėlės, įšaknytinti ūgliai).	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis	Auginimo substratas sudrėkinamas, mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
					puviny, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	vazonus metu.
			5–20 g/1000 augalų	Dekoratyviniai augalai (vazoniniai augalai, skinamos gėlės, įšaknytinti ūgliai).	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Auginimo substratas sudrėkinamas, mirkomas arba įmaišoma į substratą augalų sodinimo ar persodinimo į vazonus metu.
			1 g/1000 augalų	Lapinės daržovės ir prieskoninės žolelės hidroponinio auginimo sistemose	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Persodinus augalus vandeninis <i>Mycostop</i> tirpalas supilamas į cirkuliuojantį maitinamąjį tirpalą
			2–8 g/1 kg sėklų	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklos	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Daržovių, prieskoninių žolelių, dekoratyvinių augalų sėklos prieš sėją sausiai apdorojamos
			1–10 g/1 m ³	Substratas, skirtas sodinukų, lapinių daržovių ir prieskoninių žolelių auginimui, įmaišant į auginimo terpę.	<i>Fusarium sp.</i> , <i>Pythium sp.</i> ir <i>Phytophthora sp</i> sukeliama šlapiasis puvinys, šaknų ir stiebų puvinys, vytimas	Auginimo substratas purškiamas, sumirkomas tą arba vandeninis <i>Mycostop</i> tirpalas įmaišomas į auginimo terpę prieš sėją, sodinimą į vazonečius arba persodinimą.
7.	Naturalis CBC (Europe) S.r.l. AS2-64BIA(2022) 2026-09-30	Beauveria bassiana padermės ATCC 74040 (>2,3 x 10 ⁷	0,75 - 1 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (šiltnamiuose)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus.
			1 – 1,5 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (šiltnamiuose)	Tripsai	
			1 – 2 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai	Paprastoji	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
		gyvybingų sporų/ml)		(šiltnamiuose)	voratinklinė erkė, pomidorinė erkutė	Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos.
			0,75 - 1 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (lauke)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 – 1,5 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (lauke)	Tripsai	
			1 – 2 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (lauke)	Paprastoji voratinklinė erkė, pomidorinė erkutė	
			1 – 2 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai (lauke)	Spragšiai	Purkšti profilaktiškai arba aptikus kenkėjus, prieš persodinimą / sėją ir (arba) po sodinimo / sėjos iki visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 2 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 7 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			0,75 – 1 l/ha	Arbūzai, melionai, moliūgai, cukinijos, agurkai (šiltnamiuose)	Baltasparniai, paprastoji voratinklinė erkė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos.
			1,0 – 1,5 l/ha	Arbūzai, melionai, moliūgai, cukinijos, agurkai (šiltnamiuose)	Tripsai	
			0,75 – 1 l/ha	Arbūzai, melionai, moliūgai, cukinijos, agurkai (lauke)	Baltasparniai, paprastoji voratinklinė erkė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visi vaisiai turi būdingą subrendusio vaisiaus spalvą (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento
			1,0 – 1,5 l/ha	Arbūzai, melionai, moliūgai, cukinijos, agurkai (lauke)	Tripsai	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						1107/2009 51 straipsnį
			0,75 - 1 l/ha	Salotos, salotinės trūkažolės, cikorijos (šiltnamiuose)	Amarai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, visos augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojimų 5 dienos.
			0,75 - 1 l/ha	Salotos, salotinės trūkažolės, cikorijos (lauke)	Amarai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, visos augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojimų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 – 1,5 l/ha	Pupelės, ankštinės pupelės (šiltnamiuose)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, visos ankštys sausos ir rudos (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojimų 5 dienos.
			1 – 1,5 l/ha	Pupelės, ankštinės pupelės (lauke)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, visos ankštys sausos ir rudos (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojimų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 2 l/ha	Žiediniai kopūstai, brokoliai (šiltnamiuose)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, augalo sėklos būdingos spalvos

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						ir kietumo (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos.
			1 - 2 l/ha	Žiediniai kopūstai, brokoliai (lauke)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo sėjos iki visiškos brandos, augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			0,75 - 1 l/ha	Braškės (šiltnamiuose)	Baltasparniai, paprastoji voratinklinė erkė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki antrojo derliaus, dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos.
			1 - 1,5 l/ha	Braškės (šiltnamiuose)	Tripsai	
			0,75 - 1 l/ha	Braškės (lauke)	Baltasparniai, paprastoji voratinklinė erkė	
			1 - 1,5 l/ha	Braškės (lauke)	Tripsai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki antrojo derliaus, dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 2 l/ha	Braškės (lauke)	Spragšiai	Purkšti profilaktiškai arba aptikus kenkėjus, prieš persodinimą ir po sodinimo iki antrojo derliaus, dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 2 kartus.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
						Laikotarpis tarp naudojamų 7 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			0,75 - 1 l/ha	Gėlės ir dekoratyviniai augalai (šiltnamiuose)	Baltasparniai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, vegetacijos metu (BBCH 00-89)
			0,75 - 1 l/ha	Avietės, gervuogės, šilauogės (lauke)	Paprastoji voratinklinė erkė, šilauoginė žiedpumpurinė erkė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 1,5 l/ha	Persikai, nektarinai, abrikosai, slyvos (lauke)	Tripsai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 2 l/ha	Vyšnios (lauke)	Vyšnių vaisinė muselė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			1 - 2 l/ha	Obelys, kriaušės (lauke)	Kriaušinė blakutė	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 1,5 l/ha	Obelys, kriaušės (lauke)	Raudonosios sodinės erkės	
			1 - 1,5 l/ha	Vynuogės (lauke)	Paprastoji voratinklinė erkė, tripsai	Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo vegetacijos pradžios iki dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 00-89), ne daugiau kaip 5 kartus. Laikotarpis tarp naudojamų 5 dienos. Registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį
			1 - 2 l/ha	Morkos, japoniniai ridikai, ropės, juodieji ridikai (lauke)	Spragšiai	
8.	PMV-01 De Ceuster Meststoffen NV AS2-112V(2019) 2031-08-07	<i>Pepino mozaikos viruso</i> padermės CH2 izoliatas 1906 (>5 × 105 viruso genomo kopijų/μl)	4 arba 8 l/ha	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki pirmosios kekės žydėjimo (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. Esant didelei rizikai pomidorams būti užkrėstiems Pepino mozaikos virusu naudoti didesniąją normą.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
9.	Rotstop SC Danstar Ferment AG AS2-40BF(2018) 2025-04-30	<i>Phlebiopsis gigantea</i> <i>štamai VRA 1835</i>	1 g/1 l vandens	Pušų ir eglių kelmiai	Šakninė pintis	Kertant medžius, tirpalas paskleidžiamas, panaudojant daugiafunkcinės mašinos purškimo įrangą, skiriant maždaug du litrus skiedinio vienam kvadratiniam metrui ploto su kelmiais
10.	Serenade Aso Bayer AG AS2-3F(2017) 2025-08-15	<i>Bacillus subtilis</i> QST 713	8 l/ha	Braškės, auginamos lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Braškės, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 5 kartus
			1 proc. tirpalas	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Salotos, auginamos lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Pomidorai, paprikosauginami šiltnamiuose	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sausligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			4-8 l/ha	Pomidorai, paprikos, baklažanai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Miltligė, bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Baklažanai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			10 l/ha	Morkos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51	Puvinys	Laistyti dirvą iškart po sėjos ne daugiau kaip 1 kartą

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
				straipsni)		
			8 l/ha	Morkos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Morkų alternariozė, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus
			8 l/ha	Porai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 8 kartus
			8 l/ha	Agurkai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, bakterinė dėmėtligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			1 proc. tirpalas	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Moliūgai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			3,2 l/ha	Cukinijos (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			8 l/ha	Burokėliai, ridikėliai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, juodasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			1 proc. tirpalas	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			10 l/ha	Brokoliai, briuseliniai kopūstai, žiediniai kopūstai, auginami lauke (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Gūžiniai kopūstai, kininiai kopūstai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, juodasis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Salierai, šakninės petražolės, pastarnokai, krienai, kaliropės, batatai, ropės, smidrai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, miltligė, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Pankoliai, auginami šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			1 proc. tirpalas	Salierai, petražolės, pastarnokai, česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė, puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Salierai, petražolės, pastarnokai, česnakai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Diegavirtė, puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Cikorija (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			8 l/ha	Pupelės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Laiškiniai svogūnai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Lapų dėmėtligė, puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Svogūna, askaloniniai česnakai	Lapų dėmėtligė,	Purkšti vegetacijos metu ne

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
				(registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	puvinys	daugiau kaip 9 kartus
			8 l/ha	Sojos, kmynai, linai, kanapės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			1 proc. tirpalas	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Prieskoniniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			1 proc. tirpalas	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Šilauogės, serbentai, agrastai, avietės, spanguolės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Vyšnios, slyvos, abrikosai, persikai (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys, moniliozė, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 6 kartus
			8 l/ha	Kriaušės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Bakterinė degligė, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 4 kartus

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
			8 l/ha	Vynuogės (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pilkasis (kekerinis) puvinys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			8 l/ha	Dekoratyviniai augalai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			8 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Sausligė, pilkasis (kekerinis) puvinys, sklerotinis puvinys, miltligė, juodasis puvinys, bakterinis vėžys	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus
			1 proc. tirpalas	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti dirvą prieš persodinant sodinukus ne daugiau kaip 1 kartą
			10 l/ha	Medžių sodinukai, auginami lauke ir šiltnamiuose (registruota pagal Reglamento 1107/2009 51 straipsnį)	Pašaknio ir šaknų puviniai	Laistyti aplink sodinukų šaknis ne daugiau kaip 1 kartą
			8 l/ha	Spygliuočių ir lapuočių sodmenys medelynyse	Sausligė (Alternaria spp.); Pilkasis (kekerinis) puvinys (Botrytis cinerea); Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum); Miltligė (Erysiphe spp., Sphaerotheca pannosa)	Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 9 kartus

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas	Norma	Apdorojami augalai	Kenksmingieji organizmai	Apdorojimo laikas
11.	V10 Valto B. V. AS2-17V(2022) 2033-03-29	Pepino mozaikos viruso (PepMV) kamienas VC1 (1.5×10^{11} - 7.5×10^{11} viruso genomo kopijų /ml) + Pepino mozaikos viruso (PepMV) kamienas VX1 (1.5×10^{11} - 7.5×10^{11} viruso genomo kopijų /ml)	2% tirpalas (1 l V10 + 50 l vandens), pridedant 8 gramus sintetinio smėlio 1 litrui vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Purkšti nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. <i>Pastaba:</i> Nenaudoti pomidorų daigynuose. Purškimo metu pomidorai turi būti 10–30 cm aukščio.
			10% tirpalas (0,8 l V10 + 8 l vandens), pridedant 15 gramų sintetinio smėlio 1 litrui vandens	Pomidorai, auginami šiltnamyje	Pepino mozaikos virusas	Pomidorų lapai įtrinami nuo pomidorų daigų pasodinimo iki matomo pirmo žiedyno tarpsnio (BBCH 15–51), ne daugiau kaip 1 kartą. <i>Pastaba:</i> Nenaudoti pomidorų daigynuose. Naudojant šį būdą, pomidorai turi būti 10–30 cm aukščio.