

BIGALO

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: boskalidas 26,7% (267 g/kg)
piraklostrobinas 6,7% (67 g/kg)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės

Sisteminio veikimo fungicidas, skirtas gūžinių kopūstų, morkų, porų, svogūnų, salotų, žirnių, pupų, braškių, bulvių, vyšnių, slyvų, juodųjų, raudonųjų ir baltųjų serbentų, aviečių, ir pušų sodinukų apsaugai nuo puvinų ir kitų ligų. Fungicidas Bigalo žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, brokoliams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams, šakniniams salierams, špinatams auginamiems sėklai, pomidorams ir baklažanams auginamiems šiltnamiuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:

+370 5 2362052 arba +370 687 53378

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

Pakuotė: 0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5,0 kg

Registracijos numeris: AS2-28F(2024)

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos

Laikymas: Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +30 °C.

Registracijos savininkas: GLOBACHEM NV., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden – Belgija, tel: +32 (0)11 78 57 17 www.globachem.com

Registracijos savininko atstovas Lietuvoje: NORDISK ALKALI AB, info@nordiskalkali.lt,
tel.: +370 648 93200, www.nordiskalkali.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Bigalo yra sisteminis fungicidas, pasižymintis gydomuoju ir apsauginiu veikimu, skirtas gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, briuselinių kopūstų, brokolių, morkų, pastarnokų, raudonųjų burokėlių, šakninių salierų, porų, svogūnų, salotų, šiltnaminių pomidorų, baklažanų, žirnių, pupų, braškių, bulvių, kaulavaisių, juodųjų, raudonųjų, baltųjų serbentų, aviečių, pušų sodinukų, sėkloms auginamų špinatų apsaugai nuo puvinų ir kitų ligų.

Tai labai veiksmingas fungicidas nuo alternariozės (*Alternaria* spp.), sklerotinių (*Sclerotinia* spp.), kekerinių (*Botrytis* spp.), rudųjų puvinų (*Monilia* spp.) ir kitų ligų. Jis turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.

Bigalo sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: boskalido ir piraklostrobino. Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.

Boskalidas priklauso naujai veikliųjų medžiagų grupei - anilidams. Boskalidas augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys. Pagal veikimo būdą boskalidas skiriasi nuo strobilurinių ir triazolų. Jis sustabdo energetinių resursų gamybą ir taip blokuoja grybų augimą. Jei buvo pasireiškęs atsparumas kitiems fungicidams, tuomet apsaugai nuo ligų galima naudoti Bigalo, nes boskalidui nepasireiškia grupinis atsparumas.

Piraklostrobinas yra strobilurinių grupės veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį veikimą. Prasiskverbiantis į lapus piraklostrobinas blokuoja grybo ląstelių energetinių resursų gamybą.

NAUDOJIMAS

Augalus su Bigalo purkškite profilaktiškai. Tai užkirs kelią atsparumo vystymuisi ir užtikrins geriausią apsaugą.

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai

Alternariozė *Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola.*
 Baltosios rūdys *Albugo candida*

Norma: 1,0 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 250–400 l/ha. Kopūstai purškiami, kol jauni lapai dar neišsiskleidę iki susiformuoja būdingas gūžės dydis ir forma (BBCH 41-49). Geriausių rezultatų pasieksite, Bigalo purkšdami profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Purškimą kartokite po 10-21 dienos, priklausomai nuo ligos intensyvumo.

Didžiausias purškimų skaičius-2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų

Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, raudonieji burokėliai

Juodoji dėmėtligė *Alternaria dauci, Alternaria radicina*
 Miltligė *Erysiphe heraclei*
 Dalinė apsauga nuo sklerotinio puvinio *Sclerotinia sclerotiorum*

Norma: 0,75-1,0 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-400 l/ha, priklausomai nuo lapų dydžio ir tankumo. Purškama šaknims esant didesnėms nei 0,5 cm skersmens iki pilnai išsivysto ir pasiekia būdingą 3 formą ir dydį (BBCH 41-49). Purškiti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10-14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius-2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų

Pomidorai, baklažanai auginami šiltnamiuose

Kekerinis puvinys *Botryotinia fuckeliana*
 Miltligės *Oidium neolycopersici, Leveillula taurica*

Norma: 1,0-1,5 kg/ha Bigalo. (0,1-0,15 % koncentracija, arba 100-150 g/100 l vandens). Rekomenduojamas vandens kiekis 500-1000 l/ha, priklausomai nuo lapų dydžio ir tankumo. Purškama nuo žiedų pasirodymo iki 50% vaisių pasiekia būdingą spalvą (BBCH 50-85). Purškiti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 7- 14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius-3

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 1 diena

Porai

Puviniai *Botrytis allii, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp., Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Pseudomonas spp.*

Norma: 1,5 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškama profilaktiškai, kai augalai pasiekia 25 cm aukštį arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams, 3 kartus 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-3

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų

Svogūnai

Puviniai

*Botrytis allii, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp., Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Pseudomonas spp.***Norma:** 1,5 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškiama profilaktiškai, kai augalai pasiekia 25 cm aukštį arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams, 2 kartus 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų*****Salotos***

Pilkasis kekerinis puvinys

Botrytis cinerea

Sklerotinis puvinys

*Sclerotinia sclerotiorum***Norma:** 1,5 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškiama profilaktiškai 1-2 savaitės po sodinimo. Priklausomai nuo ligų intensyvumo po 7-14 dienų purškimą kartokite. Produktas taip pat gali būti maišomas su fungicidais, turinčiais kitą veikimo mechanizmą.

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų*****Žirniai ir pupos (grūdams)***

Pilkasis kekerinis puvinys

Botrytis cinerea

Pupų rūdys

*Uromyces fabae***Norma:** 1,0 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-400 l/ha vandens. Lapų paviršius turi būti gerai padengtas tirpalu, kad apsaugotų nuo pupų rūdžių ir vėlyvos pilkojo kekerinio puvinio infekcijos. Purškiama profilaktiškai žydėjimo metu (BBCH 60-69) arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 21 diena*****Braškės***

Pilkasis kekerinis puvinys

Botrytis cinerea

Šviesmargė

Mycosphaerella fragariae

Miltligė

Sphaerotheca macularis

Braškių juodoji dėmėtligė

*Colletotrichum acutatum***Norma:** 1,8 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 500-1000 l/ha. Vandens naudoti tiek, kad purškiant būtų gerai padengiamas lapų ir uogų paviršius. Purškiama profilaktiškai 7-14 dienų intervalu nuo žydėjimo pradžios iki dauguma vaisių tampa baltos spalvos (BBCH 60-81).

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos**

Bulvės

Bulvių alternariozė

*Alternaria solani***Norma:** 0,2 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 250-1000 l/ha. Vandens naudoti tiek, kad purškiant būtų gerai padengtas lapų paviršius. Norint apsaugoti bulves nuo alternariozės, purškiama 2-4 kartus žydėjimo pradžioje, 7-14 dienų intervalu kartu su produktais nuo bulvių maro.

Didžiausias purškimų skaičius -4**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų*****Kaulavaisiai (vyšnios ir slyvos)***

Pilkasis kekerinis puvinys

Botrytis cinerea

Moniliozė

Monilinia laxa

Vaisių rudasis puvinys

Monilinia fructigena

Vyšnių kokomikoze

*Blumeriella jaapii***Norma:** 0,75 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 600-1000 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškiama 2 kartus žydėjimo pradžioje – vaisiaus nuspilvinimo pradžioje (BBCH 60-81) 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos*****Juodieji, raudonieji ir baltieji serbentai (iki derliaus nuėmimo)***

Deguliai

Gloeosporium ribis

Miltligė

Sphaerotheca mors-uvae

Kekerinis puvinys

*Botrytis cinerea***Norma:** 1 kg/ha Bigalo

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškiama 2 kartus žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 59 - 75) su 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-2**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos*****Juodieji, raudonieji ir baltieji serbentai (po derliaus nuėmimo)***

Šviesmargė

Septoria ribis

Deguliai

Gloeosporium ribis

Miltligė

Sphaerotheca mors-uvae

Kekerinis puvinys

*Botrytis cinerea***Norma:** 1,0 kg/ha Bigalo

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius-1**Paskutinis purškimas – nėra apribojimų.**

Avietės

Žievėplaiša
Kekerinis puvinys

Didymella applanata
Botrytis cinerea

Norma: 1,5 kg/ha Bigalo

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškama 2 kartus žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 60-81) su 10-14 dienų intervalu.

Didžiausias purškimų skaičius-2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos

Pušų sodmenys miško medelynuose

Pušų spygliakritis

Lophodermium spp.

Norma: 1,0 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha (didesnis vandens kiekis stambesniems ir tankesniems sodmenims). Purškama profilaktiškai, esant palankiems orams pušų spygliakričiui plisti. Nupurkšti sodmenys apsaugomi iki 2 savaitių.

Geriausiai pušų sodinukus apsaugosite, jei pakaitomis purškimui naudosite fungicidus, turinčius kitą veikimo būdą iš skirtingų fungicidų grupių.

Didžiausias purškimų skaičius – 3.

Paskutinis purškimas iki sodmenų iškasimo – nėra apribojimų

Sėkloms auginami špinatai

Stemfiliozė (juoduliai)
Juodligė (kladosporiozė)
Alternariozė (juodoji dėmėtligė)
Kekerinis puvinys

Stemphylium botryosum f. sp. spinacia
Cladosporium variabile
Alternaria spp.
Botrytis cinerea

Norma: 1,0 kg/ha Bigalo.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Pirmą kartą purškama birželio viduryje, kai špinatai pradeda žydėti (nuo BBCH 60), antrą kartą purškama po 10-14 dienų.

Didžiausias purškimų skaičius – 2

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – be apribojimų

Dėmesio!

Bigalo naudojimas žiediniams kopūstams, brokoliams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams, šakniniams salierams, sėkloms auginamiems špinatams, šiltnaminiams pomidorams ir baklažanams auginamiems šiltnamiuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Prašome atkreipti dėmesį!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bigalo yra sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų, boskalido ir piraklostrobino.

Boskalidas priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas 7). SDHI fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika.

Piraklostrobinas priklauso chinonų išorės inhibitorių (Qol) grupei (FRAC kodas 11).

Piraklostrobinui, kaip ir kitiems chinonų išorės inhibitorių grupės fungicidams, bendrai vertinant, būdinga didelė atsparumo atsiradimo rizika. Konkretiems patogenams, tokiems kaip *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria* atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip žema, o *Botrytis cinerea* – kaip didelė. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo arba bent jo nespirtinti, reikia laikytis atsparumo valdymo programos.

Bigalo turi būti naudojama profilaktiškai arba ankstyvosiuose ligos vystymosi tarpsniuose, pagal gamintojo rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku ir ne daugiau kartų nei nurodyta etiketėje prie kiekvieno augalo.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švriu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Bigalo (pilkite lėtai, kad produktas spėtų ištirpti) ir baikite pilti vandenį. Maišytuvas turi dirbti transportavimo ir purškimo metu. Permaišykite tirpalą po kiekvienos pertraukos. Tirpalas turi būti sunaudotas tuojau po jo paruošimo!

PURŠKIMAS

Nepurškite kai augalų augimas sulėtėjęs, temperatūra žemesnė nei +5 °C, laukiama šalnų, lietaus arba augalai yra stresinės būsenos (suvytę ir kt.).

MAIŠYMAS SU KITAIŠ PRODUKTAIS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. Bigalo mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius - kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines

(atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0.4 mm), chloropreno (0.5 mm), butilo (0.7 mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams dirbantiems šiuo produktu apdorotų kultūrų plotuose, rekomenduojama dėvėti pirštines, būtina ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 53378

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo 0 iki +30° C temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, saugoti, kad nedulkėtų, taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų

pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.