

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai
1. Degesch Magtoksino plokštelės / juostelės 56 % AS2-29FM(2016) Detia Freyberg GmbH 2027-11-30	magnio fosfidas 560 g/kg.	5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).	Grūdams, vaistažolėms, aliejinių augalų sėkloms, prieskoniams, kavai, kakavai, arbatai, nesupakuotiems ir supakuotiems, laikomiems sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, vaistažoles, aliejinių augalų sėklas, prieskonius, kavą, kakavą, arbatą galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kai PH3 koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).	Tabakui, supakuotam dėžėse, statinėse, ryšuliuose, laikomam sandariuose sandėliuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	
		5,5 g PH3 / 1 m3 (0,16 plokštelės / m3).	Riešutams, supakuotiems ir nesupakuotiems, laikomiems	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros:	

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
			sandariuose sandėliuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.		5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Riešutus galima naudoti ne anksčiau kaip po 21 dienos, pistacijas – ne anksčiau kaip po 35 dienų.	
		5,5 g PH ₃ / 1 m ³ (0,16 plokštės / m ³).	Tuščioms saugykloms.	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	
2.	Detia-Gas-Ex B Detia Freyberg GmbH AS2-38FM(2016), 2027-11-30	aliuminio fosfidas 570 g/kg	5–10 g PH ₃ /1 m ³ (0,45 – 0,9 maišelio/m ³).	Grūdai, džiovinti vaisiai ir daržovės, aliejinių augalų sėklos, laikomi nesusipakuoti sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
					aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (0,45–0,9 maišelio/m ³).	Grūdai, džiovinti vaisiai ir daržovės, aliejinių augalų sėklos, laikomi sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (0,45–0,9 maišelio/m ³)	Tabakas, supakuotas dėžėse, statinėse, ryšuliuose, laikomas sandariuose sandėliuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (0,45–0,9	Tuščios saugyklos	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai	
		maišelio/m ³).			laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.	
		3–5 g PH ₃ /1 m ³ (0,27 – 0,45 maišelio/m ³).	Grūdai, transportuojami laivuose	Kenkėjai	Fumiguoti 21 dieną, ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti, kol PH ₃ koncentracija nukris iki 0.01 ppm, grūdus naudoti galima ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C.	
		20 g	Lauko, sodo, daržo, dekoratyvinių augalų auginimo plotai, pievos	Atbaido kurmius	Į kurmio urvą įdėti keturis maišelius, po to angą uždengti		
3.	Magtoxin tabletės Detia Degesh GmbH, AS2-15FM/2016, 2027-11-30	Magnio fosfidas 66%	5g PH ₃ / 1 m ³	Grūdai, pupų ir žirnių sėklos, laikomi nesupakuoti kaupuose ir grūdų talpyklose (bokštuose) po dujoms nepralaidžiu brezentu.	Sandėlių kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12oC – 7 dienos, 13–15oC – 5 dienos, 16–20oC – 4 dienos, virš 20oC – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai
		5g PH ₃ / 1 m ³	Grūdai, pupų ir žirnių sėklos, laikomi supakuoti į maišus ant padėklų.	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12oC – 7 dienos, 13–15oC – 5 dienos, 16–20oC – 4 dienos, virš 20oC – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5g PH ₃ / 1 m ³	Grūdai, transportuojami nesupakuoti geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose.	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12oC – 7 dienos, 13–15oC – 5 dienos, 16–20oC – 4 dienos, virš 20oC – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5g PH ₃ / 1 m ³	Tabakas dėžėse, statinėse, ryšuliuose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12oC – 7 dienos, 13–15oC – 5 dienos, 16–20oC – 4 dienos, virš 20oC – 3 dienos); ne daugiau kaip 1	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5oC ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai	
					kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.		
		5g PH ₃ / 1 m ³	Medienos rąstai konteineriuose, vagonuose, uždaroje patalpose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 7 dienos, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Rąstus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė 5°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.	
4.	Phostoxin tabletės Detia Freyberg GmbH AS2-37FM(2016) 2027-11-30	aliuminio fosfidas 560 g/kg	5–10 g PH ₃ /1 m ³ (5–10 tablečių/m ³)	Grūdai, džiovinti vaisiai ir daržovės, aliejinių augalų sėklos, laikomi nesupakuoti	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai
			sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose		13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (5–10 tablečių/m ³)	Grūdai, džiovinti vaisiai ir daržovės, aliejinių augalų sėklos, laikomi sandariuose sandėliuose, grūdų laikymo bokštuose, geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos); ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Grūdus, džiovintus vaisius ir daržoves, aliejinių augalų sėklas galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (5–10 tablečių/m ³)	Tabakas, supakuotas dėžėse, statinėse, ryšuliuose, laikomas sandariuose sandėliuose, geležinkelio	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos),	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai	
			vagonuose ir jūriniuose konteineriuose		ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., tabaką galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.		
		5–10 g PH ₃ /1 m ³ (0,45–0,9 maišelio/m ³).	Tuščios saugyklos	Kenkėjai	Fumiguoti 3–7 dienas (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12 °C – 7 dienos, 13–15 °C – 5 dienos, 16–25 °C – 4 dienos, virš 25 °C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.	
		3–5 g PH ₃ /1 m ³ (3–5 tabletės/m ³)	Grūdai, transportuojami laivuose	Kenkėjai	Fumiguoti 21 dieną, ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti, kol PH ₃ koncentracija nukris iki 0.01 ppm, grūdus naudoti galima ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau, kaip PH ₃ koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5 °C.	
5.	Quickphos Pellets 56 GE UPL Holdings Cooperatief U.A. AS2-49FM(2021) 2027-11-30	Aliuminio fosfidai 560 g/kg	15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³) naudojant 1 kartą, 45 granulių/m ³ (15 g fosfino/m ³) naudojant 3 kartus.	Grūdai (kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, spelta, avižos, ryžiai) nesupakuoti kaupuose ir grūdų talpyklose arba laikomi supakuoti į maišus ant padėklų.	Kenkėjai	Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25 °C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos)	Norma: 15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³) naudojant 1 kartą, 45 granulių/m ³ (15 g fosfino/m ³) naudojant 3 kartus. Maksimalus apdorojimų skaičius – 3 kartai, minimalus intervalas tarp apdorojimų –56 dienos. Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei 5

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai
						°C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³)	Grūdai (Kukurūzų grūdai, sorai, sorgų grūdai, grikiai, pupų, žirnių, leščių, lubinų sėklos, kvietiniai miltai ir kviečių sėlenos), laikomi supakuoti į maišus ant padėklų arba nesupakuoti kaupose ir grūdų talpyklose	Kenkėjai	Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25 °C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą.	Norma: 15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³). Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³)	Rapsai	Kenkėjai	Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25 °C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą. Vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	Norma: 15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³). Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³)	Džiovinami vaisiai ir prieskoniniai, kavos pupelės, arbata, kakavos pupelės, laikomi supakuoti į maišus ant padėklų.	Kenkėjai	Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25 °C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą. Vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	Norma: 15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³). Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.
		15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³)	Neapdorotas tabakas, supakuotas į dėžes, rulonus, maišus.	Kenkėjai	Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25	Norma: 15 g granulių/m ³ (5 g fosfino/m ³). Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdoravimo būdas	Naudojimo apribojimai	
		15 g granuliu/m ³ (5 g fosfino/m ³)	Tuščios saugyklos	Kenkėjai	°C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos, ne daugiau kaip 1 kartą. Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Fumiguoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros: 10-15 °C – 14 dienų, 16-25 °C – 7 dienos, 26-35 °C – 5 dienos	zonoje temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc. Norma: 15 g granuliu/m ³ (5 g fosfino/m ³) naudojant 1 kartą, 45 granuliu/m ³ (15 g fosfino/m ³) naudojant 3 kartus. Vėdinti ne mažiau kaip 48 val. Nefumiguoti, jei fumigavimo zonoje temperatūra žemesnė nei 5 °C ir oro drėgnis didesnis nei 60 proc.	
		2-3 granulės / 2-3 metrams požeminio urvo. Didžiausia naudojimo norma – 0.6 g / 1 metrui požeminio urvo arba 300 g/ha.	Apsaugai nuo kurmių ir pelėnų dirbamuose pasėliuose	<i>Arvicola terrestris</i> (ARVCTE)	Panaudojus granules, anga turi būti uždengiama velėna, medžio gabalu, akmeniu arba žemės grumstu. Pelėnų iškasti požeminiai urvai turi būti gerai užsandarinti.	Pakartotinai naudoti galima praėjus nuo 3 iki 10 dienų po pirmojo panaudojimo.	
6.	Quickphos Tablets 56 GE UPL Holdings Cooperatief U.A. AS2-48FM(2021) 2027-11-30	Aliuminio fosfidas 560 g/kg	4–5g PH ₃ / 1 t grūdų	Grūdai nesupakuoti kaupuose ir grūdų talpyklose	Kenkėjai	Fumiguojama 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 10 dienų, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3	Įeiti į patalpas po išvėdinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
					dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų	
		4–5g PH ₃ / 1 t grūdų	Grūdai supakuoti į maišus ant padėklų	Kenkėjai	Fumiguojama 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 10 dienų, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.
		2–5g PH ₃ / 1 t grūdų	Grūdai nesupakuoti geležinkelio vagonuose ir jūriniuose konteineriuose	Kenkėjai	Fumiguojama 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 10 dienų, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris, registracijos galiojimo laikas	Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma	Apdorojami objektai	Kenkėjai	Apdorojimo būdas	Naudojimo apribojimai
		2–5g PH ₃ / 1 t grūdų	Tuščios saugyklos	Kenkėjai	Fumiguojama 3–10 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros: 5–12°C – 10 dienų, 13–15°C – 5 dienos, 16–20°C – 4 dienos, virš 20°C – 3 dienos), ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.
		2–4g PH ₃ / 1 t grūdų	Grūdai transportuojami laivuose	Kenkėjai	Fumiguojamai 9–15 dienų (minimalus fumigacijos laikas priklauso nuo supilto produkto aukščio: mažiau 6 metrų – 9 dienos, 6–12 metrų – 15 dienų), naudojant nedegius padėklus ar dujoms pralaidžius maišelius; ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.
		1,5-2g PH ₃ / 1 t grūdų	Grūdai transportuojami laivuose	Kenkėjai	Fumiguojamai 3,5 dienas, naudojant recirkuliacijos sistemą; ne daugiau kaip 1 kartą, vėdinti ne mažiau kaip 48 val., grūdus galima naudoti ne anksčiau kaip po 7 dienų.	Įeiti į patalpas po išvedinimo galima ne anksčiau kaip, kai PH ₃ koncentracija nukris žemiau 0,01 ppm. Nefumiguoti, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 5°C.

* - Dirbti su fumigantais gali tik specialiai apmokytas personalas, turintis tą patvirtinančius dokumentus, įrangą ir darbų saugos priemones.

Importuoti, platinti ir naudoti fumigantus galima tik turint atitinkamus leidimus (pagal 2002 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.302 „Dėl leidimų įsigyti parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimo taisyklių patvirtinimo).