

Lentagran® WP

Veiklioji medžiaga: piridatas 450 g/kg (45 %)

Produkto forma: šlammantys milteliai vandenyje tirpstančiuose maišeliuose.

Lentagran® WP - selektyvaus veikimo, fenilpiridazinių junginių cheminės klasės kontaktinis herbicidas. Naudojamas baltagūžiuose, raudongūžiuose, garbanotuose (Savojos), lapiniuose, pašariniuose, žiediniuose, Briuselio kopūstuose, brokoliuose, svogūnuose auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, laiškiniuose svogūnuose, poruose, kalioropėse, smidruose, visų tipų žirniuose (vartojamuose su ankštimis ir be jų) vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui.

Česnakuose, askaloniniuose česnakuose, morkose, lęšiuose, avinžirniuose ir lubiniuose Lentagran WP registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti rūko/ garų/ aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina naudoti 50 % dulksną mažinančią įrangą arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

24-ias valandas skubios pagalbos telefonas: +32 14 58 45 45.

Pakuotė: 0,2 kg, 1,0 kg

Registracijos Nr.: AS2-7H(2023)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 1 metai.

Registracijos savininkas:
 CERTIS BELCHIM B.V.
 Stadsplateau 16,
 NL-3521 AZ Utrecht, Olandija
 Tel.: +31 30 200 1200
www.certisbelchim.com

Marketingo kompanija:
 NORDISK ALKALI AB
 Krusegatan 19A,
 SE-212 25 Malmö, Švedija
 Tel.: +370 648 93200
www.nordiskalkali.lt

Importuotajai/ platintojai:
 UAB BALTIC AGRO
 Ukmergės g. 322,
 LT-12106 Vilnius, Lietuva
 Tel.: +370 5 2701187
www.balticagro.lt

UAB AGRIMATCO VILNIUS
 S. Lozoraičio g. 19A,
 LT-53228 Garliava, Kauno r., Lietuva
 Tel.: +370 614 53256
www.agrimatco.lt

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO
 NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMAS

Lentagran WP – kontaktinis herbicidas, naudojamas vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui baltagūžiuose, raudongūžiuose, garbanotuose (Savojos), lapiniuose, pašariniuose, žiediniuose, Briuselio kopūstuose, brokoliuose, svogūnuose auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, laiškiniuose svogūnuose, poruose, kalioropėse, smidruose ir visų tipų žirniuose. Česnakuose, askaloniniuose česnakuose, morkose, lešiuose, avinžirniuose ir lubinuose Lentagran WP registruotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr.1107/2009 51 straipsnį.

Herbicidas naikina jaunas, gerai augančias piktžoles. Purškimo metu augalai ir piktžolės turi būti sausi. Optimalūs rezultatai pasiekiami, kai purškiamo metu visos piktžolės būna sudrygusios. Keletą valandų po purškimo praėjęs lietus neturi neigiamo poveikio herbicido efektyvumui.

Tirpalo kiekis: 200-400 l/ha.

Lentagran WP 2,0 kg/ha normos veiksmingumas:

| | |
|---|---|
| Labai jautrios ir jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-100%) | Šiurkštusis burnotis (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Plačioji balandūnė (<i>Atriplex patula</i>) Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) Gausiasėklė balanda (<i>Chenopodium polyspermum</i>) Vaistinė žvirbliarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>) Smulkiažiedė galinzoga (<i>Galinsoga parviflora</i>) Kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>) Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>) Vaistinė ramunė (<i>Matricaria recutita</i>) Vienametis laiškėnis (<i>Mercurialis annua</i>) Paprastoji žilė (<i>Senecio vulgaris</i>) Pienės (<i>Sonchus sp.</i>) |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | Juodoji kliauliuogė (<i>Solanum nigrum</i>) Dirvinė veronika (<i>Veronica arvensis</i>) |
| Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%) | Dirvinis bobramunis (<i>Anthemis arvensis</i>) Dirvinė krapažolė (<i>Euphorbia helioscopia</i>) Snapučiai (<i>Geranium sp.</i>) Apskritalapė notrelė (<i>Lamium amplexicaule</i>) Daržinė žliugė (<i>Stellaria media</i>) |
| Vidutiniškai atsparios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%) | Smalkinis tvertikas (<i>Erysimum cheiranthoides</i>) Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>) Trumpamakštis rūgtis (<i>Persicaria lapathifolia</i>) Dėmėtasis rūgtis (<i>Persicaria maculosa</i>) Dirvinis garstukas (<i>Sinapis arvensis</i>) Dirvinė čiuzutė (<i>Thlaspi arvense</i>) Persinė veronika (<i>Veronica persica</i>) Dirvinė našlaitė (<i>Viola arvensis</i>) |

| Kultūra | Maksimali vienkartinė norma kg/ha | Maksimali norma per sezoną kg/ha | Apdorojimo laikas | Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo |
|--|--|---|--|--|
| Baltagūžiai, raudongūžiai, garbanotieji, lapiniai, pašariniai, briuseliniai kopūstai | 2,0 | 2,0 | 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 | 42 dienos |
| Žiediniai kopūstai, brokoliai | 1,0 | 2,0 | 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 | 42 dienos |
| Svogūnai, auginami iš sėklų ir sėjinukų | 1,0 | 2,0 | BBCH 11-14 | 56 dienos |
| Laiškiniai svogūnai | 1,0 | 2,0 | Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3 cm) | 28 dienos |
| Porai | 2,0 | 2,0 | Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3 cm) | 28 dienos |
| Česnakai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 2,0 | 2,0 | Po pasodinimo aiškiai matomas trečias lapas (>3 cm) | 56 dienos |

| | | | | |
|---|-----|-----|--|-----------|
| Askaloniniai česnakai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 1,0 | 2,0 | BBCH 11-14 | 56 dienos |
| Morkos (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 0,5 | 1,0 | Nuo 2 iki 6 tikrųjų lapelių BBCH 12-16 | - |
| Kaliaropės | 2,0 | 2,0 | 2-4 savaitės po pasodinimo arba BBCH 14-16 | 42 dienos |
| Smidrai (senesniuose nei 2 m. augaluose) | 2,0 | 2,0 | 1) Prieš sudygimą 2) Po derliaus nuėmimo (purkšti po lapais) | - |
| Naujai pasodinti smidrai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 1,0 | 2,0 | Nuo BBCH 21 | - |
| Visų tipų žirniai (vartojami su ankštimis ir be jų) | 1,0 | 1,0 | Purkšti po sudygimo nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) | - |
| | 0,5 | 1,0 | Purkšti po sudygimo du kartus: nuo 1 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 11-16) | - |
| Lubinai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 1,0 | 1,0 | Purkšti po sudygimo nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) arba Purkšti po | - |

| | | | | |
|--|-----|-----|---|---|
| | 0,5 | 1,0 | sudygimo du kartus išlaikant 7 dienų intervalą nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) | |
| Avinžirniai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 1,0 | 1,0 | Purkšti po sudygimo nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) arba Purkšti po sudygimo 2 kartus išlaikant 7 dienų intervalą nuo 1 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 11-16) | - |
| | 0,5 | 1,0 | | - |
| Lęšiai (pagal Reglamento Nr.1107/2009 51 straipsnį) | 1,0 | 1,0 | Purkšti po sudygimo nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) arba Purkšti po sudygimo du kartus išlaikant 7 dienų intervalą nuo 3 iki 6 lapelių tarpsnio (BBCH 13-16) | - |
| | 0,5 | 1,0 | | - |

Baltagūžuose, raudongūžuose, garbanotuose, lapiniuose, pašariniuose ir briuselinuose kopūstuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2-4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turi 4-6 lapelius.

Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas ir augimo sulėtėjimas. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 6-8 savaičių ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.

Norma: 0,5-2,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Normą išpurškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Žiediniuose kopūstuose ir brokoliuose herbicidas purškiamas po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikruosius lapelius. Iš daigų auginami augalai purškiami 2-4 savaitės po pasodinimo, prigiję ir turintys 4-6 lapelius.

Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas ir augimo sulėtėjimas. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 6-8 savaičių ir neturi įtakos derliui ir jo kokybei.

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Purškiant du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Svogūnuose, auginamuose iš sėklų ir sėjinukų, askaloniniuose česnakuose purškiama po sudygimo, 1-4 lapelių tarpsnyje. Tuoj po purškimo gali pasireikšti lapų pageltimas, augimo sulėtėjimas. Esant ypač nepalankiom sąlygoms, gali atsirasti nekrozės požymių. Šie simptomai yra laikini, visiškai išnyksta po 8 savaitių ir neturi įtakos augalų skaičiui, derliui ir jo kokybei. Siekiant geriausių rezultatų, po svogūnų sėjos iki jų sudygimo rekomenduojama naudoti dirvinį herbicidą, po to purkšti Lentagran WP.

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 3. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Tarp purškimų būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą.

Česnakuose ir laiškiniuose svogūnuose purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio (BBCH 13) ant sudygusių piktžolių.

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Purškiant du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Morkose purškiama, nuo 2 iki 6 tikrųjų lapelių tarpsnio (BBCH 12-16) ant sudygusių piktžolių, vieną kartą 0,5 kg/ha norma arba 2 kartus po 0,5 kg/ha. Antrą purškimą galima atlikti praėjus 7 dienoms po pirmojo purškimo.

Norma: 0,5 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1 kg/ha.

Poruose purškiama po sudygimo, trijų lapelių tarpsnyje, arba po daigų pasodinimo. Jei po sėjos ar daigų pasodinimo buvo naudotas dirvinis herbicidas, Lentagran WP naudojamas, kai sudygsta nauja piktžolių banga (daugiausiai 4 lapelių tarpsnio).

Norma: 0,5-2,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Purškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Kaliaropės purškiamos po sudygimo, kai augalai turi pilnai išsiskleidusius 4 tikrus lapelius. Iš daigų auginamos kaliaropės purškiamos 2 savaitės po pasodinimo iki 6 lapelių tarpsnio.

Norma: 0,5-2,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 2,0 kg/ha.

Purškiant per du kartus būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų.

Smidrai (senesni nei 2 m.) purškiami iki sudygimo arba po derliaus nuėmimo. Purškiant po derliaus nuėmimo reikia vengti tirpalo patekimo ant smidrų stiebų ir lapų. Geriausia purkšti, kai visos piktžolės sudygusios.

Norma: 0,5-2,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Smidrai (naujai pasodinti) purškiami nuo BBCH 21 tarpsnio du kartus, ne didesne kaip 1 kg/ha norma.

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Visų tipų žirniai (vartojami su ankštimis ir be jų) vienkartinė 0,75-1,0 kg/ha norma purškiami po sudygimo, kai žirniai turi tris-šešis lapelius (BBCH 13-16).

Jei purškama per du kartus 0,5 + 0,5 kg/ha norma, tuomet būtina išlaikyti 7-14 dienų intervalą tarp purškimų ir purkšti kuomet žirniai turi 1-6 lapelius (BBCH 11-16).

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1,0 kg/ha.

Lėšiai vienkartinė 1,0 kg/ha norma purškiami po sudygimo, kai turi tris-šešis lapelius (BBCH 13-16).

Jei purškama per du kartus 0,5 + 0,5 kg/ha norma, tuomet būtina išlaikyti 7 dienų intervalą tarp purškimų ir purkšti kuomet lėšiai turi 3-6 lapelius (BBCH 13-16).

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1,0 kg/ha.

Avinžirniai vienkartinė 1,0 kg/ha norma purškiami po sudygimo, kai turi tris-šešis lapelius (BBCH 13-16).

Jei purškama per du kartus 0,5 + 0,5 kg/ha norma, tuomet būtina išlaikyti 7 dienų intervalą tarp purškimų ir purkšti kuomet avinžirniai turi 1-6 lapelius (BBCH 11-16).

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1,0 kg/ha.

Lubinai vienkartinė 1,0 kg/ha norma purškiami po sudygimo, kai turi tris-šešis lapelius (BBCH 13-16).

Jei purškama per du kartus 0,5 + 0,5 kg/ha norma, tuomet būtina išlaikyti 7 dienų intervalą tarp purškimų ir purkšti kuomet lėšiai turi 3-6 lapelius (BBCH 13-16).

Norma: 0,5-1,0 kg/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 2. Per sezoną neviršyti 1,0 kg/ha.

Lentagran WP 1,0 kg/ha normos veiksmingumas:

| | |
|---|--|
| Labai jautrios ir jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-100%) | Dirvinė čiužutė (<i>Thlaspi arvense</i>) |
| Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%) | Daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>) |
| Mažai jautrios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%) | Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>) Kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>) Trikerė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) |

Lentagran WP 2x 0,5 kg/ha normos veiksmingumas:

| | |
|---|---|
| Labai jautrios ir jautrios piktžolės (veiksmingumas 85-100%) | Daržinė žliūgė (<i>Stellaria media</i>) Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>) Smulkusis snaputis (<i>Geranium pusillum</i>) Dirvinė čiužutė (<i>Thlaspi arvense</i>) |
| Vidutiniškai jautrios piktžolės (veiksmingumas 70-84,9%) | Apskritalapė notrelė (<i>Lamium amplexicaule</i>) |

| | |
|--|---|
| Mažai jautrios piktžolės (veiksmingumas 50-69,9%) | Baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) Kibusis lipikas (<i>Galium aparine</i>) Vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>) Trikertė žvaginė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) |
|--|---|

Naudojimas mažais plotais auginamiems augalams

Lentagran WP įregistruotas česnakams, askaloniniams česnakams, naujai pasodintiems smidrams, morkoms, lęšiams, avinžirniams ir lubinams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį česnakams, askaloniniams česnakams, naujai pasodintiems smidrams, morkoms, lęšiams, avinžirniams ir lubinams prisiima produkto naudotojas.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įdėti reikiamą Lentagran WP kiekį (neatidaryti vandenyje tirpaus maišelio). Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti, maišyklė turi dirbti viso purškimo metu.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai:

- tirpalo ir oro temperatūra yra žemesnė nei +10° C,
- naktimis temperatūra nukrinta žemiau +2° C,
- oro temperatūra aukštesnė nei +25° C,
- vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Fitotoksiškumas žirniams:

- Nepurkšti Lentagran WP silpnų, stresuojančių augalų (dėl ekstremalių temperatūrų pokyčių, užmirkimo, sausros, mechaninių pažeidimų);
- Nepurkšti Lentagran WP vėliau nei rekomenduojama etiketėje (BBCH 11-16);
- Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.

Dėmesio!

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

SĖJOMAINA

Po derliaus nuėmimo ar dėl kokių nors priežasčių žuvus pasėliui, nėra taikomi jokie sėjomaininiai apribojimai. Žemės dirbimas nėra būtinas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Lentagran 45 WP sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga - piridatas, priklausantis fenilpiridazinu cheminei grupei. Pagal veikimo pobūdį piridatas yra fotosintezės inhibitorius (HRAC kodas 6).

Atsparumo išsivystymo rizika piridatui yra vertinama kaip maža, tačiau bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai,

atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės šių rekomendacijų:

1. Kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz.: sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);
2. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
3. Naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
4. Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis;
5. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

MAIŠYMAS

Dėl Lentagran WP maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Lentagran WP mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvu talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Dėl didelio kai kurių augalų jautrumo net ir mažiems Lentagran WP kiekiams, labai svarbu prieš ruošiant tirpalą ir po darbo kruopščiai išplauti purkštuvą taikant tokią procedūrą:

1. Visiškai ištuštinkite purkštuvu talpą apdorotame lauke.
2. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai.
3. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvu talpą švariu vandeniu. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvu talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandeniį išleiskite pro vamzdynus. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės, pvz., ALL CLEAR EXTRA. Plovimui panaudotą vandenį išpurškite ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti uždarytą originalioje pakuotėje, gerai vėdinamose patalpose. Saugoti nuo užšalimo, šviesos ir drėgmės. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines

(atitinkančias standartą EN 374): pvz., chloropreno, butilo, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pvz.: ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.