

# CASINO ROYALE

## FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: boskalidas 26,7% (267 g/kg)

piraklostrobinas 6,7% (67 g/kg)

Produkto forma: vandenyje disperguojančios granulės (WG)

Sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas skirtas cukrinių runkelių, morkų, svogūnų, pomidorų, burokėlių, šakninių salierų, pastarnokų, petražolių, ridikų, krienų, griežčių, ropių, šakninių cikorijų, valgomųjų svogūnėlių (Shallot svogūnų), baklažanų, valgomųjų pūtelėlių, dekoratyvinių augalų lauke ir šiltnamyje apsaugai nuo grybinių ligų.

### Skirtas profesionaliajam naudojimui



### ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 75 % dulksną mažinančius purkštukus arba 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus, arba 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant cukrinius runkelius, morkas, svogūnus, pomidorus, burokėlius, šakninius salierus, pastarnokus, petražoles, ridikus, krienus, griežčius, ropes, šaknines cikorijas, valgomuosius svogūnėlius (Shallot svogūnus), baklažanus ir valgomuosius pūtelius. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 % dulksną mažinančius purkštukus arba 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 75 % dulksną mažinančius purkštukus, arba 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus purškiant dekoratyvinius augalus lauke, kai vienkartinė purškimo norma 0,18 kg/ha. Jei žemės paviršiaus

nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais ir naudoti 50 % dulksną mažinančius purkštukus.

**Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba 8 687 53378**

**Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112**

Pakuotė: 0.15 kg, 0.3 kg 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg

Registracijos numeris: AS2-54F(2023).....

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai

**Registracijos savininkas:**

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center

Carril Condomina nº 3, Planta 12,

30006 Murcia, Ispanija

Tel.: +34 868 12 75 89

el. paštas: [eu.regn@shardaintl.com](mailto:eu.regn@shardaintl.com)

**Atstovas Lietuvoje / platintojas:**

UAB „Scandagra” Biochemiku g. 6,

LT-57234, Kedainiai, Lietuva,

Tel/fax: (8 347) 41551

UAB “Agrochema”

Jonalaukio k, Ruklos sen LT-55296 Jonavos r.

Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:

[info@agrochema.lt](mailto:info@agrochema.lt)

[www.agrochema.lt](http://www.agrochema.lt)

AB “Linus Agro”

Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva

Tel.: +370 45 507354

Faks.: +370 45 507351

[www.linusagro.lt](http://www.linusagro.lt)

UAB “Agrokoncernas”,

Vėrupės g. 1, Babtų km, 54328 Kauno r.

Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8 37 488244

[info@agrokoncernas.lt](mailto:info@agrokoncernas.lt)

UAB “Agrodema”

Žirmūnų g. 139

LT-09120 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 52402291

[info@agrodema.lt](mailto:info@agrodema.lt)

[www.agrodema.lt](http://www.agrodema.lt)

UAB „Žvalguva”

Metalistų g. 6, Šiauliai  
LT-78107, Lietuva  
+370 69 803 587  
[info@zvalguva.lt](mailto:info@zvalguva.lt)

## **PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

**Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.**

### **NAUDOJIMAS**

#### **Augalai:**

#### ***Cukriniai runkeliai***

Rudmargė (*Cercospora beticola*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 31-39 (Nuo tarpueilių dengimo lapais pradžios, kai lapai dengia 10 proc. tarpueilių iki tarpueiliai uždengti, kuomet lapai dengia 90 proc. tarpueilių).

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

#### **Didžiausias purškimų skaičius-1**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

**MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS** Morkoms, svogūnams, pomidorams, burokėliams, šakniniams salierams, pastarnokams, petražolėms, ridikams, krienams, griežčiams, ropėms, šakninėms cikorijoms, valgomųjų svogūnėlių (*Shallot* svogūnų), baklažanams, valgomiesiems pūteliams, dekoratyviniams augalams, auginamiems lauke ir šiltnamyje,

#### ***Morkos***

Alternariozė (*Alternaria* spp.)

Morkų cercosporozė (rudmargė) (*Cercospora* spp.)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 41-49 (Purškama šaknims esant didesnėms nei 0,5 cm skersmens iki pilnai išsivysto ir pasiekia būdingą 3 formą ir dydį)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8 dienų.

#### **Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

#### ***Svogūnai***

Svogūnų rūdys (*Puccinia allii*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 41-49 (Lapo pagrindas pradeda storėti, platėti iki būna visi lapai sunykę, ropelės visiškai sausos)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Pomidorai***

Maras (fitoftorozė) (*Phytophthora infestans*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-87 ((Purškšti vegetacijos metu, kai matomas pirmas antros eilės viršūnės šoninis ūglis iki kol 70% vaisių pasiekia būdingą spalvą)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-10 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 3 dienos**

***Burokėliai***

Runkelių miltligė (*Erysiphe betae*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,0 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purškšti kai augalai pradeda dengti tarpueilius iki kol šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Šakninia salierai***

Sklerotinis puvinys (*Sclerotinia sclerotiorum*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Pastarnokai, petražolės***

Alternariozė (*Alternaria* spp. *Alternata*)

Miltligė (*Erysiphe heraclei*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 0,75 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 600-800 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 21-28 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Ridikai***

Kekerinis puvinys (*Botrytis cinerea*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purkšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14-21 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### ***Krienai***

Netikroji miltligė (Peronospora sp.)

Alternariozė (Alternaria spp.)

Miltligė (Erysiphe sp.)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purkšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14-21 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### ***Griežčiai***

Netikroji miltligė (Peronospora sp.)

Rudmargė (Cercospora beticola)

Miltligė (Erysiphe sp.)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,0 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purkšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### ***Ropės***

Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea)

Baltoji kojelė (Rizoktoniozė) (Rhizoctonia solani (syn.Thanatephorus cucumeris))

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purkšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-49 (Purkšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama būdinga forma ir dydis)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14-21 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### ***Šakninės cikorijos***

Alternariozė (Alternaria cichorii)

Rūdys (*Puccinia* spp.)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-47 (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama 70% būdingos formos ir dydžio)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14-21 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Valgomieji svogūnėliai (Shallot svogūnai)***

Svogūnų netikroji miltligė (*Peronospora destructor*)

Alternariozė (*Alternaria cichorii*)

Stemfiliozė (juodasis pelėsis, juoduliai) (*Stemphylium*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,0 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-48 (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol 50% lapų būna nulinkę)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

***Baklažanai***

Maras (*Phytophthora infestans*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-87 (Purškšti vegetacijos metu, kai matomas pirmas ūglis iki kol 70% vaisių pasiekia būdingą spalvą)

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-10 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 3 dienos**

***Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamyje***

Alternariozė (*Alternaria* spp)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 0,1 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-47. (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama 70% būdingos formos ir dydžio)

Rekomenduojamas vandens kiekis 100 l/ha

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

***Dekoratyviniai augalai lauke ir šiltnamyje***

Miltligė (*Erysiphe* spp.)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 0,18 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Naudojimo laikas: BBCH 30-47. (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekama 70% būdingos formos ir dydžio)

Rekomenduojamas vandens kiekis 100 l/ha  
Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-14 dienų.  
**Didžiausias purškimų skaičius-2**

***Dekoratyvieniai augalai lauke ir šiltnamyje***

Kekerinis puvinys (*Botrytis cinerea*)  
Sklerotinis puvinys (*Sclerotinia sclerotiorum*)  
Baltoji kojelė (*Rizoktoniozė*) (*Rhizoctonia solani* (*Thanatephorus cucumeris*))

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 0,15 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.  
Naudojimo laikas: BBCH 35-47. (Purškšti nuo vegetatyvinių dalių vystymosi iki kol pasiekiamas 70% būdingos formos ir dydžio)  
Rekomenduojamas vandens kiekis 100 l/ha  
Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-14 dienų.  
**Didžiausias purškimų skaičius-2**

***Valgomasis pūtelis***

Kekerinis puvinys (*Botrytis cinerea*)  
Sklerotinis puvinys (*Sclerotinia sclerotiorum*)  
Baltoji kojelė (*Rizoktoniozė*) (*Rhizoctonia*)

**Didžiausia/rekomenduojama vienkartinė norma:** 1,5 kg/ha

Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.  
Naudojimo laikas: BBCH 41-49. (Purškžiama šaknims esant didesnėms nei 0,5 cm skersmens iki pilnai išsivysto ir pasiekia būdingą 3 formą ir dydį)  
Rekomenduojamas vandens kiekis 300-600 l/ha  
Purškimą, esant reikalui, kartokite po 8-10 dienų.  
**Didžiausias purškimų skaičius-2**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.**

**ATSAKOMYBĖ**

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

**MAIŠYMAS SU KITAIŠ PRODUKTAIS**

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.  
CASINO ROYAL mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

**ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

CASINO ROYAL yra sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų, boskalido ir piraklostrobino.  
**Boskalidas** priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC 7 grupė). SDHI fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika.  
**Piraklostrobinas** priklauso chinonų išorės inhibitorių (Qol) grupei (FRAC grupė 11). Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo arba bent jo nespirtinti, reikia laikytis atsparumo valdymo programos.  
CASINO ROYAL turi būti naudojama profilaktiškai arba ankstyvuosiuose ligos vystymosi tarpsniuose, nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku ir ne daugiau kartų nei nurodyta etiketėje prie kiekvieno augalo.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

### **TIRPALO PARUOŠIMAS**

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švari vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį CASINO ROYAL (pilkite lėtai, kad produktas spėtų ištirpti) ir baikite pilti vandenį. Maišytuvą turi dirbti transportavimo ir purškimo metu. Permaišykite tirpalą po kiekvienos pertraukos. Tirpalas turi būti sunaudotas tuojau po jo paruošimo!

### **NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Nepurškite kai augalų augimas sulėtėjęs, temperatūra žemesnė nei +5° C, laukiama šalnų, lietaus arba augalai yra stresinės būsenos (suvytę ir kt.).

### **SAUGOS PRIEMONĖS**

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės).

**Purškiant lauko purkštuvais** ar nugariniais purkšuvais šiltamiuose, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. **Purškiant** nugariniais purkšuvais šiltamiuose būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams**, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams dirbantiems šiuo produktu apdorotų kultūrų plotuose, būtina dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.

**Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus** operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

**Higienos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

### **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 53378**

### **PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS**

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas.

### **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Saugokite, kad nedulkėtų. Nelaikykite ant tiesioginių saulės spindulių, šalia karštų paviršių. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose patalpose ir tik originalioje taroje temperatūroje nuo 0 iki +30° C.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Tuščią pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

### **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.