KINVARA

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: MCPA 233 g/l (20,69 %) + fluroksipiras 50 g/l (4,44 %) + klopiralidas 28 g/l (2,49 %)
Produkto forma: mikroemulsija

KINVARA – sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti vasarinių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių avižų, žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose, taip pat javų pasėliuose su miglinių žolių įsėliu, dviskilčių piktžolių ploteliams miglinių žolių sėkliniuose pasėliuose bei miglinių žolių pievose ir ganyklose naikinti.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu akių dirgimas nepraeina: kreiptis į gydytojus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Dėmesio! Darbuotojams ruošiantiems ruloninę veją į purkštus plotus galima įeiti tik praėjus 15 dienų.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, savo sudėtyje turinčio klopiralido dažniau kaip kas antrus metus tame pačiame lauke, jei buvo purkšti žieminiai kviečiai arba pirmametės miglinių žolių pievos ir ganyklos ar miglinių žolių sėkliniai pasėliai.
Siekiant apsaugoti dirvos organizmus nenaudoti šio ar kito augalų apsaugos produkto, savo sudėtyje turinčio fluroksipiro dažniau kaip kas antrus metus tame pačiame lauke, jei buvo purkštos pirmametės miglinių žolių pievos ir ganyklos ar miglinių žolių sėkliniai pasėliai.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną

mažinančius purkštukus arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 2,05 arba 2,5 l/ha.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai naudojimo norma yra 1,83 l/ha.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Registracijos numeris: AS2-54H(2025)
Partijos numeris/ pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15, Airija
Tel: +353 1 8112900

Platintojas:
Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A,
SE-212 25 Malmö, Švedija
Tel.: +370 648 93200
www.nordiskalkali.com

Importuotojai:
AB LINAS AGRO
Smėlynės g. 2c,
LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 507354
www.linasagro.lt

UAB BALTIC AGRO
Ukmergės g. 322,
LT-12106 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 270 1187
www.balticagro.lt

UAB SCANDAGRA
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 34 741 551
www.scandagra.lt

UAB AGRODEMA
Žirmūnų g. 139,
LT-09120 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52 402 291
www.agrodema.lt

UAB AGROKONCERNAS
Vėrupės g. 1, Babtų k.,
LT-54328 Kauno r, Lietuva
Tel.: +370 37 490 490
www.agrokoncernas.lt

UAB AGROCHEMA
Jonalaukio k., Ruklos sen.

UAB AGRIMATCO VILNIUS
S. Lozoraičio g. 19A, Garliava

LT-55296 Jonavos r., Lietuva
Tel.: +370 34 956 142
www.agrochema.lt

LT-53228, Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 61 453 256
www.agrimatco.lt

ŽVALGUVA UAB
Metalistų g. 6,
LT-78107 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 69 803 587
www.zvalguva.lt

ŽŪK Lagrenas
Inovacijų g. 3, Biruliškių k.,
LT-54469 Kauno r., Lietuva
Tel.: +370 61 531 712
www.lagrenas.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

KINVARA yra sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienametėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti vasarinių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių avižų, žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių kvietrugių ir žieminių rugių pasėliuose, taip pat javų pasėliuose su miglinių žolių įsėliu, dviskilčių piktžolių ploteliams miglinių žolių pievose ir ganyklose naikinti.
Herbicido sudėtyje trys veikliosios medžiagos, pasižyminčios tuo pačiu veikimo būdu (veikia kaip sintetiniai auksinai), tačiau kiekviena turi savitą naikinamų piktžolių spektrą. Dėl šios priežasties, trijų veikliųjų medžiagų mišinys naikina piktžoles geriau nei bet kuri šių medžiagų atskirai.

Normos

Žemės ūkio augalai	Norma (l/ha)	Purškimo laikas
Žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai, žieminiai rugiai ir žieminiai kvietrugiai (įskaitant žieminius javus su daugiamečių žolių įsėliu)	2,5	Purkšti pavasarį, nuo bamblėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30–39)*
Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai ir vasarinės avižos (įskaitant vasarinius javus su daugiamečių žolių įsėliu)	2,25	Purkšti pavasarį, nuo bamblėjimo pradžios iki visiškai išsiskleidžia paskutinis lapas (BBCH 30–39)*
Miglinių žolių sėkliniai pasėliai	2,05	Purkšti pavasarį, nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos BBCH 30-49
Miglinių žolių pievos silosui, pašarams, ganykloms	2,05	Purkšti pavasarį nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos BBCH 30-49
Antrų ir vėlesnių metų miglinių žolių pievos silosui, pašarams, ganykloms	1,83	Purkšti pavasarį pasirodžius pirmam lapui iki antro bamblio tarpsnio BBCH 10-32

Didžiausias purškimų skaičius: 1 kartas per sezoną.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS
Naudojimas dviskilčių piktžolių plotams miglinių žolių pievose ir ganyklose naikinti išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS
Žieminiuose ir vasariniuose javuose 200–400 l/ha vandens; miglinių žolių sėkliniuose pasėliuose, pievose ir ganyklose 200–400 l/ha vandens, o susiformavusiuose žolių pasėliuose - ne mažiau kaip 300 l/ha vandens.
Naudokite didesnę vandens kiekį tankiuose pasėliuose arba kai piktžolės yra didelės. Padenkite augalus tolygiai ir taip, kad nesusidarytų tirpalo lašai ant lapų.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS
Žemiau nurodytas KINVARA veiksmingumas pasiekiamas tuomet, kai piktžolės gerai padengiamos herbicido tirpalu bei esant palankioms augalų augimo sąlygoms.

Žieminiai javai

Jautrumas (veiksmingumas)	**Piktžolės**
Labai jautrios piktžolės (95-100 %)	Rapsų pabiros *(Brassica napus)* Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*) Rugiagėlė (*Cyanus segetum)* Baltoji balanda (*Chenopodium album*) Geltonžiedė aklė (*Galeopsis speciosa*) Kibusis lipikas (*Galium aparine*) Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*) Paprastoji takažolė (*Polygonum aviculare*) Dirvinė čiužutė *(Thlaspi arvense)* Dirvinis garstukas *(Sinapis arvensis)* Daržinė žliūgė *(Stellaria media)*
Jautrios piktžolės (85-94,9 %)	Raudonžiedė notrelė *(Lamium purpureum)* Bekvapis šunramunis *(Tripleurospermum inodorum)* Paprastasis kietis *(Artemisia vulgaris)*
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %)	Dirvinė usnis *(Cirsium arvense)*
Atsparios (0-49,9 %)	Dirvinė našlaitė *(Viola arvensis)* Veronikos *(Veronica sp.)*

Vasariniai javai

Jautrumas (veiksmingumas)	**Piktžolės**
Labai jautrios piktžolės (95-100 %)	Baltoji balanda (*Chenopodium album*) Paprastasis dalgutis (*Erodium cicutarium)* Raudonžiedė notrelė *(Lamium purpureum)*

	Paprastoji takažolė (*Polygonum aviculare*) Vijoklinis pelėvirkštis *(Fallopia convolvulus)* Dirvinis garstukas *(Sinapis arvensis)* Daržinė žliūgė *(Stellaria media)* Dirvinė čiužutė *(Thlaspi arvense)*
Jautrios piktžolės (85-94,9 %)	Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*) Karpytasis snaputis *(Geranium dissectum)* Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*) Dirvinė usnis *(Cirsium arvense)* Siauralapis gyslotis (*Plantago lanceolata)* Bekvapis šunramunis *(Tripleurospermum inodorum)* Kibusis lipikas *(Galium aparine)*
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9 %)	Vaistinė žvirbliarūtė *(Fumaria officinalis)*
Vidutiniškai atsparios (50 – 69,9 %)	Rapsų pabiros *(Brassica napus)* Geltonžiedė aklė (*Galeopsis speciosa*) Dirvinė našlaitė *(Viola arvensis)*

PASTABOS Optimaliausias KINVARA veiksmingumas pasiekiamas esant šiltoms ir drėgnoms oro sąlygoms, o piktžolės yra jaunos ir aktyviai augančias. Purškimo metu temperatūra turi būti daugiau nei +12° C. Vengti naudojimo, jei prognozuojamos šaltos naktys. Nevoluokite ir neakėkite pasėlių 7 dienas po purškimo KINVARA.
Purkškite sausą pasėlį.
Nepurkškite prieš lietų.
Iškilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į vietos platintoją arba registracijos savininką.

FITOTOKSIŠKUMAS
Kartais panaudojus KINVARA vasariniuose javuose gali pasireikšti augimo sulėtėjimas, tačiau tai praeina ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.

MAIŠYMAS
KINVARA mišinių su kitais augalų apsaugos produktais suderinamumas, kokybė, poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas netirtas ir nevertintas. Ši produkto forma, mikroemulsija, nenumatyta maišyti su kitais produktais.
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Nenaudokite KINVARA, kai augalai paveikti streso, sausros, esant dideliems temperatūrų skirtumams ir drėgmės pertekliui, kai augalai pažeisti kenkėjų, ligų, esant maisto medžiagų trūkumui ar kitiems pasėlių augimą slopinantiems veiksniams.

Nenaudokite KINVARA pašarinių žolių pasėliuose, kurių sudėtyje yra dobilų ar kitų pupinių augalų ir kituose dviskilčių augalų pasėliuose.
Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.
Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Gyvūnai gali būti leidžiami į pievas ir ganyklas praėjus 7 dienoms po purškimo.

SĖJOMAINA
Siekiant išvengti klopiralido likučių kituose sėjomainos pasėliuose, rekomenduojama kruopščiai sukompostuoti šiaudus ir nupjautą žolę.
Jei klopiralido skaidymasis sulėtėjęs, būtina į tai atsižvelgti auginant bulves, pupinius augalus (pupas, žirnius, dobilus), salierinius augalus (morkas, pastarnokus) ir astrinius augalus (salotas).
Šiaudai ar nupjauta žolė, kuri prieš tai buvo purkšta KINVARA neturėtų būti naudojama šiltnamiuose arba mulčiavimui.
Siekiant išvengti fluroksipiro likučių, vengti atsėjimo šakniavaisiais ir gumbavaisiais.
Lauke, kuriame buvo panaudotas herbicidas KINVARA, tais pačiais metais giliai suarus galima sėti tik javus ir vienskiltes žoles.
Rekomenduojama po KINVARA naudojimo palaukti mažiausiai 125 dienas prieš sėjant naują pasėlį.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
KINVARA sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos – fluroksipiras, klopiralidas ir MCPA. Pagal veikimo būdą, remiantis HRAC* klasifikacija, jos yra sintetiniai auksinai (HRAC kodas 4). Atsparumo išsivystymo rizika KINVARA yra vertinama kaip maža, tačiau bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo būdą turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku, rekomenduojama norma ir laboratorinis tyrimas patvirtina sumažėjusį jautrumą.
Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, naudojant KINVARA būtina laikytis šių rekomendacijų:
• kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz.: sėjomaina, optimalus sėjos laikas, gilus dirvos dirbimas);
• mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingą veikimo būdą turinčius herbicidus;
• naudokite rekomenduojamą herbicido normą ir nurodytu laiku;
• panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Sunaikinkite jas mechaniškai arba naudodami kitus veiksmingus herbicidus;
• išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovą Lietuvoje.

*HRAC – veiklos su atsparumu herbicidams komitetas (www.hracglobal.com).

SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m^2) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. (Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias

pirštines (atitinkančias standartą EN 374) pvz.: polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166).
Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m^2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.
Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei būtina mūvėti pirštines. Atliekant vejos nuėmimo darbus darbuotojai į purkštus plotus gali įeiti tik 15 dienų po purškimo.
Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant purškimo darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatyti reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. **Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.**
Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį herbicido KINVARA ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišytuvą įjungtą visą purškimo laiką.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10

% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio. Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu turi būti nuo 0º C iki +30º C. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mes tiekiame tik aukštos kokybės produktus, tačiau negalime kontroliuoti jų sandėliavimo, tvarkymo, maišymo ar naudojimo, taip pat oro sąlygų prieš, per ir po purškimo, kas gali turėti įtakos produkto veiksmingumui. Registracijos savininkas ar platintojas negali atsakyti už sumažėjusį veiksmingumą, pažeidimus ar nuostolius, atsiradusius dėl produkto netinkamo saugojimo, tvarkymo ar naudojimo ne pagal rekomendacijas.