



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS  
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-429  
„DĖL FUNGICIDO *REYVONA* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM  
NAUDOJIMUI“ PAKEITIMO**

2026 m. kovo 30 d. Nr. A1-179  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 33 straipsniu, atsižvelgdamas į *Revyona* registracijos ataskaitos išvadas, bei BASF UAB 2026 m. kovo 23 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. A1-429 „Dėl fungicido *Revyona* įregistravimo profesionaliajam naudojimui “ ir 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiams rapsams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo fomezės, šviesmargės.

Purkšti nuo ištįsusio pirmojo tarpubamblio iki pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę (BBCH 31–55), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti nuo tada, kai šoninių šakų žiedynų butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę iki žydėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 57–69), ne daugiau kaip 1 kartą.

Vasariniams rapsams.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo fomezės, šviesmargės.

Purkšti nuo išsivysčiusio 3 lapo tarpsnio iki pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę BBCH (13–55), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės.

Purkšti nuo tada, kai šoninių šakų žiedynų butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę iki žydėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 57–69), ne daugiau kaip 1 kartą.

Cukriniams runkeliams.

Norma: 0,7–1,5 l/ha.

Saugo nuo rudmargės, miltligės, rūdžių, baltulių.

Purkšti nuo tarpueilių užsidengimo (lapai dengia 90 proc. tarpueilių) iki runkelių šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą (tinkamą kasimui dydį) (BBCH 39–49), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Kukurūzai grūdams ir silosui.

Norma: 0,75–1,25 l/ha.

Saugo nuo kukurūzų dryžligės, degulių, fuzariozės, rūdžių.

Purkšti nuo pirmojo matomo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,375–0,625 l/ha.

Saugo nuo kukurūzų dryžligės, degulių, fuzariozės, rūdžių.

Purkšti nuo pirmojo matomo bamblio tarpsnio iki žydėjimo pabaigos (BBCH 31–69), ne daugiau kaip 2 kartus.

Bulvėms.

Norma: 0,75–1,25 l/ha.

Saugo nuo sausligės.

Purkšti nuo pirmojo stiebo atsiradimo iki lapams pradėjus gelsti (BBCH 20–91), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Žirniams (lauko ir žaliesiems žirniams).

Norma: 0,8–1,3 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, askochitozės, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo pirmų butonų pasirodymo iki 70% ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 50–77), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pupoms.

Norma: 0,8–1,3 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, askochitozės, pilkojo (kekerinio) puvinio, rudosios dėmėtligės.

Purkšti nuo pirmų butonų pasirodymo iki 70% ankščių pasiekia būdingą ilgį (BBCH 50–77), ne daugiau kaip 2 kartus.

Obelims, kriaušėms.

Norma: 2,0 l/ha.

Saugo nuo rauplių, miltligės.

Purkšti nuo tada, kai sprogsta pumpurai iki vaisius pasiekia savo būdingą dydį (BBCH 53–79), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 28 dienoms.

Slyvoms, vyšnioms.

Norma: 1,8 l/ha.

Saugo nuo kaulavaisių moniliozės.

Purkšti nuo tada, kai matomi pavieniai žiediniai pumpurai (dar uždari) išsidėstę ant trumpo stiebo, žali žvynai truputį atsivėrę iki vaisiaus vartojimo brandos (vaisiams pasiekus būdingą skonį ir tvirtumą) (BBCH 55–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Braškėms auginamoms lauke ir tuneliuose.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo stolonų formavimosi pradžios iki derliaus: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva (BBCH 40–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 1 dienai.

Morkoms *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, tikrosios miltligės, sklerotinio puvinio.

Purkšti nuo visų lapelių išsiskleidimo iki visiško išsivystymo: pasiekama šakniavaisiams būdinga forma ir dydis (BBCH 20–49), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Gūžiniams kopūstams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, lapų žiedinės dėmėtligės, miltligės.

Purkšti nuo visų lapelių išsiskleidimo iki visiško išsivystymo: pasiekiamas būdingas gūžės dydis forma ir kietumas (BBCH 20–49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Briuseliniam kopūstams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, lapų žiedinės dėmėtligės, miltligės.

Purkšti nuo visų lapelių išsiskleidimo iki visiško išsivystymo: pasiekiamas būdingas gūžės dydis forma ir kietumas (BBCH 20–49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žiediniams kopūstams ir brokoliams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, lapų žiedinės dėmėtligės, miltligės.

Purkšti nuo visų lapelių išsiskleidimo iki visiško išsivystymo: pasiekiamas būdingas gūžės dydis forma ir kietumas (BBCH 20–49), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Šakninėms gumbinėms daržovėms (raudoniesiems burokėliams, geltoniesiems burokėliams, šakniniams salierams, krienams, gumbinėms saulėgražoms, pastarnokams, ridikams ir ridikėliams, valgomiesiems pūteliams, griežčiams, ropėms) *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo rudmargės, alternariozės, miltligės, lapų baltulių, sklerotinio puvinio.

Purkšti nuo visų lapelių išsiskleidimo iki visiško išsivystymo: pasiekiamas būdingas gūžės dydis forma ir kietumas (BBCH 20–49), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Serbentams, joštomis, agrastams, šilauogėms, mėlynėms, bruknėms, spanguolėms, šilkmedžiams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti nuo pirmųjų lapų pilno išsiskleidimo iki vaisiai pilnai subręsta (ir prasideda vaisių atsiskyrimas) (BBCH 19–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 7 dienoms.

Baltosioms garstyčioms, sereptiniams ir juodiesiems bastučiams, linams, sėjamosioms judroms *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,75–1,5 l/ha.

Saugo nuo sklerotinio puvinio, alternariozės.

Purkšti pradėjus tįsti pirmajam tarpubambliui iki pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę (BBCH 31–55), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 1,0–2,0 l/ha.

Saugo nuo sklerotinio puvinio, alternariozės.

Purkšti nuo šoninių žiedynų butonai išsiskirstę, tačiau neišsiskleidę iki pilnai išsivysto 50% ankštarų (BBCH 57–75), ne daugiau kaip 1 kartą.

Lėšiams, sėjamesiems avinžirniams, lubinams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,8–1,3 l/ha.

Saugo nuo askochitozės.

Purkšti nuo pirmų butonų pasirodymo iki 70% ankščių pasiekė būdingą ilgį. Paspaudus trykšta sultys (BBCH 50–77), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pupelėms *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,8–1,3 l/ha.

Saugo nuo rūdžių, askochitozės, pilkojo kekerinio puvinio, rudosios dėmėtligės.

Purkšti nuo pirmų butonų pasirodymo iki 70% ankščių pasiekė būdingą ilgį. Paspaudus trykšta sultys (BBCH 50–77), ne daugiau kaip 2 kartus.

Sojoms *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,8–1,3 l/ha.

Saugo nuo netikrosios miltligės, sklerotinio puvinio, septoriozės, askochitozės.

Purkšti nuo pirmų butonų pasirodymo iki visiško žydėjimo. Išsiskleidę 50% žiedų (BBCH 50–65), ne daugiau kaip 2 kartus.

Smidrams *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo stemfiliozės, pilkojo kekerinio puvinio, smidrų rūdžių.

Purkšti nuo matomo pirmojo žiedyno arba žiedpumpurio iki vaisių brendimo pabaigos (BBCH 51–89), ne daugiau kaip 1 kartą.

Moliūginių šeimos augalams (agurkams ir cukinijoms) su valgoma žievele auginamiems lauke ir tuneliuose *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo tikrosios miltligės, agurkų miltligės, alternariozės.

Purkšti nuo lapų vystymosi, kai ant pagrindinio stiebo išsiskleidžia keturi tikrieji lapeliai iki visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 14–89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Paprikoms auginamoms šiltnamiuose *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, miltligės.

Purkšti nuo lapų vystymosi, kai ant pagrindinio stiebo išsiskleidžia keturi tikrieji lapeliai iki visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 14–89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Pomidorams ir baklažanams auginamiems šiltnamiuose *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, miltligės.

Purkšti nuo lapų vystymosi, kai ant pagrindinio stiebo išsiskleidžia keturi tikrieji lapeliai iki visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 14–89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Moliūginių šeimos augalams (agurkams, aguročiams ir cukinijoms) su valgoma žievele auginamiems šiltnamiuose *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, tikrosios miltligės, agurkų miltligės.

Purkšti nuo lapų vystymosi, kai ant pagrindinio stiebo išsiskleidžia keturi tikrieji lapeliai iki visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 14–89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.

Moliūginių šeimos augalams (melionams, arbūzams ir moliūgams) su nevalgoma žievele auginamiems šiltnamiuose *Revyona* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 1,5 l/ha.

Saugo nuo alternariozės, tikrosios miltligės, agurkų miltligės.

Purkšti nuo lapų vystymosi, kai ant pagrindinio stiebo išsiskleidžia keturi tikrieji lapeliai iki visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 14–89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis