

# KLAPTON 33 WG

## FUNGICIDAS

**Veikliosios medžiagos:** boskalidas 26,7% (267 g/kg)  
piraklostrobinas 6,7% (67 g/kg)

**Produkto forma:** vandenyje disperguojančios granulės (WG)

KLAPTON 33 WG yra sisteminio veikimo fungicidas, skirtas gūžinių kopūstų, morkų, porų, svogūnų, salotų, žirnių, pupų, braškių, bulvių, vyšnių, slyvų, juodųjų, raudonųjų ir baltųjų serbentų, aviečių, ir pušų sodinukų apsaugai nuo puvinų ir kitų ligų. Fungicidas Klapton 33 WG žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, brokoliams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams, šakniniams salierams, špinatams auginamiems sėklai, pomidorams ir baklažanams auginamiems šiltnamiuose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

**Skirtas profesionaliajam naudojimui**



## ATSARGIAI

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.

Mūvėti apsaugines pirštines, / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zonas iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių: 5 metrų apsaugos zoną purškiant daržoves ir braškes, 10 metrų apsaugos zoną purškiant juoduosius serbentus, avietes ir pušų sodinukus bei 20 metrų apsaugos zoną purškiant kaulavaisius.

## Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

**Pakuotė:** 0,25 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg, 20 kg  
**Registracijos numeris:** AS2-28F(2025)  
**Siuntos numeris:** žiūrėkite ant pakuotės  
**Pagaminimo data:** žiūrėkite ant pakuotės  
**Galiojimo laikas:** 3 metai nuo pagaminimo datos  
**Laikymas:** Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +30 °C.

**Registracijos savininkas:**

„INNIVIGO Sp. z o.o.“  
Aleje Jerozolimskie 178  
02-486 Varšuva  
Lenkija  
Tel.: +48 22 468 26 70  
el. paštas: [biuro@innvigo.com](mailto:biuro@innvigo.com)

**Atstovas Lietuvoje / platintojas:**

UAB BALTIC AGRO  
Ukmergės g. 322,  
LT-12106 Vilnius, Lietuva  
Tel.: +370 5 270 1187  
Faks.: +370 5 270 1711  
[www.balticagro.lt](http://www.balticagro.lt)

**UAB ŽVALGUVA**

Metalistų g. 6,  
LT-78107 Šiauliai, Lietuva  
Tel.: +370 41 54 0219  
Fax.: +370 41 54 0616  
[www.zvalguva.lt](http://www.zvalguva.lt)

**UAB SCANDAGRA**

Biochemikų g. 6,  
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva  
Tel.: +370 347 41 551  
Faks.: +370 347 41 552  
[www.scandagra.lt](http://www.scandagra.lt)

**UAB Agrokoncernas**

Vėrupės g. 1, Babtų kaimas,  
LT-54328 Kauno rajonas  
Tel. +370 37 490490  
el. paštas: [info@agrokoncernas.lt](mailto:info@agrokoncernas.lt)

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!****NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

**VEIKIMO BŪDAS**

Klaption 33 WG yra sisteminis fungicidas, pasižymintis gydomuoju ir apsauginiu veikimu, skirtas gūžinių kopūstų, žiedinių kopūstų, briuselinių kopūstų, brokolių, morkų, pastarnokų, raudonųjų burokėlių, šakninių salierų, porų, svogūnų, salotų, šiltnaminių pomidorų, baklažanų, žirnių, pupų, braškių, bulvių, kaulavaisių, juodųjų, raudonųjų, baltųjų serbentų, aviečių, pušų sodinukų, sėkloms auginamų špinatų apsaugai nuo puvinų ir kitų ligų.

Tai labai veiksmingas fungicidas nuo alternariozės (*Alternaria spp.*), sklerotinių (*Sclerotinia spp.*), kekerinių (*Botrytis spp.*), rudųjų puvinų (*Monilia spp.*) ir kitų ligų. Jis turi tiek apsauginį, tiek gydomąjį poveikį: stabdo sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą.

Klaption 33 WG sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų: boskalido ir piraklostrobino. Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.

**Boskalidas** priklauso naujai veikliųjų medžiagų grupei - anilidams. Boskalidas augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys. Pagal veikimo būdą boskalidas skiriasi nuo strobilurinių ir triazolų. Jis sustabdo energetinių resursų gamybą ir taip blokuoja grybų augimą. Jei buvo pasireiškęs atsparumas kitiems fungicidams, tuomet apsaugai nuo ligų galima naudoti Klaption 33 WG, nes boskalidui nepasireiškia grupinis atsparumas.

**Piraklostrobinas** yra strobilurinių grupės veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį veikimą. Prasiskverbiantis į lapus piraklostrobinas blokuoja grybo ląstelių energetinių resursų gamybą.

## NAUDOJIMAS

Augalus su Klaption 33 WG purškite profilaktiškai. Tai užkirs kelią atsparumo vystymuisi ir užtikrins geriausią apsaugą.

### **Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, briuseliniai kopūstai, brokoliai**

Alternariozė *Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola.*

Baltosios rūdys *Albugo candida*

**Norma:** 1,0 kg/ha Klaption 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 250–400 l/ha. Kopūstai purškiami, kol jauni lapai dar neišsiskleidę iki susiformuoja būdingas gūžės dydis ir forma (BBCH 41-49). Geriausių rezultatų pasieksite, Klaption 33 WG purškdami profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

Purškimą kartokite po 10-21 dienos, priklausomai nuo ligos intensyvumo.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### **Morkos, šakniniai salierai, pastarnokai, raudonieji burokėliai**

Juodoji dėmėtligė *Alternaria dauci, Alternaria radicina*

Miltligė *Erysiphe heraclei*

Dalinė apsauga nuo sklerotinio puvinio *Sclerotinia sclerotiorum*

**Norma:** 0,75-1,0 kg/ha Klaption 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-400 l/ha, priklausomai nuo lapų dydžio ir tankumo.

Purškama šaknims esant didesnėms nei 0,5 cm skersmens iki pilnai išsivysto ir pasiekia būdingą formą ir dydį (BBCH 41-49). Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius.

Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### **Pomidorai, baklažanai auginami šiltnamiuose**

Kekerinis puvinys *Botryotinia fuckeliana*

Miltligės *Oidium neolycopersici, Leveillula taurica*

**Norma:** 1,0-1,5 kg/ha Klaption 33 WG. (0,1-0,15 % koncentracija, arba 100-150 g/100 l vandens).

Rekomenduojamas vandens kiekis 500-1000 l/ha, priklausomai nuo lapų dydžio ir tankumo.

Purškama nuo žiedų pasirodymo iki 50% vaisių pasiekia būdingą spalvą (BBCH 50-85). Purškšti reikia profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 7-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius-3**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 1 diena**

**Porai**

Puviniai *Botrytis allii, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp., Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Pseudomonas spp*

**Norma:** 1,5 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškiama profilaktiškai, kai augalai pasiekia 25 cm aukštį arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams, 3 kartus 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-3**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

**Svogūnai**

Puviniai *Botrytis allii, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp., Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Pseudomonas spp.*

**Norma:** 1,5 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškiama profilaktiškai, kai augalai pasiekia 25 cm aukštį arba pasirodžius pirmiems ligos požymiams, 2 kartus 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

**Salotos**

Pilkasis kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*  
Sklerotinis puvinys *Sclerotinia sclerotiorum*

**Norma:** 1,5 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškiama profilaktiškai 1-2 savaitės po sodinimo. Priklausomai nuo ligų intensyvumo po 7-14 dienų purškimą kartokite. Produktas taip pat gali būti maišomas su fungicidais, turinčiais kitą veikimo mechanizmą.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

**Žirniai ir pupos (grūdams)**

Pilkasis kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*  
Pupų rūdys *Uromyces fabae*

**Norma:** 1,0 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-400 l/ha vandens. Lapų paviršius turi būti gerai padengtas tirpalu, kad apsaugotų nuo pupų rūdžių ir vėlyvos pilkojo kekerinio puvinio infekcijos. Purškiama profilaktiškai žydėjimo metu (BBCH 60-69) arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**  
**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 21 diena**

**Braškės**

Pilkasis kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*  
Šviesmargė *Mycosphaerella fragariae*  
Miltligė *Sphaerotheca macularis*  
Braškių juodoji dėmėtligė *Colletotrichum acutatum*

**Norma:** 1,8 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 500-1000 l/ha. Vandens naudoti tiek, kad purškiant būtų gerai padengiamas lapų ir uogų paviršius. Purškiama profilaktiškai 7-14 dienų intervalu nuo žydėjimo pradžios iki dauguma vaisių tampa baltos spalvos (BBCH 60-81).

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos**

### ***Bulvės***

Bulvių alternariozė *Alternaria solani*

**Norma:** 0,2 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 250-1000 l/ha. Vandens naudoti tiek, kad purškiant būtų gerai padengtas lapų paviršius. Norint apsaugoti bulves nuo alternariozės, purškiama 2-4 kartus žydėjimo pradžioje, 7-14 dienų intervalu kartu su produktais nuo bulvių maro.

**Didžiausias purškimų skaičius-4**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų**

### ***Kaulavaisiai (vyšnios ir slyvos)***

Pilkasis kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*

Moniliozė *Monilinia laxa*

Vaisių rudasis puvinys *Monilinia fructigena*

Vyšnių kokomikozė *Blumeriella jaapii*

**Norma:** 0,75 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 600-1000 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškiama 2 kartus žydėjimo pradžioje – vaisiaus nuspilvinimo pradžioje (BBCH 60-81) 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos**

### ***Juodieji, raudonieji ir baltieji serbentai (iki derliaus nuėmimo)***

Deguliai *Gloeosporium ribis*

Miltligė *Sphaerotheca mors-uvae*

Kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*

**Norma:** 1 kg/ha Klapton 33 WG

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškiama 2 kartus žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 59 - 75) su 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos**

### ***Juodieji, raudonieji ir baltieji serbentai (po derliaus nuėmimo)***

Šviesmargė *Septoria ribis*

Deguliai *Gloeosporium ribis*

Miltligė *Sphaerotheca mors-uvae*

Kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*

**Norma:** 1,0 kg/ha Klapton 33 WG

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha.

**Didžiausias purškimų skaičius-1**

**Paskutinis purškimas – nėra apribojimų.**

### **Avietės**

Žievėplaiša *Didymella applanata*

Kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*

**Norma:** 1,5 kg/ha Klapton 33 WG

Rekomenduojamas vandens kiekis 200-500 l/ha. Geriausi rezultatai gaunami, kai purškama 2 kartus žydėjimo pradžioje – brandos pradžioje (BBCH 60-81) su 10-14 dienų intervalu.

**Didžiausias purškimų skaičius-2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos**

### **Pušų sodmenys miško medelynuose**

Pušų spygliakritis *Lophodermium* spp.

**Norma:** 1,0 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha (didesnis vandens kiekis stambesniems ir tankesniems sodmenims). Purškama profilaktiškai, esant palankiems orams pušų spygliakričiui plisti. Nupurkšti sodmenys apsaugomi iki 2 savaičių.

Geriausiai pušų sodinukus apsaugosite, jei pakaitomis purškimui naudosite fungicidus, turinčius kitą veikimo būdą iš skirtingų fungicidų grupių.

**Didžiausias purškimų skaičius – 3.**

**Paskutinis purškimas iki sodmenų iškasimo – nėra apribojimų**

### **Sėkloms auginami špinatai**

Stemfiliozė (juoduliai) *Stemphylium botryosum f. sp. spinacia*

Juodligė (kladosporiozė) *Cladosporium variabile*

Alternariozė (juodoji dėmėtligė) *Alternaria* spp.

Kekerinis puvinys *Botrytis cinerea*

**Norma:** 1,0 kg/ha Klapton 33 WG.

Rekomenduojamas vandens kiekis 300-500 l/ha. Purškama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Pirmą kartą purškama birželio viduryje, kai špinatai pradeda žydėti (nuo BBCH 60), antrą kartą purškama po 10-14 dienų.

**Didžiausias purškimų skaičius – 2**

**Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – be apribojimų**

### **Dėmesio!**

Klapton 33 WG naudojimas žiediniams kopūstams, brokoliams, pastarnokams, raudoniesiems burokėliams, šakniniams salierams, sėkloms auginamiems špinatams, šiltnaminiams pomidorams ir baklažanams auginamiems šiltnaminiuose išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

### **Prašome atkreipti dėmesį!**

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

### **ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS**

Klapton 33 WG yra sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų, boskalido ir piraklostrobino.

**Boskalidas** priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas 7). SDHI fungicidams būdinga vidutinė – didelė atsparumo atsiradimo rizika.

**Piraklostrobinas** priklauso chinonų išorės inhibitorių (Qol) grupei (FRAC kodas 11).

Piraklostrobinui, kaip ir kitiems chinonų išorės inhibitorių grupės fungicidams, bendrai vertinant, būdinga didelė atsparumo atsiradimo rizika. Konkretiems patogenams, tokiems kaip *Sclerotinia sclerotiorum*, *Alternaria* atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip žema, o *Botrytis cinerea* – kaip didelė. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo arba bent jo nespartinti, reikia laikytis atsparumo valdymo programos.

Klaption 33 WG turi būti naudojama profilaktiškai arba ankstyvosiose ligos vystymosi tarpsniuose, pagal gamintojo rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku ir ne daugiau kartų nei nurodyta etiketėje prie kiekvieno augalo.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.

## TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvu rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Klaption 33 WG (pilkite lėtai, kad produktas spėtų ištirpti) ir baikite pilti vandenį. Maišytuvas turi dirbti transportavimo ir purškimo metu. Permaišykite tirpalą po kiekvienos pertraukos. Tirpalas turi būti sunaudotas tuojau po jo paruošimo!

## PURŠKIMAS

Nepurškite kai augalų augimas sulėtėjęs, temperatūra žemesnė nei +5 oC, laukiama šalnų, lietaus arba augalai yra stresinės būsenos (suvytę ir kt.).

## MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

Klaption 33 WG mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

## NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

## SAUGOS PRIEMONĖS

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius - kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės).

**Purškiant lauko purkštuvais** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m<sup>2</sup>) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m<sup>2</sup>) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Klaption 33 WG naudojimas šiltnamiuose:**

- **kai operatorius purškimo metu techniškai gali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:**

Saugos priemonės operatoriams ir darbuotojams tokios pačios kaip ir lauko sąlygomis.

- **kai operatorius, susiformavus tankiai augalų lapijai, purškimo metu techniškai negali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:**

**Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius** būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas  $\geq 300 \text{ g/m}^2$ ) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas  $\geq 245 \text{ g/m}^2$ ) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ( $\geq 0,4 \text{ mm}$ ) ar kt. Būtina dėvėti veido skydelį (atitinkantį standartą LST EN 166).

**Purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais** būtina dėvėti neperšlampamą ir cheminėms medžiagoms atsparų vientisą kombinezoną arba dviejų dalių kostiumą, užtikrinantį ne mažesnę apsaugą nei 3 tipo apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų (atitinkanti standartą LST EN 14605). Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

**Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus.** Darbuotojams dirbantiems šiuo produktu apdorotų kultūrų plotuose, rekomenduojama dėvėti pirštines, būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. **Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus** operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

**Higienos ir kitos priemonės.** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

## **PIRMOJI PAGALBA**

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.**

## **PURKŠTUVO PLOVIMAS**

Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas.

## **PRODUKTO SAUGOJIMAS**

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo 0 iki +30° C temperatūroje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, saugoti, kad nedulkėtų, taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

### **TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS**

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvų talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

### **GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ**

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.