



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *DELPUPO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2026 m. birželio 9 d. Nr. A1-346
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 34 straipsniu bei atsižvelgdamas į Globachem N.V. 2026 m. sausio 22 d. prašymą ir fungicido *Delpupo* 2026 m. sausio 26 d. tapatumo vertinimo išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Delpupo*, Globachem N.V., profesionaliajam naudojimui iki 2027 m. birželio 30 d.

1.1. Veikliosios medžiagos: fluopiramas 125 g/l + protiokonazolas 125 g/l.

1.2. Fungicido forma: suspoemulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazę:

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.

Saugoti nuo saulės šviesos.

Surinkti ištekęjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant rapsus, 10 metrų apsaugos zoną purškiant kukurūzus, bulves, cukrinius runkelius ir raudonuosius burokėlius iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., purškiant kukurūzus, bulves, cukrinius runkelius ir raudonuosius burokėlius būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai purkšdami lauko purkštuvais, privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Inžinerinės kontrolės priemonės gali pakeisti asmens apsaugos priemonės, jeigu jos užtikrina lygiavertę arba didesnę apsaugą.

1.4. Pakuotės: 1 l, 5 l, 10 l, 15 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniam rapsams.

Norma: 0,8 – 1,0 l/ha.

Saugo nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės, pilkojo (kekerinio) puvinio. Purkšti vegetacijos metu ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 56 dienoms.

Kukurūzams.

Norma: 0,5 – 1,0 l/ha.

Saugo nuo degulių, kukurūzų dryžligės, kukurūzų dėmėtligės.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 53 – 69) ne daugiau kaip 2 kartus, kai naudojama 0,5 l/ha norma, bet ne daugiau kaip 1 kartą, kai naudojama 1,0 l/ha norma.

Žirniams (*Delpupo* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 0,8 – 1,0 l/ha.

Saugo nuo sklerotinio puvinio.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms.

Bulvėms.

Norma: 0,3 – 0,5 l/ha.

Saugo nuo sausligės.

Purkšti nuo gumbų formavimosi pradžios iki kol subręsta vaisiai ir sėklos (BBCH 40 – 89), ne daugiau kaip 3 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 21 dienai.

Raudoniesiems burokėliams (*Delpupo* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį).

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudmargės, miltligės, baltulių, rūdžių, runkelių stemfiliozės (juodulių).

Purkšti esant palankioms sąlygoms ligos plitimui ar pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo visiško tarpueilių uždengimo lapais iki šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą (BBCH 40 – 49), ne daugiau kaip 2 kartus iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Cukriniais runkeliais.

Norma: 1,0 l/ha.

Saugo nuo rudmargės, miltligės, baltulių, rūdžių, runkelių stemfiliozės (juodulių).

Purkšti esant palankioms sąlygoms ligos plitimui ar pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo visiško tarpueilių uždengimo lapais iki runkelių šakniavaisiai pasiekia technologinę brandą (BBCH 40 – 49), ne daugiau kaip 2 kartus. Laikotarpis po paskutinio purškimo apibrėžiamas pagal BBCH augimo tarpsnį.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.