

Stomp® CS

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 455 g/l (38,72 %)

Produkto forma: kapsulinė suspensija (CS)

Stomp® CS – sisteminio veikimo dirvinis herbidas, skirtas naikinti vienmetes dviskiltes piktžoles pupose, pupelėse, vasariniuose kviečiuose, miežiuose su miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, žirnių ir liucernos įsėliu bei jų mišiniuose, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos, miglinių žolių bei jų mišinių pasėliuose, raudonųjų, baltųjų dobilų, liucernos ir miglinių žolių sėkliniuose pasėliuose sėjos metais, žieminiuose miežiuose, žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, žieminiuose rugiuose, žieminiuose rapsuose, svogūnuose auginamuose iš sėklų, laiškiniuose česnakuose auginamuose iš sėklų, bulvėse, krapuose bei jaunuose medelynuose.

Herbidas **Stomp® CS** šilauogėms, braškėms, serbentams, morkoms, šakninėms petražolėms ir smidrams registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazolino-3-ono.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Stengtis neįkvėpti rūko, garų ar aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Esant poveikiui arba jei numatomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai naudojamas žieminiuose rapsuose.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai naudojamas žieminiuose javuose, vasariniuose miežiuose ir kviečiuose su žirnių, varpinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos įsėliu, varpinėse žolėse, dobiluose ir jų mišiniuose be antsėlio.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, kai naudojamas krapuose, svogūnuose ir laiškiniuose česnakuose,

pupose ir pupelėse, medelynuose, šilauogėse, braškėse ir serbentuose. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Informacija apsinuodijimo atveju: +370 52 362 052

Avarijos atveju kreipkitės bendrojo pagalbos telefonu: 112

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112

Pakuotė:	1 L, 5 L, 10 L, 50 L
Registracijos numeris:	AS2-57H(2025)
Siuntos numeris:	žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data:	žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas:	3 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas:	laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C

Registracijos savininkas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva. Telefonas: +3705 210 74 50. El.paštas: agronomas@basf.com, internetinė svetainė: www.agro.basf.lt

PRIŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Stomp CS yra naujos formos, kapsulinės suspensijos herbicidas, savo sudėtyje turintis 455 g/l pendimetolino. Kapsulinės suspensijos forma yra be tirpiklių / pagaminta vandens pagrindu, o tai mažiau žalinga gamtai, mažina tepimą, neturi stipraus kvapo ir palengvina naudojimą, maišymą ir valymą.

Stomp CS yra dirvinis herbicidas. Dygstančios piktžolės įsisavina jį per šaknis. Purškiant po sudygimo, jis veikia daugiau per lapus. **Stomp CS** dirvoje veiksmingas išlieka labai ilgai, todėl jis sunaikina ir vėliau dygstančias piktžoles. **Stomp CS** naikina dviskiltes ir kai kurias vienskiltes piktžoles nuo jų sudygimo iki 2 lapelių tarpsnio, silpniau sunaikina gerai įsišaknijusias senesnes piktžoles ir nenaikina daugiamečių piktžolių. Daugelyje kultūrinių augalų vienas apdorojimas su **Stomp CS** neduoda pakankamai gero poveikio nuo piktžolių, todėl **Stomp CS** paprastai naudojamas purškimo programose su kitais herbicidais.

NAUDOJIMAS

Žieminiai rapsai

Norma: 0,44 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po žieminių rapsų sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09). Dirva turi būti tolygiai įdirbta, drėgna, o sėklos gerai įterptos į dirvą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 l/ha

Žieminiai miežiai, žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, žieminiai rugiai

Norma: 1,0 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama kai pirmasis lapas pasirodo iš koleoptilės – iki 2 lapelių tarpsnio (BBCH 10-12). Dirva turi būti tolygiai įdirbta, drėgna, o sėklos gerai įterptos į dirvą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-250 l/ha

Vasariniai miežiai ir kviečiai su žirnių, miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos įsėliu bei jų mišiniai

Norma: 0,9 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po vasarinių javų sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09). Dirva turi būti tolygiai įdirbta, drėgna, o sėklos gerai įterptos į dirvą.

arba

Norma: 1,0 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sudygimo – iki 3 lapelių tarpsnio (BBCH 10-13). Geriausias poveikis pasiekiamas, kai purškiamos piktžolės yra mažos, naujai dygstančios, o augimo sąlygos geros (drėgna dirva).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernų pasėliai bei jų mišiniai be antsėlio auginami sėklai, sėjos metais

Norma: 1,0 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sudygimo 1 – 3 lapelių tarpsnyje (BBCH 11-13). Geriausias poveikis pasiekiamas, kai purškiamos piktžolės yra mažos, naujai dygstančios, o augimo sąlygos geros (drėgna dirva).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 l/ha

Miglinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernų pasėliai bei jų mišiniai be antsėlio

Norma: 1,0 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sudygimo 1 – 3 lapelių tarpsnyje (BBCH 11-13). Geriausias poveikis pasiekiamas, kai purškiamos piktžolės yra mažos, naujai dygstančios, o augimo sąlygos geros (drėgna dirva).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 l/ha

Krapai

Norma: 1,6 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sėjos – iki sudygimo (BBCH 00-09). Dirva turi būti gerai ir tolygiai įdirbta, drėgna, o sėklos vienodai gerai įterptos į dirvą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 49 dienos

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 l/ha

Svogūnai ir laiškinių česnakai auginami iš sėklų

Norma: 1,6 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sėjos – iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 00-14). Dirva turi būti tolygiai įdirbta, drėgna, o sėklos vienodai gerai įterptos į dirvą.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 56 dienos

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 l/ha

Pupos ir pupelės

Norma: 1,1 – 1,45 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama po sudygimo – iki 3 lapelių tarpsnio (BBCH 10-13). Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Jauni medelynų augalai, įskaitant miško sodmenis, kitų rūšių medžius, krūmus ir dekoratyvinius augalus, auginamus medelynuose

Norma: 1,6 l/ha Stomp CS

Naudojimo laikas: purškiama pavasarį, pradėjus dygti piktžolėms.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-200 l/ha

Bulvės

Norma: 1,0-1,6 l/ha *Stomp CS*

Stomp CS gali būti naudojamas trumpaamžių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui bulvėse po paskutinio kaupimo akėjimo, bet ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo. Po purškimo dirvos kultivuoti nerekomenduojama, kad nebūtų suardytas herbicidu apdorotas dirvožemio sluoksnis.

Naudojimo laikas: po paskutinio kaupimo akėjimo, prieš bulvių sudygimą. Drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 45 dienos

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 400 l/ha

Piktžolių jautrumas

Norma: 0,44 l/ha *Stomp CS*

Labai jautrios piktžolės (veikimas 95-100%): panaktinės naktižiedės (*Silene noctiflora*).

Jautrios piktžolės (veikimas 85-94,9%): pūdyminės aguonos (*Papaver rhoeas*), persinės veronikos (*Veronica persica*), dirvinės neužmirštuolės (*Myosotis arvensis*).

Norma: 1,0 l/ha *Stomp CS*

Jautrios piktžolės (veikimas 85-94,9%): pūdyminės aguonos (*Papaver rhoeas*), veronikos (*Veronica spp.*).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veikimas 70-84,9%): daržinės žliūgės (*Stellaria media*), dirvinės neužmirštuolės (*Myosotis arvensis*).

Vidutiniškai atsparios piktžolės (veikimas 50-69,9%): našlaitės (*Viola spp.*).

Norma: 1,6 l/ha *Stomp CS*

Labai jautrios piktžolės (veikimas 95-100%): pūdyminės aguonos (*Papaver rhoeas*), persinės veronikos (*Veronica persica*), pūdyminės veronikos (*Veronica agrestis*), dirvinės neužmirštuolės (*Myosotis arvensis*).

Jautrios piktžolės (veikimas 85-94,9%): dirvinės veronikos (*Veronica arvensis*), notrelės (*Lamium spp.*).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (veikimas 70-84,9%): daržinės žliūgės (*Stellaria media*).

Vidutiniškai atsparios piktžolės (veikimas 50-69,9%): gebenlapės veronikos (*Veronica hederifolia*), dėmėtieji rūgčiai (*Persicaria maculosa*), paprastosios takazolės (*Polygonum aviculare*), našlaitės (*Viola arvensis*).

PASTABOS

Stomp CS veiksmingumas pagerėja drėgname dirvožemyje. Purškiant po sudygimo, norint gauti gerą poveikį, svarbu purkšti ant mažų piktžolių. Kadangi ***Stomp CS*** veikia kaip dirvinis herbicidas, patenkantis per šaknis, dirvožemyje su dideliu organinių medžiagų kiekiu veiksmingumas gali sumažėti, nes veikioji medžiaga gali būti absorbuota dirvožemio organinių medžiagų.

Venkite patekimo ant gretimai/kaimynystėje augančių augalų.

Akmenuotose ir sunkiose dirvose yra augalų pažeidimo rizika, ypač, kai po herbicido panaudojimo užteina smarkus lietus.

Sėklų guolis turi būti gerai paruoštas, tvirtas ir vienodo gylio.

Purų ar grumstuotą dirvožemį prieš sėją privoluokite.

Naudojant herbicidą prieš sudygimą grumstuotose dirvose (ypač, jei grumstų diametras didesnis kaip 75 mm), galimas veiksmingumo sumažėjimas, taip pat sėklos gali būti nevienodai padengtos dirva, ir tai gali sukelti augalų pažeidimus.

FITOTOKSIŠKUMAS

Naudojant pagal etiketės reikalavimus, neigiamas poveikis *Stomp CS* nepastebėtas.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Stomp CS naudojimas šilauogėse, serbentuose, braškėse, morkose, šakninėse petražolėse ir smidruose registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Šilauogės ir serbentai

Norma: 1,6 l/ha *Stomp CS*

Naudojimo laikas: ramybės būsenoje arba tik prieš prasidedant vegetacijai, (BBCH 00-09). Svarbu, kad šilauogės ir serbentai būtų gerai išsėkinti ir ne jaunesni kaip 5 metų. Jaunesnėse šilauogėse ir serbentuose galimi pažeidimai. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Braškės auginamos atvirame grunte

Norma: 1,6 l/ha *Stomp CS*

Naudojimo laikas: pavasarį, vasarą arba rudenį naujai pasodintos braškės purškiamos po pasodinimo iki 2 lapelių tarpsnio, (BBCH < 12) arba jau augančios braškės purškiamos anksti pavasarį iki 2 lapelių tarpsnio (BBCH < 12) arba vėlai rudenį ramybės pradžioje, po to, kai pasirodo nauji lapai su mažesniais lapalakščiais ir trumpesniais kotais (BBCH > 92).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 70 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-400 l/ha

Morkos, šakninės petražolės

Norma: 1,0-1,6 l/ha *Stomp CS*

Naudojimo laikas: tik prieš morkų ir šakninių petražolių sudygimą. Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Purškiama tuoj po sėjos. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 90 dienų

Rekomenduojamas vandens kiekis 100 - 200 l/ha

Smidrai sodinimo metais arba po derliaus nuėmimo

Norma: 1,0-1,6 l/ha *Stomp CS*

Naujai pasodintiems smidrams sodinimo metais

Naudojimo laikas: Purškiama tuoj po pasodinimo, 7-10 dienų prieš pasirodant daigams.

Antrus metus ir vėliau auginamiems smidrams

Naudojimo laikas: po derliaus nuėmimo. Jei planuojama atnaujinti vagas, tik po vagų atnaujinimo. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha

ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

SĖJOMAINA

Po herbicido panaudojimo, esant normalioms sąlygoms, po derliaus nuėmimo kitais metais galima auginti visus augalus, tik po trumpos vegetacijos daržovių auginimo rekomenduojama dirvą suarti arba sukultivuoti 15-25 cm gyliu, kad herbicido likučiai vienodai pasiskirstytų dirvožemyje.

Jei dėl kokių nors priežasčių augalai žūva ar nesudygsta, ir kai herbicidas buvo panaudotas rudenį, tuomet pavasarį, dirvą sukultivavus 15-25 cm gyliu, galima atsėti vasariniais kviečiais, vasariniais miežiais, avižomis, vasariniais rapsais, cukriniais runkeliais, žirniais arba kukurūzais. Taip pat, remiantis įvairių šalių gera eksperimentine praktika (GEP) pavasarį dar galima atsėti šiais augalais: bulvėmis, pupomis, liucernomis, sojomis, saulėgrąžomis, linais, kopūstais, morkomis, petražolėmis ir pastarnokais. Kai tenka atsėti po herbicido panaudojimo pavasarį, atsėti be dirvos dirbimo arba su minimaliu 3-5 cm dirvos dirbimu galima tik šiais augalais: kukurūzais, pupomis, žirniais, lubiniais, sojomis ir saulėgrąžomis. Dirvą įdirbus 15-25 cm gyliu ir palaukus 2 mėnesius galima sėti ir sodinti kopūstus, bulves, linus ir pupeles.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje. **Stomp® CS** su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Stomp CS veikloji medžiaga pendimetalinas priklauso dinitroanilinų klasės herbicidams. Pagal HRAC klasifikaciją pendimetalinas priklauso 3 grupei (slopinantis ląstelių dalijimąsi). Kai kurioms vienaskilčių piktžolių rūšims (tokioms kaip: paprastosios rietmenės/*Echinochloa crus-galli* ir peliniai pašiaušėliai/*Alopecurus myosuroides*) gali išsivystyti atsparumas herbicidams, ir tai gali sumažinti veiksmingumą. Siekiant užkirsti tam kelią, reikia laikytis atsparumo mažinimo strategijos. Naudodami herbicidus, visada vadovaukitės HRAC ir mokslininkų rekomendacijomis, kad būtų sumažinta atsparumo išsivystymo rizika.

Maksimaliai naudokite kitas atsparumo mažinimo priemones (pvz.: sėjomaina, arimas, gilus dirvos dirbimas). Naudokite **Stomp CS** prieš piktžolių sudygimą. Suvėlinus panaudojimą, purškite mažas ir aktyviai augančias piktžoles arba darykite mišinius su kitais produktais su kitokiu veikimo būdu iš kitų cheminių klasių. Kituose sėjomaininiuose augaluose piktžoles naikinkite su kitais nuo vienaskilčių piktžolių veiksmingais herbicidais (pvz., su **Focus® Ultra**). Stebėkite laukus reguliariai ir išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Nenaudokite užmirkusiuose dirvose ir dirvose, linkusiose užmirkti.

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas >245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas >245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę ir mūvėti pirštines. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus.

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

Stomp CS galima puršksti su visais tinkamai sureguliuotais, žemės ūkio augalams puršksti skirtais purkštuvais. Purškimui visada naudokite tik gerai išplautą ir patikrintą purkštuvą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

PRIEŠ NAUDODAMI, HERBICIDO PAKUOTĘ GERAI SUPLAKITE.

Supilkite į purkštuvo rezervuarą $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ reikiamo vandens. Pradėkite maišymą. Įpilkite reikiamą kiekį **Stomp® CS** ir baikite pilti vandenį. Maišyklė turi dirbti viso purškimo metu. Paruoštas mišinys turi būti išpurškstas nedelsiant po paruošimo.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu iš karto po purškimo arba kai keičiate purškiamus produktus.

1. $\frac{1}{3}$ purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu. Išklaukite purkštuvo vidų ir leiskite cirkuliuoti visoje sistemoje. Panaudotą plovimui vandenį išpurškite ant tuo pačiu produktu apdoroto ploto. Skalavimui vandens naudokite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Procedūrą pakartokite tris kartus.
2. Nuplaukite traktorių ir purkštuvo išorę. Purkštukai ir filtrai turi būti nuimti ir išplauti atskirai, naudojant specialias purkštuvų plovimo priemones.

Purkštuvą turi būti plaunamas specialiai tam įrengtoje vietoje, bioaikštelėje arba ant tuo pačiu produktu apdorotų pasėlių.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose, atokiau nuo maisto ir pašarų. Saugokite nuo žemiau nurodytos temperatūros: 0 °C. Produkto savybės gali pasikeisti, jei produktas ilgą laiką yra laikomas žemesnėje nei nurodyta temperatūroje.

Saugokite nuo aukštesnės kaip 40 °C temperatūros. Jeigu produktas saugomas aukštesnėje nei nurodyta temperatūroje ilgą laikotarpį, gali pasikeisti produkto savybės. Venkite visų užsidegimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Venkite kraštutinių temperatūrų. Venkite pernelyg ilgo laikymo esant itin dideliame karščiui. Venkite užteršimo. Venkite elektrostatinės iškvėdos. Laikykite atskirai nuo oksiduojančių medžiagų. Laikykite atskirai nuo stipriai šarminių medžiagų. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 3 metus. **Dėmesio: produktas ardo žalvarį ir minkštą plieną.**

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

® BASF registruotas prekės ženklas