

LOS OVADOS 200 SE

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: acetamipridas 200 g/l (18,9%)

Produkto forma: suspoemulsija (SE)

LOS OVADOS 200 SE yra sisteminio ir kontaktinio veikimo, neonikotinoidų grupės insekticidas naudojamas kenkėjų kontrolei žieminiuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, vasariniuose rugiuose, bulvėse, pupelėse, pluoštui auginamuose linuose, pluoštui auginamose kanapėse, lubinuose, pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gumbiniuose salieruose, krienuose, griežčiuose, ropėse, cikorijose, braškėse, žemuogėse, baltagūžiuose kopūstuose, svogūnuose, askaloniniuose česnakuose, česnakuose, lęšiuose, vaismedžiuose (obelyse, kriaušėse, vyšniose, trešnėse, slyvose, baltažiedėse šliandrose, paprastosiose cidonijose), spygliuočių ir lapuočių augalų sodmenyse auginamuose miško medelynuose, dekoratyvinių augalų sodinukuose, tabake, vynmedžiuose, uoginiuose augaluose aukštesniuose nei 50 centimetrų (gervuogėse, ilgosiose gervuogėse, avietėse, šilauogėse), vaiskrūmiai ir medžiai su valgomomis uogomis (aronijose) ir baklažanuose auginamuose šiltnamyje.

Skirtas profesionaliajam naudojimui



ATSARGIAI

Kenksminga prarijus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti veido apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke, auginant žieminius rapsus, žieminius kviečius, kanapes, linus, svogūnus, česnakus, baltagūžius kopūstus, šaknines daržoves, uogas ir vaisiakrūmius.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke, auginant vaismedžius, dekoratyvinius augalus ir miško sodinukus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, kai purškiami vaismedžiai, dekoratyviniai ir miško augalai, tabakas, žemieniai kviečiai, vasariniai rugiai, vynmedžiai, uoginiai augalai aukštesni nei 50 centimetrų, vaiskrūmiai ir medžiai su valgomomis uogomis.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti

5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 % dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 90 % dulksną mažinančią įrangą, kai purškiami vaismedžiai, dekoratyviniai ir miško augalai, tabakas. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 % dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 % dulksną mažinančią įrangą, kai purškiami vynmedžiai, uoginiai augalai aukštesni nei 50 centimetrų, vaiskrūmiai ir medžiai su valgomomis uogomis.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotė: 0,1 l, 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 10 l, 20 l, 124 l, 220 l, 222 l

Registracijos Nr.: AS2-25I(2025)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas:

INNIGO Sp. z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 178,
02-486 Varšuva
Lenkija

Platintojai:

UAB Agrokonzernas
Vėrupės g. 1, Babtų kaimas
LT-54328 Kauno rajonas
Tel. +370 37 490490
el. paštas: info@agrokonzernas.lt

UAB BALTIC AGRO
Ukmergės g. 322,
LT-12106 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 270 1187
Faks.: +370 5 270 1711
www.balticagro.lt

ŽVALGUVA UAB
Metalistų g. 6,
LT-78107 Šiauliai, Lietuva
Tel.: +370 41 54 0219

AB LINAS AGRO
Smėlynės g. 2c,
LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 507354
Faks.: +370 45 507351
www.linasagro.lt

UAB SCANDAGRA
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 347 41 551
Faks.: +370 347 41 552
www.scandagra.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių

Augalai	Kenkėjai	Purškimo laikas	Purškimo norma, l/ha	Vandens kiekis, l/ha	Didžiausias purškimų skaičius per sezoną	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo	Pastabos
Bulvės	Kolorado vabalai ir jų lervos (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	Purkšti pavasarį-vasarą, išplitus kenkėjams, kai tarpuvagiuose lapais susidengia 50 % augalų iki visiško žydėjimo tarpsnio (BBCH 35 – 65)	0,1 – 0,15	200 – 300	1	7	Didesnę normą naudoti, jei masiškai išplitę kenkėjai.
Žieminiai rapsai	Kopūstiniai amarai (<i>Brevicoryne brassicae</i>), rapsiniai pjūkleliai (<i>Athalia rosae</i>), rapsinės spragės (<i>Psylliodes chrysocephala</i>), kopūstinės musės (<i>Delia radicum</i>)	Purkšti rudenį, 1 – 7 lapelių tarpsnyje (BBCH 10 – 17)	0,25 l/ha + 0,1 l/ha „Asystent +“	200 – 250	1	39	Produktą rekomenduoja ma naudoti su paviršiaus aktyviąja medžiaga Asystent+“.
	Rapsiniai žiedinukai (<i>Meligethes aeneus</i>)	Purkšti pavasarį, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau dar neišsiskleidę iki visiško žydėjimo tarpsnio (BBCH 55-65)	0,12 – 0,25	200 – 300			Didesnę normą naudoti, jei masiškai išplitę kenkėjai
	Ankštariniai paslėptastraubliai (<i>Ceutorhynchus assimilis</i>), ankštariniai gumbauodžiai (<i>Dasineura brassicae</i>)	Purkšti pavasarį, žydėjimo tarpsnyje, kai 20 % žiedų žydi ant pagrindinio stiebo iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 62-69)	0,12 – 0,25	200 – 300			Didesnę normą naudoti, jei masiškai išplitę kenkėjai
	Kopūstiniai paslėptastraubliai (<i>Ceutorhynchus quadridens</i>)	Purkšti pavasarį, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau dar neišsiskleidę iki tada, kai žydėjimas baigiasi, dauguma žiedlapių krenta (BBCH 55–67).	0,12 – 0,25	200 – 300			Didesnę normą naudoti, jei masiškai išplitę kenkėjai

Augalai	Kenkėjai	Purškimo laikas	Purškimo norma, l/ha	Vandens kiekis, l/ha	Didžiausias purškimų skaičius per sezoną	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo	Pastabos
Obelys	<i>Amarai</i> : žaliasis obelinis amaras (<i>Aphis pomi</i>), pilkasis obelinis amaras (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	Purkšti išplitus kenkėjams. Purškimą atlikti nuo žydėjimo tapsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių užsimezgimo pradžios, kai vaisiai padidėja iki 10 mm, dalis vaisių po žydėjimo krenta (BBCH 69-71).	0,125	700-750	1	14	
	Obuolinis vaisėdis (<i>Cydia pomonella</i>)	Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vystymosi, kai vaisių diametras padidėja iki 40 mm, vaisius status (T – stadija) (BBCH 69-74).	0,2	700-750	1-2	14	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 30 dienų.
Žieminiai kviečiai	<i>Amarai (Aphididae)</i>	Purkšti rudenį, kenkėjams atskridus į lauką nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) (BBCH 13–21).	0,2	250-300	1	30	
	Raudonkrūtis lemas (<i>Oulema melanopus</i>), javinis amaras (<i>Sitobion avenae</i>)	Purkšti pavasarį-vasarą, kenkėjams atskridus į lauką nuo plaukėjimo pradžios iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 51–77).	0,2	200-300	1	30	
Vasariniai rugiai*	<i>Amarai (Aphididae)</i> , lemai (<i>Oulema sp.</i>)	Purkšti pavasarį, kenkėjams atskridus į lauką nuo plaukėjimo pradžios iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 51–77).	0,2 l/ha	200-300	1	30	
Lęšiai *	Daiginė žiedenė (<i>Delia platura</i>), daiginės muselės (<i>Delia florilega</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), pupiniai grūdinkai (<i>Bruchus rufimanus</i>)	Purkšti išplitus kenkėjams, nuo tarpsnio, kai nėra šoninių ūglių, iki tarpsnio, kai matomi 9 ar daugiau tarpamblių (BBCH 20-39), arba nuo tarpsnio,	0,2	200-300	1	10	

		kai matomi pirmieji žiedlapiai ir daugelis atskirų žiedpumpurių dar neužsimezgę, iki tarpsnio, kai beveik visos ankštys tamsios, o sėklos sausos ir kietos (BBCH 50-89).					
Pupelės*	Daiginė žiedenė (<i>Delia platura</i>), daiginės muselės (<i>Delia florilega</i>), žirminis tripsas (<i>Kakothrips robustus</i>), tabakinis tripsas (<i>Thrips tabaci</i>), grūdinukai (<i>Acanthoscelides</i>), žolblakės (<i>Lygus sp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti išplitus kenkėjams, nuo tarpsnio, kai nėra šoninių ūglių, iki tarpsnio, kai matomi 9 ar daugiau tarpamblių (BBCH 20-39), arba nuo tarpsnio, kai matomi pirmieji žiedlapiai ir daugelis atskirų žiedpumpurių dar neužsimezgę, iki tarpsnio, kai beveik visos ankštys tamsios, o sėklos sausos ir kietos (BBCH 50-89)	0,2	200-300	1	10	
Lubinai (baltažiedžiai, siauralapiai, geltonieji)	Sitonai (<i>Sitona sp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), tripsai (<i>Thysanoptera</i>), įvairiaspalvės žolblakės (<i>Lygus rugulipennis</i>), žirminis vaisėdis (<i>Cydia nigricana</i>)	Purkšti išplitus kenkėjams, nuo skrotelių vystymosi pradžios iki ūglių vystymosi (ilgėjimo) fazės pabaigos (BBCH 20-39) arba nuo žiedyno vystymosi fazės pradžios, kol 75 % ankščių pasiekia tipiską ilgį (BBCH 50-79).	0,2	200-300	1	10	
Vyšnios, trešnės*	Vyšninės musės (<i>Rhagoletis cerasi</i>), Amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti išplitus kenkėjams. Purkšti, nuo tada kai vaisiai pasiekia 90 proc. įprasto dydžio iki nokimo pradžios, vaisiaus nusispalvinimo pradžia (BBCH 79–81).	0,125	750	1	14	
Kriaušės*	Žaliasis obelinis amaras (<i>Aphis pomi</i>), pilkasis obelinis amaras (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vartojimo brandos (BBCH 69–87).	0,125-0,2	750	2	14	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 30 dienų.

Slyvos*	Amarai (<i>Aphididae</i>), obuolinis vaisėdis (<i>Cydia pomonella</i>), slyviniai pjūkleliai (<i>Hoplocampa spp.</i>), serbentiniai skydamariai (<i>Parthenolecanium corni</i>)	Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vartojimo brandos (vaisius turi būdingą skonį ir tvirtumą (BBCH 69–89).	0,125-0,2	600-1000	1-2	14	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 30 dienų.
Baltažiedės šliandros, paprastosios cidonijos*	Amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę), iki kai vaisių diametras padidėja iki 40 mm, vaisius status (T – stadija) (BBCH 69–74).	0,2	750	1-2	14	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 30 – 40 dienų.
Vynmedžiai*	Gluosninis pandemis (<i>Pandemis heparana</i>), tinkliškoji adoksofija (<i>Adoxophyes orana</i>), rožinis lapsukis ir kiti lapsukis (<i>Archips rosanus/Archips sp</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), sodinis grambuolėlis-grikinukas (<i>Phyllopertha horticola</i>)	Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki visiško žydėjimo tarpsnio (BBCH 51–65).	0,2 l/ha	200-750	1	7	
Gervuogės, avietės, ilgosios gervuogės aviečių ir gervuogių hibridai*	Tinkliškoji adoksofija (<i>Adoxophyes orana</i>), rožinis lapsukis ir kiti lapsukis (<i>Archips rosanus/Archips sp</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), avietinė purpurinė kandis (<i>Incurvaria rubiella</i>), avietinis žiedgraužis (<i>Anthonomus rubi</i>), paprastas avietinukas (<i>Byturus tomentosus</i>), avietinis ūglinis gumbauodis (<i>Resseliella theobaldi</i>)	Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki visiško žydėjimo tarpsnio (50 % žiedų išsiskleidę) (BBCH 51–65).	0,2 l/ha	200-750	1	7	
Avietės*	Avietinis stiklasparnis (<i>Pennisetia hylaeiformis</i>)	Nuėmus vaisių derlių purkšti augalus ir po jais esančią dirvą (BBCH > 89).	0,2	200-750	1	-	
Šilauogės*	Gluosninis pandemis (<i>Pandemis heparana</i>),	Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios (pasirodo	0,15 l/ha	200-750	1	7	

	tinkliškoji adoksofija (<i>Adoxophyes orana</i>), rožinis lapsukis ir kiti lapsukis (<i>Archips rosanus/Archips sp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), sodinis grambruoliukas (<i>Phyllopertha horticola</i>), šilauoginis gumbauodis (<i>Dasineura vaccinii</i>)	pirmieji žiedpumpuriai) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69).					
Braškės, žemuogės*	Braškinis amaras (<i>Aphis forbesi</i>), žolblakės (<i>Lygus sp.</i>), avietinis žiedgraužis (<i>Anthonomus rubi</i>), sodinis grambruoliukas (<i>Phyllopertha horticola</i>), žemuoginis lapsukis (<i>Ancyliis comptana</i>), braškinis lapsukis (<i>Acleris comariana</i>), tripsai (<i>Thrips spp</i>)	Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69).	0,15 l/ha	200-750	1	7	Didžiausias purškimų skaičius per braškių vegetacijos sezoną, atsižvelgiant į produkto naudojimą tolimesnėje etiketės dalyje: 1.
Braškės*	Pjovėjai (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>), tripsai (<i>Thrips spp</i>)	Nuėmus vaisių derlių purkšti augalus ir po jais esančią dirvą (BBCH > 89).	0,15	500-900	1	-	
Aronijos, *	Liucerninis pjovėjas (<i>Otiorhynchus ligustici</i>), vynuoginis pjovėjas (<i>Otiorhynchus sulcatus</i>), rožinis lapsukis ir kiti lapsukis (<i>Archips rosanus/Archips sp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), sodinis grambruoliukas (<i>Phyllopertha horticola</i>), rožinis tripsas (<i>Thrips fuscipennis</i>), Mineola vaccinii	Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69).	0,2 l/ha	200-750	1	7	
Tabakas*	Tabakinis tripsas (<i>Thrips tabaci</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo šoninių ūglių formavimosi ant pagrindinio ūglio pradžios iki 50 % sėklų dėžučių subrendę (BBCH 20–85).	0,2	600-1000	1-2	-	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 20-30 dienų.
Pluoštui auginami linai*	Amarai (<i>Aphididae</i>), melsvoji spragė (<i>Aphthona euphorbiae</i>), juodoji	Purkšti nuo tarpsnio, kai susiformuoja 50 % žiedinių pumpurų, iki	0,12-0,25	200-300	1	-	

	spragė (<i>Longitarsus parvulus</i>)	žydėjimo pabaigos (BBCH 55–69).					
Pluoštui auginamos kanapės*	Amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo tarpsnio, kai susiformuoja 50 % žiedinių pumpurų, iki žydėjimo pabaigos (BBCH 55–69).	0,12-0,25	200-300	1	-	
Svogūnai, askaloniniai česnakai, česnakai*	Svogūninis vakarinis paslėptastraublis (<i>Ceutorhynchus suturalis</i>), svogūninė kandis (<i>Acrolepia assectella</i>), tripsai (<i>Thrips sp.</i>), daiginės muselės (<i>Delia florilega</i>), daiginė žiedenė (<i>Delia platura</i>), svogūninė musė, (<i>Delia antiqua</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo lapų vystymosi pradžios, bet ne vėliau kaip iki derlingųjų vegetatyvinių dalių vystymosi pradžios (BBCH 10–39).	0,2 l/ha	200-300	1	14	
Baltagūžiai kopūstai*	Spragės (<i>Phyllotreta sp.</i>), kopūstinis paslėptastraublis (<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>), rapsinis paslėptastraublis (<i>Ceutorhynchus napi</i>), rapsinis pjūklelis (<i>Athalia rosae</i>), tripsai (<i>Thrips sp.</i>), kopūstinės musės (<i>Delia radicum</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo galutinio lapų vystymosi tarpsnio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki gūžių formavimosi pradžios (BBCH 20–39).	0,2 l/ha	200-300	2	27	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienų.
Pašariniai runkeliai*	Skersadryžis runkelinis straubliukas (<i>Bothynoderes punctiventris</i>)	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	
Burokėliai*	Runkelinės spragės (<i>Chateocnema concinna</i>), runkeliniai daigagraužiai (<i>Atomaria linearis</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	
Gumbiniai salierai*	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>), ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>), gaminiai žvilgūnai (<i>Autographa gamma</i>), kopūstinės kandysų (<i>Plutella xylostella</i>), kopūstiniai pelėdgalviai (<i>Mamestra</i>	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	

	<i>brassicae</i>) ir kiti vikšrai pažeidžiantys lapus, salierinės minamusės (<i>Euleia heracleid</i>), morkinė musė (<i>Psila rosae</i>), žolblakės (<i>Lygus sp</i>), stepiniai dykrinukai (<i>Spodoptera exigua</i>), afrikiniai dykrinukai (<i>Spodoptera littoralis</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)						
Valgomieji krienai*	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>), ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>), gaminiai žvilgūnai (<i>Autographa gamma</i>), kopūstinės kandys (<i>Plutella xylostella</i>), kopūstiniai pelėdgalviai (<i>Mamestra brassicae</i>) ir kiti vikšrai pažeidžiantys lapus, krieninės kopūstinukės (<i>Phyllotreta armoraciae</i>), kryžmažiedinė spragė (<i>Phyllotreta nemorum</i>), lenktajuostės kopūstinukės (<i>Phyllotreta undulata</i>), juodosios kopūstinukės (<i>Phyllotreta atra</i>), melsvosios kopūstinukės (<i>Phyllotreta nigroes</i>) ir kitos kopūstinukės, amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	
Griežčiai, ropės*	Kopūstinis baltukas (<i>Pieris brassicae</i>), ropinis baltukas (<i>Pieris rapae</i>), gaminiai žvilgūnai (<i>Autographa gamma</i>), kopūstinė kandis (<i>Plutella xylostella</i>), kopūstiniai pelėdgalviai (<i>Mamestra brassicae</i>) ir kiti vikšrai pažeidžiantys lapus, kopūstinukės	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	

	(<i>Phyllotreta sp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>)						
Cikorijos (šaknis) *	Gaminiai žvilgūnai (<i>Autographa gamma</i>), kopūstiniai pelėdgalviai (<i>Mamestra brassicae</i>) ir kiti vikšrai pažeidžiantys lapus, amarai (<i>Aphididae</i>)	Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12–19).	0,25	300-400	1	-	
Baklažanai (auginami šiltnamiuose).	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), tabakinis tripsas (<i>Thrips tabaci</i>), vakarinis tripsas (<i>Frankliniella occidentalis</i>), minamusės (<i>Phytomyza spp.</i>), amarai (<i>Aphididae</i>), žolblakės (<i>Lygus spp.</i>), spragės (<i>Alticini spp.</i>)	Purkšti nuo tada kai išsiskleidžia pirmasis tikrasis lapelis ant pagrindinio stiebo iki tada kai visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 11–89).	0,24-0,3	600-750	1	3	Produktą leidžiama naudoti tik nuolatinės konstrukcijos šiltnamiuose, izoliuotuose nuo grunto.
			0,12-0,2	300-500	1-2	3	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 20- 30 dienų.
Dekoratyviniai augalai ir miško sodinukai, miško medžių atnaujinimas, įmiškinimas *	Amarai (<i>Aphididae</i>), podūros (<i>Collembola</i>), maumedinės makštikandės (<i>Coleophora laricella</i>)	Purkšti nuo pirmųjų lapelių atsiradimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 11- 69).	0,2	200-400	1-2	-	Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 30 dienų.

VEIKIMO BŪDAS

LOS OVADOS 200 SE , kurio sudėtyje yra veiklioji medžiaga acetamipridas, yra sisteminio ir kontaktinio veikimo, neonicotinoidų grupės insekticidas, pasižymintis neurotoksinio poveikiu (nikotininio ACh receptorių postsinapsinėje membranoje blokada). Patekęs į kenkėjo organizmą pažeidžia jo centrinę nervų sistemą. Kenkėjai nustoja maitintis iš karto po nupurškimo, jų judesiai tampa nekoordinuoti ir per 1-2 dienas kenkėjai numiršta. LOS OVADOS 200 SE pasižymi stipriu sisteminiu veikimu: nupurkštas ant lapų labai greitai įsiskverbia į augalo audinius ir pasiskleidžia po visą augalą, taip užtikrindamas ilgalaikę apsaugą nuo kenkėjų.

*MAŽAIS PLOTAIS AUGINAMI AUGALAI

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS:

Naudojimas vasariniuose rugiuose, lęšiuose, pupelėse, lubinuose, vyšniose, trešnėse, kriaušėse, slyvose, baltažiedėse šliandrose, vynmedžiuose, paprastosiose cidonijose, gervuogėse, avietėse, ilgosiose gervuogėse, aviečių ir gervuogių hibriduose, šilauogėse, braškėse, žemuogėse, aronijose, tabake, pluoštui auginamuose linuose, pluoštui auginamose kanapėse, svogūnuose, askaloniniuose česnakuose, česnakuose, baltagūžiuose kopūstuose, pašariniuose runkeluose, burokėliuose, gumbiniuose salieruose, krienuose, griežčiuose, ropėse, cikorijose, baklažanuose, dekoratyviniuose augaluose ir miško sodinukuose LOS OVADOS 200 SE registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Dėmesio! Draudžiama purkšti žydinčius augalus (žieminiai rapsai, pupelės, lubinai, lęšiai), vaismedžiai (obelys, kriaušės, vyšnios, trešnės, slyvos, baltažiedės šliandros, paprastosios cidonijos), uoginiai augalai (gervuogės, ilgosios gervuogės, avietės, šilauogės, braškės, žemuogės,), aronijos, **kuriuos apdulkina bitės ir**

kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. ir būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

PASTABOS

Siekiant veiksmingai sunaikinti kenkėjus, svarbu LOS OVADOS 200 SE padengti visas augalų dalis.

FITOTOKSIŠKUMAS

Naudojant pagal etiketės rekomendacijas LOS OVADOS 200 SE yra nefitotoksiškas.

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA (PAM)

Esant prastesnėms oro sąlygoms, norint gauti geresnį produkto veikimą rekomenduojama pridėti paviršiaus aktyvios medžiagos Asysent+.

Dėmesio! LOS OVADOS 200 SE mišinių su PAM poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nevertintas. Perskaitykite PAM etiketę prieš naudojimą. Naudojant produktą kartu su PAM, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas naudojamo PAM etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.

Jei dėl kokių nors priežasčių LOS OVADOS 200 SE purškimas pasėlis žuvo, nenaudoti produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, vėliau auginamiems augalams apdoroti.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

LOS OVADOS 200 SE sudėtyje yra acetamiprido – neonikotinoidų grupės junginys (su nikotino acetilocholino receptoriais sąveikaujantys insekticidai (Ach) – grupė IRAC 4A).

Pagal IRAC klasifikaciją veiklioji medžiaga acetamipiridas priskiriamas 4A grupei. Siekiant sumažinti kenkėjų atsparumo išsivystymo riziką, rekomenduojama:

- naudoti insekticidą tik etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis;
- nevirsyti rekomenduotų apdorojimo produktu kartų per vegetacijos laikotarpį;
- esant būtinybei naudokite kitus insekticidus, kurių sudėtyje yra kitų grupių ir kitą veikimo mechanizmą turinčios veikliosios medžiagos.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org

*IRAC – veiklos su atsparumu insekticidams komitetas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s.

Augalų apsaugos produktą naudoti, kai oro temperatūra žemesnė nei 20 °C. Esant aukštesnei temperatūrai, purkšti dienos pabaigoje.

Nenaudoti produkto šarminiame dirvožemyje auginant žieminius rapsus ir vasarinių rapsus.

Žaliųjų augalų dalių nenaudoti pašarui.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! Kadangi šis produktas naudojamas kartu su paviršiaus aktyviaja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones.

LOS OVADOS 200 SE naudojimas lauko sąlygomis:

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo

reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt.

Purškiant lauko ar sodo purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥ 300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥ 245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius ir purškiant būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus. **Dėmesio!** Baltagūžių kopūstų priežiūros darbams būtina išlaikyti 27 dienų saugų laukimo laikotarpį, tik po kurio galima eiti į baltagūžių kopūstų plotus apdorotus LOS OVADOS 200 SE.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko purkštuvais privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos, o purkšdami sodo purkštuvais privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

LOS OVADOS 200 SE naudojimas šiltnamiuose:

- **kai operatorius purškimo metu techniškai gali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:**

Saugos priemonės operatoriams ir darbuotojams tokios pačios kaip ir lauko sąlygomis.

- **kai operatorius, susiformavus tankiai augalų lapijai, purškimo metu techniškai negali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:**

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥ 300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥ 245 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4$ mm) ar kt. Būtina dėvėti veido skydelį (atitinkantį standartą LST EN 166).

Purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina dėvėti neperšlampamą ir cheminėms medžiagoms atsparų vientisą kombinezoną arba dviejų dalių kostiumą, užtikrinantį ne mažesnę apsaugą nei 3 tipo apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų (atitinkanti standartą LST EN 14605). Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į šiltnamyje apdorotus plotus, galima įeiti po 1 paros ir tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

- **Po apdorojimo augalų apsaugos produktu visi šiltnamio patalpų įėjimai privalo būti užrakinti ir į jas draudžiama įeiti mažiausiai 1 parą.**

- **Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus**, privalo būti išlaikyta ne mažesnė kaip 5 metrų apsaugos zona nuo šiltnamio iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

LOS OVADOS 200 SE purškiamas įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais ar savaeigiais lauko purkštuvais. Rekomenduojama LOS OVADOS 200 SE purškimui naudoti vidutinio smulkumo purkštukus.

Šiltnamiuose purškiama rankiniais, nugariniais purkštuvais.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalą būtina paruošti prieš pat jį naudojant.

Prieš pradėdant ruošti tirpalą tiksliai nustatykite reikiamą jo tūrį ir produkto kiekį. Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo instrukcijos nurodymų. Jeigu instrukcijos nėra, atmatuotą produkto kiekį pilti į purkštuvo rezervuarą, iš dalies pripildytą vandens (kai maišytuvas įjungtas).

Tuščias pakuotes tris kartus praskalauti vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvo rezervuarą su purškiamu skysčiu, įpilti vandens iki reikiamo kiekio ir gerai išmaišyti. Jeigu purkštuvo rezervuaras neturi hidraulinio maišytuvo, įpiltą į rezervuarą skystį išmaišyti mechaniniu būdu.

Jeigu purškiant daromos pertraukos, prieš pradėdant purkšti iš naujo, būtina gerai išmaišyti purkštuvo rezervuare esantį purškiamą skystį.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švari vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandeni išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus. Purškiamo skysčio likučius ir įrangai plauti naudojamą vandenį būtina:

- jeigu įmanoma, prieš tai praskiedus sunaudoti ant paviršiaus, kuriame buvo atliekamas apdorojimas, arba
- nukenksminti taikant techninius sprendimus, užtikrinančius augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų biologinį skaidomumą, arba
- nukenksminti kitu atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytu būdu.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Augalų apsaugos produktą laikyti originalioje pakuotėje, 0 – 30 °C temperatūroje. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.