

SIVANTO PRIME

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: flupiradifuronas 200 g/l (17.09%)

Produkto forma: tirpus koncentratas.

SIVANTO PRIME – sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti kenkėjus bulvėse, cukriniuose runkeliuose, apyniuose, obelyse, kriaušėse, braškėse, vynuogėse, avietėse, salotose, morkose, žirniuose, pupose, bei šiltnamyje auginamoms dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate cukinijose, arbūzuose, pomidoruose, baklažanuose, paprikose, tulpėse, kalijose, hiacintuose, narcizuose, lelijose, dauginimui auginamose svogūninėse ir šakniagumbinėse gėlėse, medelynuose.

Insekticidas SIVANTO PRIME registruotas pašariniams runkeliams, šviežioms pupelėms be ir su ankštimis, žaliems žirneliams be ir su ankštimis, stambiašaknėms cikorijoms, vyšnioms, slyvoms, gervuogėms, bei šiltnamyje, dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate skynimui auginamoms gėlėms, skynimui auginamoms gėlėms, auginamiems dekoratyviniams augalams ir dekoratyviniams spygliuočiams, apželdinimui skirtiems ir miško medžiams, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kenksminga įkvėpus.

Gali pakenkti organams (raumenims), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, savo sudėtyje turinčio flupiradifurono, dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti dulkiško molio dirvožemiuose.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0.6 l/ha), vynuogės, apyniai ir salotos (norma 0.3 l/ha).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0.4 l/ha), kriaušės, vyšnios, slyvos, gervuogės ir avietės auginamos lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais, kai purškiamos morkos, bulvės, žirniai ir pupos.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 20 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 3 m apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos obelys (norma 0.6 l/ha) ir apyniai.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 3 m apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos vynuogės, gervuogės ir avietės auginamos lauke.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus būtina išlaikyti 10 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 15 m apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus arba išlaikyti 3 m apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančius purkštukus, kai purškiamos vyšnios, slyvos, kriaušės, obelys (norma 0.4 l/ha).

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362052.

Pakuotė: 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l

Registracijos Nr.: AS2-56I(2026)

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Gamintojas/registracijos savininkas:

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1

51373 Leverkusen, Vokietija

Atstovai Lietuvoje: tel. +370 614 23997.

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMAS

SIVANTO PRIME naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų.

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Naudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
Bulvės	Kolorado vabalai (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>), amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.3	Nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 31)	1	-	7	150 - 600
Cukriniai runkeliai	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.25	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	150 - 400
Apyniai	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.4	Pasirodžius kenkėjams	1	-	21	2000 - 3300
Obelys	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.4	Iki žydėjimo vidurio (BBCH 10-65)	1	-	-	Iki 1000
	Amarai (<i>Aphids spp.</i>), Obelinė blakutė (<i>Cacopsylla mali</i>)	0.6				-	1000 - 1500
Kriaušės	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.4	Iki žydėjimo vidurio (BBCH 10-65)	1	-	-	1000 - 1500
Braškės (auginamos dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje)	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tabakinis baltasparnis (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.625	Pasirodžius kenkėjams	2	10	3	600 - 1000
	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.5					
Braškės (auginamos dirvožemyje ir dengtos plėvele)	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.5	Nuo ūsų formavimosi pradžios	1	-	3	600 - 1000
Vynuogės (auginamos lauke)	Cikados (<i>Auchnorrhyncha spp.</i>)	0.5	Nuo žiedyno susiformavimo iki uogų nokimo pradžios (BBCH 57-81)	1	-	14	400 - 1200
	Cikadelė (<i>Empoasca vitis</i>)	0.24					
Avietės (auginamos dirbtiniame ar su žeme)	Amarai (<i>Aphids spp.</i>)	0.5	Pasirodžius kenkėjams	2	10	3	150 - 1200

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Naudojimo laikas	Didžiausi as purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje)							
Salotos (auginamos lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0,4	Nuo dviejų išsiskleidusių lapelių iki gūžės formavimosi pradžios (BBCH 12-40)	1	-	3	200 - 800
		0.3	Nuo gūžės formavimosi pradžios (BBCH 41-49)				500 - 800
Cukinijos (auginamos dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje)	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tabakinis baltasparnis (<i>Bemisia tabaci</i>), Moliūginis amaras (<i>Aphis gossypii</i>)	0.56	Pasirodžius kenkėjams	2	10	3	Iki 750
	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.45					
Arbūzai (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje)	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tabakinis baltasparnis (<i>Bemisia tabaci</i>), Moliūginis amaras (<i>Aphis gossypii</i>)	0.56	Pasirodžius kenkėjams	2	10	3	Iki 750
	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.45					
Pomidorai, baklažanai, paprikos (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, šiltnamyje)	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tabakinis baltasparnis (<i>Bemisia tabaci</i>), Moliūginis amaras (<i>Aphis gossypii</i>)	0.56	Pasirodžius kenkėjams	2	10	3	Iki 750
	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.45					

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Naudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
Morkos (auginamos lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.25	Nuo devynių išsiskleidusių lapelių iki visiško išsivystymo (BBCH 19-49)	1	-	21	150 - 800
Tulpės, kalijos, hiacintai, narcizai, lelijos (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.5	Nuo žydėjimo pradžios	1	-	-	150 - 400
Dauginimui auginamos svogūninės ir šakniagumbinės gėlės (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate uždarame šiltnamyje)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.5	Pasirodžius kenkėjams	4	7	-	500 - 1000
Dekoratyviniams ir miško sodinukams (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate, uždarame šiltnamyje)	Šiltnaminis baltasparnis (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Tabakinis baltasparnis (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.75	Pasirodžius kenkėjams	4	7	-	250 - 1000 l/ha
	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.5					
Žirniai	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.375	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	200 - 750
			Nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30)				

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Naudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
Pupos	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.28	Nuo pirmos iki 9 matomos šoninės atšakos (BBCH 21-29)	1	-	-	200 - 750
			Nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51)			-	
						-	

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS:

Insekticidas SIVANTO PRIME pašariniams runkeliams, pupelėms be ir su ankštimis, žirneliams be ir su ankštimis, stambiašaknėms cikorijoms, vyšnioms, slyvoms, gervuogėms, avietėms, dekoratyviniams augalams ir dekoratyviniams spygliuočių augalams, registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį aukščiau minėtiems ir žemiau lentelėje nurodytiems augalams prisiima produkto naudotojas.

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Panaudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
Pašariniai runkeliai	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.25	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	150 - 400
Stambiašaknės cikorijos	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.25	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	150 - 400
Vyšnios	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.375	Po žydėjimo	1	-	7	200 - 1500
Slyvos	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.375	Po žydėjimo	1	-	14	200 - 1500
Gervuogės (auginamos dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiam)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.3	Pasirodžius kenkėjams	1	-	3	150 - 1200

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Panaudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
e substrate šiltnamyje)							
Gervuogės ir avietės (auginamos lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.3		1	-		
Šviežios pupelės su ankštėmis (auginamos lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.28	Nuo pirmos iki 9 matomos šoninės atšakos (BBCH 21-29)	1	-	-	200 - 750
			Nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51)			7	
Šviežios pupelės be ankščių (auginamos lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.28	Nuo pirmos iki 9 matomos šoninės atšakos (BBCH 21-29)	1	-	-	200 - 750
			Nuo pirmųjų matomų žiedų (BBCH 51)			3	
Žali žirneliai su ankštėmis (auginami lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.375	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	200 - 750
			Nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30)			7	
Žali žirneliai be ankščių (auginami lauke)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.375	Nuo dviejų iki devynių lapelių tarpsnio (BBCH 12-19)	1	-	-	200 - 750
			Nuo stiebo ilgėjimo pradžios (BBCH 30)			3	
Dekoratyviniai spygliuočiai augalai (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate arba uždareme šiltnamyje)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.)	0.5	Pasirodžius kenkėjams	1	-	-	300 - 1000

Augalai	Kenkėjai	Norma, l/ha	Panaudojimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Minimalus dienų skaičius tarp purškimų	Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo	Vandens kiekis min. – maks., l/ha
Dekoratyviniai augalai, įskaitant skynimui auginamas gėles (auginami dirbtiniame ar su žeme nesiliečiančiame substrate arba uždarene šiltnamyje)	Amarai (<i>Aphids</i> spp.), Cikados (<i>Auchenorrhyncha</i> spp.)	0.5	Pasirodžius kenkėjams	1	-	-	500 - 1000

REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS:

Ruošiant mišinį purškimui yra labai svarbu naudoti pakankamą vandens kiekį ir vengti didelių koncentracijų.

Esant didelei koncentracijai mažėja SIVANTO PRIME tirpumas vandenyje, todėl rekomenduojama 1 l vandens maišyti su ne daugiau kaip 25 ml SIVANTO PRIME.

Purškiant bulves naudoti 150 - 600 l/ha vandens.

Purškiant ankštinius augalus naudoti 200 - 750 l/ha vandens.

PASTABOS:

Po produkto panaudojimo, į šiltnamį galima įeiti tirpalui nudžiūvus nuo augalų ir šiltnamį dvi valandas pravėdinus. Laikantis šių reikalavimų, kiti darbai gali būti atliekami be papildomų apsaugos priemonių.

Siekiant apsaugoti bites, SIVANTO PRIME nenaudoti mišiniuose su DMI grupės fungicidais (FRAC G1) žydinčiuose augaluose ir pasėliuose, kuriuose yra žydinčių piktžolių.

Kriaušių pasėlius purkšti tik naudojant traktorinius purkštuvus.

Lietus praėjus 2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

DĖMESIO!

Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius draudžiama purkšti žydinčius obelis, kriaušes, vynuoges, gervuoges, braškes ir avietes (auginamos lauke), žirnius, pupas, žalius žirnelius su ankštimis ir be ankščių, švežias pupeles su ankštimis ir be ankščių nuo 4 val. iki 21 val.

SIVANTO PRIME mišinius su DMI fungicidais (FRAC G1) galima naudoti ant žydinčių augalų šiltnamiuose, jeigu į juos nepatenka bitės ar kamanės.

SIVANTO PRIME veiklioji medžiaga gali būti absorbuota vėliau auginamų augalų. Po purškimo SIVANTO PRIME, rekomenduojama palaukti metus laiko prieš auginant pekininius kopūstus tame pačiame lauke.

FITOTOKSIŠKUMAS

Neatmetama galimybė, kad po SIVANTO PRIME panaudojimo gali pasireikšti neigiamas poveikis tam tikroms aviečių veislėms. Dėl šios priežasties visada išbandykite rekomenduojamą normą nedideliame plote. SIVANTO PRIME nerekomenduojama naudoti Kwanza aviečių veislėje.

Atsižvelgiant į tai, jog yra labai daug veislių ir skirtingų auginimo būdų, dauginimui auginant svogūnines ir šakniagumbines gėles, neįmanoma įvertinti augalų jautrumo visose situacijose ir visose veislėse. Neturint patirties su šiuo produktu, prieš purškiant pasitikrinti veislės jautrumą mažame plote.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

SIVANTO PRIME veiklioji medžiaga flupiradifuronas priklauso nikotino acetilcholino receptorių agonistų grupei, butenolidų cheminiam pogrupiui, IRAC/MoA kodas 4D. Nors yra žinoma, kad 4A, 4B, 4C ir 4D grupėms priklausančios veikliosios medžiagos veikia į tą pačią tikslinę vietą, turimos žinios leidžia teigti, kad kryžminio atsparumo išsivystymas tarp šių veikliųjų medžiagų yra mažai tikėtinas.

Pakartotinis to paties produkto ar tos pačios veikimo grupės produktų naudojimas gali sąlygoti atsparumo išsivystymą. Siekiant to išvengti, rekomenduojama insekticidus naudoti mišiniuose ar reguliariai vienus keisti kitais, taikyti kitas kenkėjų mažinimo priemones (chemines, biologines). Neatmetama, kad gali išsivystyti kenkėjų atsparumas insekticidui SIVANTO PRIME. Kadangi gamintojas negali numatyti tokių populiacijų išsivystymo, Bayer neprisiima atsakomybės už galimus nuostolius, atsiradusius dėl atsparių kenkėjų populiacijų.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį. Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.

Pildant purkštuvą laikytis purkštovo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, į purkštovo talpą supilti pusę purškimui skirtą vandens, įjungti maišyklę, tuomet supilti tiksliai pamatuotą produkto kiekį. Gerai išmaišyti ir supilti likusį reikiamą kiekį vandens. Jei purkštuvas be hidraulinio maišytuvo, tirpalą išmaišyti mechaniškai. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštovo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 2 kartus kruopščiai išplaukite purkštovo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštovo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

SIVANTO PRIME mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$), chloropreno ($\geq 0,5 \text{ mm}$), butilo ($\geq 0,7 \text{ mm}$) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Purškiant lauko/sodo purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $>300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Sivanto Prime naudojimas šiltnamiuose:

- kai operatorius purškimo metu techniškai gali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija: Saugos priemonės operatoriams ir darbuotojams tokios pačios kaip ir lauko sąlygomis.
- kai operatorius, susiformavus tankiai augalų lapijai, purškimo metu techniškai negali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti veido skydelį (atitinkantį standartą LST EN 166).

Purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina dėvėti neperšlampamą ir cheminėms medžiagoms atsparų vientisą kombinezoną arba dviejų dalių kostiumą, užtikrinantį ne mažesnę apsaugą nei 3 tipo apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų (atitinkanti standartą LST EN 14605). Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mėvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos. Purškiant vynuoges ir vaismedžius, operatoriai

privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: naudoti vandens srovė, alkoholiui atsparias putas, anglies dioksidą. Netinkama gaisro gesinimo priemonė: aukšto spaudimo vandens srovė.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvų talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, taip pat laikantis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Galiojimo laikas 2 metai.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

®- registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas.