



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *VITRA 40 WG* ĮREGISTRAVIMO NEPROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI**

2026 m. rugpjūčio 19 d. Nr. A1-505
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 33 straipsniu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į *Vitra 40 WG* registracijos ataskaitos išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Vitra 40 WG*, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV), neprofesionaliajam naudojimui iki 2030 birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: vario hidroksidas (vario 400 g/kg) – 640 g/kg.

1.2. Fungicido forma: vandenyje dispersiškos granulės.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklintas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojoingumo frazės:

Kenksminga prarijus.

Kenksminga įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / dulksnos.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra vario daugiau kaip 40 g/100 m² per metus.

1.4. Pakuotė: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,25 kg, 0,5 kg

1.5. Fungicidas naudojamas:

Abrikosams, slyvoms, vyšnioms, persikams ir nektarinams.

Norma: 12,5 g/100 m² lapų lajos ploto.

Saugo nuo šratligės.

Purkšti pirmą kartą, kai prasideda lapų kritimas iki 50 proc. lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę (BBCH 93-95), antrą kartą, kai apie 50 proc. lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę iki kai visi lapai nukritę (BBCH 95-97), trečią kartą, kai lapiniai pumpurai pastebimai išbrinkę, matomos šviesesnės pumpuro žvynelių vietos iki žvyneliai jau prasiskyrę ir matosi šviesiai žalios pumpuro dalys (BBCH 01-03), ketvirtą kartą, kai pumpurai dar uždari, matomos šviesiai rudos žvynelių dalys iki kai žvyneliai prasiskyrę ir matomos šviesiai žalios žiedpumpurio dalys (BBCH 51-53).

Purkšti ne daugiau kaip 4 kartus, neviršyti 40 g/100 m² vario per metus.

Obelims, kriaušėms, paprastosioms cidonijoms, baltžiedėms šliandroms, japoninėms lokvoms

Norma: 12,5 g/100 m² lapų lajos ploto.

Saugo nuo obelių ir kriausių rauplių, paprastojo obelių vėžio.

Purkšti pirmą kartą, kai prasideda lapų kritimas iki 50 proc. lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę (BBCH 93-95), antrą kartą, kai apie 50 proc. lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę iki kai visi lapai nukritę (BBCH 95-97), trečią kartą, kai lapiniai pumpurai pastebimai išbrinkę, matomos šviesesnės pumpuro žvynelių vietos iki žvyneliai jau prasiskyrę ir matosi šviesiai žalios pumpuro dalys (BBCH 01-03), ketvirtą kartą, kai pumpurai dar uždari, matomos šviesiai rudos žvynelių dalys iki kai žvyneliai prasiskyrę ir matomos šviesiai žalios žiedpumpurio dalys (BBCH 51-53).

Purkšti ne daugiau kaip 4 kartus, neviršyti 40 g/100 m² vario per metus.

Agurkams, cukinijoms ir kornišonams auginamiems lauke

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Norma: 12,5 g/100 m².

Purkšti nuo visiškai išsiskleidusių skilčialapių iki visiško sunokimo (vaisiai yra tipiškos visiškai sunokusios spalvos) (BBCH 10-89), ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms, neviršyti 40 g/100 m² vario per metus.

arba

Norma: 25 g/100 m².

Purkšti nuo visiškai išsiskleidusių skilčialapių iki visiško sunokimo (vaisiai yra tipiškos visiškai sunokusios spalvos) (BBCH 10-89), ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms, neviršyti 40 g/100 m² vario per metus.

Agurkams, cukinijoms ir kornišonams auginamiems šiltnamyje.

Saugo nuo netikrosios miltligės.

Norma: 6,25 g/100 m².

Purkšti nuo visiškai išsiskleidusių skilčialapių iki visiško sunokimo (vaisiai yra tipiškos visiškai sunokusios spalvos) (BBCH 10-89), ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 3 dienoms, neviršyti 40 g/100 m² vario per metus.

Bulvėms.

Saugo nuo bulvių maro.

Norma: 12,5 g/100 m².

Purkšti nuo išsiskleidusio penkto lapelio ant pagrindinio stiebo (> 4 cm) iki uogos ant pagrindinio stiebo pirmosios kekės yra gelsvos arba rusvos (BBCH 15-85), ne daugiau kaip 8 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų, neviršyti $40 \text{ g}/100 \text{ m}^2$ vario per metus.
arba

Norma: $25 \text{ g}/100 \text{ m}^2$.

Purkšti nuo išsiskleidusio penkto lapelio ant pagrindinio stiebo (> 4 cm) iki uogos ant pagrindinio stiebo pirmosios kekės yra gelsvos arba rusvos (BBCH 15-85), ne daugiau kaip 4 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų, neviršyti $40 \text{ g}/100 \text{ m}^2$ vario per metus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis