

VITRA 40 WG

Fungicidas

Veiklioji medžiaga: vario hidroksidas (vario 400 g/kg 40 %) – 640 g/kg

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės (WG)

Sudėtyje yra dinatrio maleato.

VITRA 40 WG - kontaktinis fungicidas, turintis profilaktinį poveikį ir yra skirtas obelims, kriaušėms, paprastosioms cidonijoms, svarainiams, baltžiedėms šliandroms, japoninėms lokvoms, abrikosams, vyšnioms, persikams, nektarinams, slyvoms, agurkams ir kornišonams auginamiems lauke ir šiltnamiuose, cukinijoms auginamoms lauke ir šiltnamiuose bei bulvėms.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.



ATSARGIAI

Kenksminga prarijus.

Kenksminga įkvėpus.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Stengtis neįkvėpti dulkių rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra vario daugiau kaip 40 g/100 m² per metus.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotės: 0,1 kg, 0,2 kg, 0,25 kg, 0,5 kg

Registracijos Nr.: AS2-58F(2026)

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Industrias Químicas del Vallés, S.A. (IQV), Av. Rafael Casanova 81, 08100, Mollet del Vallès (Barcelona), Ispanija, tel.: +34 93 579 66 77, el. paštas: iqv@iqvagro.com.

Platintojas:

UAB „Agrimatco Vilnius“
Stasio Lozoraičio g. 19A, Garliava,
53228 Kauno raj., Lietuva
Tel. +370 614 53256

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Vitra 40 WG yra kontaktinis fungicidas ir baktericidas, kuris pasižymi apsauginiu poveikiu. Jis veikia išskirdamas vario jonus, kurie trikdo įvairius fermentinius procesus grybinių ir bakterinių patogenų ląstelėse, sutrikdo jų medžiagų apykaitą bei slopina sporų dygimą ir grybienos augimą. Produktas neturi sisteminio poveikio ir pasižymi tik prevenciniu (apsauginiu) veikimu.

NAUDOJIMAS

Abrikosai, slyvos, vyšnios, persikai ir nektarinai

Šratligė (Stigmata carpophila)

Rekomenduojama norma vienam naudojimui: 12,5 g/100 m² lapų lajos plotas

Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienos

Naudojimo laikotarpis:

Pirmas purškimas, kai pradeda kristi lapai iki kai apie 50% lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę (BBCH 93-95).

Antras purškimas, kai apie 50% lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę iki kai visi lapai nukritę (BBCH 95-97).

Trečias purškimas, kai lapiniai pumpurai pastebimai išbrinkę, matomos šviesesnės pumpuro žvynelių vietos iki žvyneliai jau prasiskyrę ir matosi šviesiai žalios pumpuro dalys (BBCH 01-03).

Ketvirtas purškimas, kai pumpurai dar uždari, matomos šviesiai rudos žvynelių dalys iki kai žvyneliai prasiskyrę ir matomos šviesiai žalios žiedpumpurio dalys (BBCH 51-53).

Rekomenduojamas vandens kiekis: **4-10 l/100 m²**

Rekomenduojamas purškimas: smulkiais lašeliais

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 4.

Didžiausia leistina metinė norma: VITRA 40 WG ir kitų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, naudojimo norma 100 m² ir auginimo sezonui neturi viršyti 40 g vario.

Obelys, kriaušės, paprastosios cidonijos, svarainiai, baltžiedės šliandros, japoninės lokvos
Obelių ir kriaušių rauplės (*Venturia inaequalis*, *Venturia pyrina*), paprastasis obelių vėžys (*Nectria galligena*)

Rekomenduojama norma vienam naudojimui: 12,5 g/100 m² lapų lajos plotas.

Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienos

Naudojimo laikotarpis:

Pirmas purškimas, kai pradeda kristi lapai iki kai apie 50% lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę (BBCH 93-95).

Antras purškimas, kai apie 50% lapų jau pakeitę spalvą arba nukritę iki kai visi lapai nukritę (BBCH 95-97).

Trečias purškimas, kai lapiniai pumpurai pastebimai išbrinkę, matomos šviesesnės pumpuro žvynelių vietos iki žvyneliai jau prasiskyrę ir matosi šviesiai žalios pumpuro dalys (BBCH 01-03).

Ketvirtas purškimas, kai pumpurai dar uždari, matomos šviesiai rudos žvynelių dalys iki kai žvyneliai prasiskyrę ir matomos šviesiai žalios žiedpumpurio dalys (BBCH 51-53).

Rekomenduojamas vandens kiekis : **10 l/100 m²**

Rekomenduojamas purškimas: smulkiais lašeliais

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 4

Didžiausia leistina metinė norma: VITRA 40 WG ir kitų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, naudojimo norma 100 m² ir auginimo sezonui neturi viršyti 40 g vario.

Agurkai, cukinijos ir kornišonai (auginami lauke)

Netikroji miltligė (*Pseudoperonospora cubensis*)

Rekomenduojama norma vienam naudojimui: 12,5 g/100 m²– 25 g/100 m² (0,25-0,3125%)

Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienos

Naudojimo laikotarpis: Naudokite produktą prevenciškai, nuo visiškai išsiskleidusių skilčialapių iki visiškai sunokimo (vaisiai yra tipiškos visiškai sunokusios spalvos) (BBCH 10-89)

Rekomenduojamas vandens kiekis (purškimo tūris): **4-10 l/100 m²**

Rekomenduojamas purškimas: smulkiais lašeliais

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 8, kai naudojama minimali 12,5 g/100 m² norma. Naudojant maksimalią, 25 g/100 m² normą, didžiausias purškimų skaičius - 4

Didžiausia leistina metinė norma: VITRA 40 WG ir kitų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, naudojimo norma 100 m² ir auginimo sezonui neturi viršyti 40 g vario.

Agurkai, cukinijos ir kornišonai (auginami šiltnamyje)

Netikroji miltligė (*Pseudoperonospora cubensis*)

Rekomenduojama norma vienam naudojimui: 6,25 g/100 m²

Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienos

Naudojimo laikotarpis: Naudokite produktą prevenciškai, nuo visiškai išsiskleidusių skilčialapių iki visiškai sunokimo (vaisiai yra tipiškos visiškai sunokusios spalvos) (BBCH 10-89)

Rekomenduojamas vandens kiekis: **4-10 l/100 m²**

Rekomenduojamas purškimas: smulkiais lašeliais

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 8.

Didžiausia leistina metinė norma: VITRA 40 WG ir kitų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, naudojimo norma 100 m² ir auginimo sezonui neturi viršyti 40 g vario.

Bulvės

Bulvių maras (*Phytophthora infestans*)

Rekomenduojama norma vienam naudojimui: 12,5 g/100 m² – 25 g/100 m² (0,25-0,3125%)

Intervalas tarp purškimų: mažiausiai 7 dienos

Naudojimo laikotarpis: Naudokite produktą prevenciškai, nuo išsiskleidusio penkto lapelio ant pagrindinio stiebo (> 4 cm) iki uogos ant pagrindinio stiebo pirmosios kekės yra gelsvos arba rusvos (BBCH 15-85)

Rekomenduojamas vandens kiekis: **4-10 l/100 m²**

Rekomenduojamas purškimas: smulkiais lašeliais

Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 8, kai naudojama minimali 12,5 g/100 m² norma. Naudojant maksimalią, 25 g/100 m² normą, didžiausias purškimų skaičius - 4

Didžiausia leistina metinė norma: VITRA 40 WG ir kitų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, naudojimo norma 100 m² ir auginimo sezonui neturi viršyti 40 g vario.

Intervalas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo dienos (karencijos laikotarpis)

Abrikosams, slyvoms, persikams ir nektarinams, vyšnioms (prieš žydėjimą) – netaikomas

Obuoliams, kriaušės paprastosioms cidonijoms, svarainiams, baltžiedėms šliandroms, japoninėms lokvoms (prieš žydėjimą) – netaikomas

Agurkams, cukinijoms (cukinijoms) ir kornišonams – 3 dienos

Bulvėms – 14 dienų

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Produkto veiklioji medžiaga vario hidroksidas pagal veikimo būdą priklauso kontaktiniams fungicidams, kurie suardo įvairius patogeninės ląstelės baltymus (FRAC kodas M 01). Patogenų atsparumo išsivystymo rizika variui vertinama kaip maža.

Neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų rasės, dėl ko efektyvumas gali sumažėti. Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo riziką, būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje.

Naudokite produktą pakaitomis su fungicidais, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų iš kitų cheminių grupių, turinčių skirtingą veikimo būdą.

Pastabos:

Naudokite pakankamai vandens, kad visiškai padengtumėte visas jautrias augalų dalis. Sureguliuokite vandens kiekį pagal pasėlių augimo tarpsnį ir lapijos vystymąsi.

Lietus arba drėkinimas per 2 valandas po panaudojimo gali sumažinti produkto veiksmingumą

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėmesio! VITRA 40 WG naudojimas lauko sąlygomis:

Apdorojant sodo augalus su susiformavusia tankia lapija, per vieną dieną žmogus gali nupurkšti ne didesnę kaip 10 arų plotą (1000 m²).

Dėmesio! VITRA 40 WG naudojimas šiltnamiuose

Apdorojant normalaus lapų tankumo aukštas daržoves ar aukštas ir žemas daržoves su susiformavusia tankia lapija, per vieną dieną žmogus gali nupurkšti ne didesnę kaip 10 arų plotą (1000 m²).

Eiti į apipurkštus plotus ir/ar dirbti, liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktu VITRA 40 WG apdorotus augalus galima tik jiems visiškai išdžiūvus.

Dėmesio! Per vieną dieną žmogus gali dirbti, liesti, imti rankomis VITRA 40 WG apdorotus augalus ne didesniame kaip 10 arų plote (1000 m²); rekomenduojama dirbti ne ilgiau kaip 2 val.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po naudojimo kruopščiai

nuplauti rankas, nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: EDTA, BAL arba penicilaminas. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Purškimo tirpalą ruoškite prieš pat naudojimą.

Prieš pradėdami ruošti purškiamą tirpalą, nustatykite tikslų reikalingą kiekį.

Supilkite išmatuotą produkto kiekį į pusiau užpildytą vandens purkštuvo baką. Ištuštintą produkto pakuotę tris kartus išskalaukite vandeniu, o skalavimo vandenį supilkite į purkštuvo baką su purškimo tirpalu, pripilkite vandens iki reikiamo kiekio ir gerai išmaišykite. Purškimo pauzės atveju, prieš tęsdami purškimą, purškimo tirpalą gerai išmaišykite purkštuvo bakelyje.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purkštuvą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti originalioje uždarytoje pakuotėje, vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, temperatūroje nuo 0 °C iki 40 °C, toliau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Laikyti vaikams, gyvūnams ir pašaliniais asmenims nepasiekiamoje vietoje.