



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKIMO NR. A1-784
“DĖL BIOLOGINIO FUNGICIDO *LALSTOP G46 WG* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2026 m. rugpjūčio 27 d. Nr. A1-546
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 51 straipsniu, bei atsižvelgdamas į Danstar Ferment AG 2026 m. gegužės 25 d. prašymą ir vertinimo ataskaitą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. A1-784 „Dėl biologinio fungicido *Lalstop G46 WG* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“: ir 1.5 papunktį išdėstau taip:

„1.5. Biologinis fungicidas naudojamas:

Braškėms auginamoms lauke ir tuneliuose.

Norma: 125–300 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti, kai dauguma žiedų su vainiklapiais suformuoja tuščiavidurį kamuolį, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 59–73), ne daugiau kaip 4 kartus.

Braškėms auginamoms šiltnamyje.

Norma: 0,01–0,1 g/m².

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo žiedų atsivėrimo, iki sėklos visiškai matomos ant žiedsosčio audinių (BBCH 60–73), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Moliūginėms daržovėms auginamoms šiltnamyje (agurkams, melionams, arbūzams, moliūgams, aguročiams, cukinijoms, patisonams, ilgmoliūgiams).

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 100–1000 g/ha.

Saugo nuo juodojo stiebo puvinio, pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

Agurkams auginamiems šiltnamyje.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Moliūgams auginamiems šiltnamyje.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Pomidorams auginamiems šiltnamyje.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 100–1000 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Paprikoms auginamoms šiltnamyje.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo diegavirtės, šaknų puvinio.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo diegavirtės, šaknų puvinys.

Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 100–1000 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki kol subręsta 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų įgauna būdingą spalvą, būna sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

Baklažanams auginamiems šiltnamyje.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo diegavirtės.

Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.

Salotoms auginamoms šiltnamyje.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinių.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinių.

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12) ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinių.

Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2–2,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinių.

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Dekoratyviniams augalams auginamiems šiltnamyje (augalams vazonuose, gėlėms auginamoms skynimui, auginiams ir svogūnėliams).

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinių.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų).

Saugo nuo puvinių.

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m².

Saugo nuo puvinių.

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinių.

Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,01–0,1 g/m².

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.

Agurkams, melionams, arbūzams, moliūgams, aguročiams, cukinijoms, patisonams, ilgmoliūgiams, pomidorams, baklažanams, saldžiosioms ir aitriosioms paprikoms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo šaknų puvinio.

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo šaknų puvinio.

Naudoti nuo trijų – penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki išsiskleidę devyni ar daugiau ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 4 kartus.

Baklažanams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 100–1000 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, juodojo stiebo puvinio..

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos. (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

Agurkams auginamiems lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 100 g / 30000–40000 daigų.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, juodojo stiebo puvinio.

Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 200–300 g/ha

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, juodojo stiebo puvinio.

Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą.

Melionams, moliūgams, aguročiams, cukinijoms, patisonams, ilgmoliūgiams auginamiems lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 200–300 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, juodojo stiebo puvinio.

Purkšti daigų persodinimo metu, kai išsiskleidę 3–5 lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 200–300 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio, juodojo stiebo puvinio.

Purkšti 3–4 savaitės po persodinimo, nuo tarpsnio kai išsiskleidę devyni ir daugiau lapų ant pagrindinio stiebo, iki matomas antras pirmos eilės šoninis ūglis (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 1 kartą.

Gūžinėms salotoms, romaninėms salotoms, cikorijoms, špinatams, lapiniams salierams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2–2,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 0,1–1 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 4 kartus.

Salotoms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpiant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sodinant vazone ar dirvoje, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 2–2,5 kg/ha.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 2–2,5 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingo gūžės dydžio, formos ir kietumo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 4 kartus.

Lapinėms salotoms, gūžinėms salotoms, romaninėms salotoms, cikorijoms, špinatams, lapiniams salierams auginamiems lauke *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,3–0,4 kg/ha

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 15–49), ne daugiau kaip 2 kartus.

Prieskoniniams augalams auginamiems šiltnamyje (vaistinėms šventagaršvėms, bazilikams, lauro lapams, kmynams, salierams, gysločiams, laiškiniams česnakams, kalendroms, krapams, pankoliams, vaistinėms gelsvėms, mairūnams, mėtoms, raudonėliams, petražolėms, rozmarinams, šalavijams, peletrūnams ir čiobreliams) *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų, 5 augalai/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo iki būdingos lapų masės susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 0,01–0,1 g/m².

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki subrendę 50 proc. vaisių arba 50 proc. sėklų būdingos spalvos, sausos ir kietos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

Dekoratyviniams augalams auginamiems šiltnamyje (augalams vazonuose, gėlėms auginamoms skynimui, auginiams ir svogūnėliams) *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti prieš sėją (BBCH 00), įterpant į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: pagal vazono dydį (pvz. 0,5 l vazonui: 10–25 g/1000 augalų).

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų, 6–9 augalai/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo iki žydėjimo vidurio (BBCH 13–65), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti prieš auginių arba svogūnėlių sodinimą arba persodinimą, nuo sėklaskilčių išsiskleidimo iki penkių matomų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

Braškėms auginamoms lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, kai išsiskleidę 9 ir daugiau lapų (BBCH 13–19), ne daugiau kaip 2 kartus.

Braškėms ir avietėms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Rhizoctonia* spp.).

Naudoti prieš sodinant (BBCH 00), įterpiant į vazoną ar substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 50–100 g/10 m².

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Rhizoctonia* spp.).

Nuo tarpsnio, kai lapų viršūnėlės viršija žvynelius iki išsiskleidžia trečiasis lapas (BBCH 09–13), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Rhizoctonia* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki stolonų ir jaunų augalų vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Braškėms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 12,5 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų, vytulių (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų, vytulių (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų, vytulių (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki žydėjimo pradžios (BBCH 10–61) ne daugiau kaip 2 kartus.

Avietėms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 12,5 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti prieš sodinant (daigams iš padėklo), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 25–30 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti iš karto po sodinimo, nuo pirmojo lapo pasirodymo iki ūglių vystymosi pradžios (BBCH 10–31), ne daugiau kaip 2 kartus.

arba

Norma: 200–300 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo tarpsnio, kai daugelis lapų yra išsiskleidę iki uogų byrėjimo tarpsnio (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Gervuogėms auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Serbentams auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Gervuogėms ir avietėms auginamoms lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinį (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 25–30 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinį (*Phytophthora* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.

arba

Norma: 300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo pirmųjų žiedų atsivėrimo iki uogos pradeda kristi (BBCH 60–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šilauogėms auginamoms lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 25–40 g/1000 augalų.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti prieš pat sodinimą. Antras naudojimas praėjus 4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnio pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.

arba

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki daugelis uogų įgauna būdingą spalvą (BBCH 60–85), ne daugiau kaip 3 kartus.

Serbentams auginamiems lauke *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo žydėjimo pradžios iki visiško sužydėjimo (BBCH 60–65), ne daugiau kaip 3 kartus.

Spanguolėms auginamoms lauke *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.).
Naudoti šaknų mirkymui sodinimo metu, ne daugiau kaip 1–2 kartus.

arba

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo stiebo ir pašaknio puvinų (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti prieš pat sodinimą (BBCH 00). Antras naudojimas praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo ūglių vystymosi tarpsnių pradžios iki pabaigos (BBCH 31–39), ne daugiau kaip 2 kartus.

Gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, brokoliams, lapiniams kopūstams, briuseliniams kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių ant pagrindinio stiebo (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo puvinų, vytulių (*Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių ant pagrindinio stiebo, iki būdingos derlingųjų vegetatyvinių augalo dalių vystymosi pabaigos (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 0,1–1 kg/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki sėklos / vaisiai pilnai susiformuoja (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 4 kartus.

Gūžiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, brokoliams, lapiniams kopūstams, briuseliniams kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams auginamiems lauke *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 50–100 g/ 100 m².

Saugo nuo šaknų gumbo (*Plasmodiaphora brassicae*).

Naudoti prieš pat daigų persodinimą, nuo trijų lapelių iki penkių lapelių tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo šaknų gumbo (*Plasmodiaphora brassicae*).

Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po persodinimo (BBCH 19–22), ne daugiau kaip 2 kartus.

Svogūnams, porams, česnakams auginamiems lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo fuzarinio puvinio, svogūnų fuzariozės, kaklelio puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo arba persodinimo metu, nuo trečiojo iki penktojo matomo lapelio tarpsnio (BBCH 13–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 300–400 g/ha lauke, 200–300 g/ha tunelyje.

Saugo nuo fuzarinio puvinio, svogūnų fuzariozės, kaklelio puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo matomų devynių ir daugiau lapelių tarpsnio (BBCH 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, porams, česnakams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinių, vytulių (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti prieš sėją įterpiančią substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinių, vytulių (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo puvinių, vytulių (*Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Phytophthora* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki lapai visiškai sunyksta, ropelės visiškai sausos (svogūnams, česnakams) / būdingo stiebo dydžio susiformavimo (porams) (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Svogūnams, porams, česnakams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo fuzarinio puvinio, svogūnų fuzariozės, kaklelio puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui sodinimo, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: tunelyje ir šiltnamyje 200–300 g/ha.

Saugo nuo fuzarinio puvinio, svogūnų fuzariozės, kaklelio puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Naudoti praėjus 3–4 savaitėms po sodinimo, nuo lapo pagrindo storėjimo iki svogūnėlis ar stiebas pasiekia 50 % laukiamo dydžio (BBCH 41–45), ne daugiau kaip 1 kartą.

Lapkotiniams salierams, smidrams, pankoliams auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo fuzarinio puvinio, pilkojo (kekerinio) puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Naudoti šaknų mirkymui, sodinimo metu, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,01–0,1 g/m²

Saugo nuo fuzarinio puvinio, pilkojo (kekerinio) puvinio (*Fusarium* spp., *Botrytis* spp.).

Purkšti nuo penkių tikrųjų lapelių tarpsnio iki visiškos brandos (BBCH 15–85), ne daugiau kaip 4 kartus.

arba

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo puvinų, rizoktoniozės (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti prieš sėją, įterpianč į substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,5–1 g/m².

Saugo nuo puvinų, rizoktoniozės (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti nuo sudygimo iki išsiskleidusių dviejų pirmų lapelių (BBCH 09–12), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,05 % tirpalas.

Saugo nuo puvinų, rizoktoniozės (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti persodinimo metu, nuo sudygimo iki išsiskleidusių penkių lapelių (BBCH 10–15), ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 20–25 g/1000 augalų.

Saugo nuo puvinų, rizoktoniozės (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Naudoti po persodinimo, nuo matomų trijų lapelių, iki būdingo lapkočio dydžio susiformavimo (BBCH 13–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Cikorijoms (paprastoji trūkažolė, salotinė trūkažolė) auginamoms šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,4 g/l tirpalas.

Saugo nuo juodojo puvinio (*Thielaviopsis basicola*).

Naudoti po derliaus nuėmimo, prieš atželdinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 0,2–0,4 g tirpalas.

Saugo nuo juodojo puvinio (*Thielaviopsis basicola*).

Naudoti prieš augimo skatinimą, ne daugiau kaip 1 kartą.

Morkoms, šakniniams salierams, pastarnokams, šakninėms petražolėms auginamoms lauke *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo fuzariozės, rizoktoniozės (*Fusarium* spp., *Rhizoctonia* spp.).

Purkšti nuo sėjos iki išsiskleidusių devynių ir daugiau lapelių (BBCH 00–19), ne daugiau kaip 2 kartus.

Žaliosioms pupelėms auginamoms lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 300–400 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purkšti nuo trijų tikrųjų lapelių išsiskleidimo iki stiebo augimo tarpsnio pabaigos (BBCH 13–39), ne daugiau kaip 2 kartus.

Spygliuočių ir lapuočių medžių sėjiniukams auginamiems šiltnamiuose, lauke ir tuneliuose *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 20–50 g/m³.

Saugo nuo šaknų ir pašaknio puvinų (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp.).

Naudojama prieš sodinimą, įterpiant į dirvą / substratą, ne daugiau kaip 1 kartą.

arba

Norma: 50–100 g/100 m².

Saugo nuo šaknų ir pašaknio puvinų (*Pythium* spp., *Phytophthora* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp.).

Naudojama sodinimo metu, nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus.

arba

Norma: 300–500 g/ha.

Saugo nuo pilkojo (kekerinio) puvinio.

Purškiama nuo sudygimo iki ūglių vystymosi pabaigos (BBCH 10–39), ne daugiau kaip 5 kartus.

Obelims *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 100–1000 g/ha.

Saugo nuo obelių paprastojo vėžio (*Neonectria ditissima*).

Purškiama pavasarį, nuo ramybės periodo iki žalių lapų viršūnėlės viršija pumpurų žvynus (BBCH 00–09). Rudenį purškiama, kai 50 % lapų pakeitę spalvą iki ramybės pradžios (BBCH 95–99), ne daugiau kaip 2 kartus.

Cukinioms, moliūgams, arbūzams, baklažanams, paprikoms auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Salotinėms sultinėms, tabakui, petražolėms auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

Dekoratyviniams augalams (vazonuose auginamiems augalams, skinimui skirtoms gėlėms, auginiams ir svogūnėliams) auginamiems šiltnamyje *Lalstop G46 WG* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 125–250 g/ha.

Saugo nuo miltligės.

Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams (BBCH 15–89), ne daugiau kaip 16 kartų.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis