



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL FUNGICIDO *SILVIO* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2026 m. rugsėjo 1 d. Nr. A1-555
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsižvelgdamas į Albaugh TKI d.o.o. vardu pateiktą Manna Regulatory 2026 m. liepos 10 d. prašymą, *Silvio* ir *Euskatel* 2026 m. liepos 28 d. tapatumo vertinimo išvadas:

1. Į r e g i s t r u o j u fungicidą *Silvio*, Albaugh TKI d.o.o., profesionaliajam naudojimui iki 2027 m. kovo 31 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: protiokonazolas 250 g/l.

1.2. Fungicido forma: koncentruota emulsija.

1.3. Fungicidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sudirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Stengtis neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pasijutus blogai, skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Surinkti ištekęsias medžiagas.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias frazes:

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

20 procentų mišinio sudaro sudedamoji dalis, kurios ūmus toksiškumas įkvėpus nežinomas.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos ir naudoti dulksną mažinančią įrangą.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant javus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais žoliniais augalais.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, purškiant žieminį rapsus, jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną, iš kurios 10 metrų turi būti apželdinta daugiamečiais žoliniais augalais.

1.4. Pakuotės: 0,1 l, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l.

1.5. Fungicidas naudojamas:

Žieminiam ir vasariniams kviečiams.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, lapų septoriozės, varpų fuzariozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), nuo varpų fuzariozės purkšti nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 61 – 65) ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

arba

Norma: 0,6 l/ha.

Saugo nuo rudųjų rūdžių, geltonųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), ne daugiau kaip 2 kartus po 0,6 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam miežiui.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių, varpų fuzariozės, miltligės, stiebalūžės, tinkliškosios dryžligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61 – 65), nuo stiebalūžės purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki susiformuoja antras bamblys (BBCH 30 – 32), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

arba

Norma: 0,6 l/ha

Saugo rinchosporiozės, smulkiųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), ne daugiau kaip 2 kartus po 0,6 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

Žieminiam ir vasariniam kvietrugiam.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, lapų septoriozės, varpų fuzariozės, geltonųjų ir rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo vidurio (BBCH 61 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

arba

Norma: 0,6 l/ha

Saugo nuo rudųjų rūdžių ir geltonųjų rūdžių, miltligės, rinchosporiozės, lapų septoriozės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), ne daugiau kaip 2 kartus po 0,6 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

Žieminiam rugiui.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo miltligės, rinchosporiozės, varpų fuzariozės, rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), nuo varpų fuzariozės purkšti pasirodžius varpai iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

arba

Norma: 0,6 l/ha

Saugo nuo rudųjų rūdžių.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo vidurio (BBCH 30 – 65), ne daugiau kaip 2 kartus po 0,6 l/ha, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

Avižoms.

Norma: 0,8 l/ha.

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

arba

Naudojimo norma: 0,6 l/ha

Saugo nuo vainikuotųjų rūdžių, miltligės.

Purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30 – 69) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 35 dienoms.

Žieminiam rapsams.

Naudojimo norma: 0,7 l/ha

Saugo nuo baltojo puvinio, fomozės.

Purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki brendimo pradžios (BBCH 30 – 80) ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 56 dienoms.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis