



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BIOLOGINIO INSEKTICIDO *LEPINOX PLUS* ĮREGISTRAVIMO
PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI**

2026 m. rugpjūčio 26 d. Nr. A1-541
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais, 40 straipsnio 1 dalies b punktu, 2011 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, bei atsižvelgdamas į *Lepinox Plus* registracijos ataskaitos išvadas:

1. „Į r e g i s t r u o j u biologinį insekticidą *Lepinox Plus*, CBC (Europe) S.r.l., profesionaliajam naudojimui iki 2039 m. birželio 30 d.

1.1. Veiklioji medžiaga: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* štamai EG 2348 37,5 g/100 g.

1.2. Biologinio insekticido forma: šlampantys milteliai.

1.3. Biologinis insekticidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinis žodis nepriskiriamas.

1.3.2. Pavojingumo frazės nepriskiriamos.

1.3.3. Atsargumo frazės:

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido), kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiąsias frazes:

Sudėtyje yra *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* štamai EG 2348. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

1.4. Pakuotės: 0,5 kg, 1 kg.

1.5. Biologinis insekticidas naudojamas:

Šiltnamyje auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniam kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, kininiam kopūstams, ropiniam kopūstams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamiems brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniam kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniam kopūstams, kininiam kopūstams, ropiniam kopūstams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius baltukus, pelėdgalvius, kopūstines kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina kopūstinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki gūželė pasiekia tipiską dydį ir formą (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamoms salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms trūkažolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekia tipiską lapų masę (BBCH 11–49), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje sėklai auginamoms paprastosioms trūkažolėms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, špinatams, lapiniams burokėliams, mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms pupelėms, pupuolėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina gelsvapilkius saulinukus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamiems arbūzams, melionams, moliūgams, cukinijoms, agurkams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, gelsvapilkius saulinukus.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamiems pomidorams, baklažanams, saldžiosioms paprikoms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius, pomidorų pjautasparnes kandis.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

arba

Norma: 1,0–1,5 kg/ha.

Naikina gelsvapilkius saulinukus, kopūstinius pelėdgalvius, daržinius pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms braškėms.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

Šiltnamyje auginamoms gėlėms ir dekoratyviniams augalams.

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Naikina pelėdgalvius.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89), ne daugiau kaip 3 kartus.

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta

tvarka.

Direktorius

Simonas Pusvaškis