

LEPINOX® PLUS

BIOLOGINIS INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* štamai EG 2348: 37,5 g/100 g (37,5 %)

Aktyvumas: 32 000 IU T. ni/mg formulės.

Produkto forma: šlampo milteliai (WP)

LEPINOX® PLUS – biologinis insekticidas, skirtas kontroliuoti *Lepidoptera* drugių lervas šiltnamiuose auginamose kopūstinėse daržovėse (brokoliuose, gūžiniuose kopūstuose, savožiniuose kopūstuose, žiediniuose kopūstuose, briuselinuose kopūstuose, kininiuose kopūstuose, ropiniuose kopūstuose), lapinėse daržovėse ir prieskoniniuose augaluose (salotose, cikorinėse salotose, salotinėse sultenėse, sėjamosiose gražgarstėse, salotinėse trūkažolėse, paprastose trūkažolėse, špinatuose, lapiniuose burokėliuose ir mangolduose, lapiniuose salieruose, pankoliuose, petražolėse, laiškiniuose česnakuose, bazilikuose), pupelės ir pupuolės, melionuose, arbūzuose, moliūguose, cukinijose, agurkuose, pomidoruose, saldžiosiose paprikose, baklažanuose, braškėse, gėlėse ir dekoratyviniuose augaluose

LEPINOX® PLUS naudojimas išplėstas lauke auginamoms kopūstinėms daržovėms (brokoliams, gūžiniams kopūstams, savožiniams kopūstams, žiediniams kopūstams, briuselinams kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams), lapinėms daržovėms ir prieskoninėms žolėlėms (salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, salotinėms trūkažolėms, paprastosioms trūkažolėms, špinatams, lapiniams burokėliams ir mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams), melionams, arbūzams, moliūgams, cukinijoms, agurkams, pomidorams, saldžiosioms paprikoms, baklažanams, braškėms, gėlėms ir dekoratyviniams augalams, obelims, kriaušėms, svarainiams, persikams, abrikosams, slyvoms, vyšnioms, svogūnams, česnakams, kmynams ir šaltalankiams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Sudėtyje yra *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* štamai EG 2348. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti dulkių / rūko / garų / aerozolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido), kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

Pakuotės: 0,5 kg, 1 kg.

Registracijos Nr.: AS2-60BI(2026).

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: produktas stabilus 3 metus kambario temperatūroje (20 °C).

Registracijos savininkas:

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25

24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035 – 335313, Italija

el.paštas: infobiogard@cbceurope.it

Platintojas:

UAB Agrimatco Vilnius

S. Lozoraičio g. 19A

Garliava 53228, Kauno r.

Tel.: +370 37 552172

www.agrimatco.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

LEPINOX® PLUS – biologinis insekticidas, veikiantis *Lepidoptera* drugių lervas. Lervos turi praryti produktą, kad užsikrėstų: purkšti jaunas, besimaitinančias lervas, dar prieš atsirandant lapų pažeidimams.

Purkšti kai kenkėjai yra augalo išorėje, ir ankstyvose lervų stadijose (I–II).

Suvartojusios mirtiną LEPINOX® PLUS dozę, lervos nustoja maitintis, tačiau gali išlikti ant lapų dar kelias dienas prieš žūdamos. Mirštančios lervos juda lėtai, išbąla, susiriečia ir pajuoduoja.

Visiškas ir tolygus augalo padengimas yra būtinas gerai kenkėjų kontrolei.

NAUDOJIMAS

Kopūstai (brokoliai, gūžiniai, savojiniai, žiediniai, briuseliniai, kininiai, ropiniai) auginami šiltnamiuose ir lauke:

Kopūstinis baltukas (*Pieris brassicae*), pelėdgalviai (*Spodoptera sp.*), kopūstinė kandis (*Plutella xylostella*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Kopūstinis pelėdgalvis (*Mamestra brassicae*).

Norma: 1–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki pasiekiamas būdingas gūžės dydis, forma ir kietumas (BBCH 11–49).

Sėklai auginamiems kopūstams purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 500–1500 l/ha.

Lapinės daržovės ir švieži prieskoniniai augalai (salotos, cikorinės salotos, salotinės trūkažolės (*radicchio*), paprastosios trūkažolės, salotinės sultenės, sėjamosios gražgarstės, špinatai, lapiniai burokėliai, mangoldai, lapiniai salierai, pankoliai, petražolės, laiškiniai česnakai, bazilikai) auginami šiltnamiuose ir lauke:

Pelėdgalviai (*Spodoptera sp.*, *Helicoverpa armigera*, *Chrysodeixis chalcites*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki gūželė arba lapų masė pasiekia tipiską dydį ir formą arba tipiską lapų masę (BBCH 11–49).

Sėklai auginamoms lapinėms daržovėms arba prieskoninėms žolelėms purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 500–1000 l/ha.

Pupelės ir pupuolės auginamos šiltnamiuose:

Gelsvapilkis saulinukas (*Helicoverpa armigera*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 500–1000 l/ha.

Arbūzai, melionai, moliūgai, cukinijos, agurkai auginami šiltnamiuose ir lauke:

Pelėdgalviai (*Spodoptera sp.*, *Spodoptera exigua*), gelsvapilkis saulinukas (*Helicoverpa armigera*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Pomidorai, baklažanai, saldžioji paprika auginami šiltnamiuose ir lauke:

Pelėdgalviai (*Spodoptera sp.*, *Spodoptera exigua*), pomidorų pjautasparnė kandis (*Tuta absoluta*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Gelsvapilkis saulinukas (*Helicoverpa armigera*), kopūstinis pelėdgalvis (*Mamestra brassicae*), daržinis pelėdgalvis (*Lacanobia oleracea*).

Norma: 1–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.
Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 500–1500 l/ha.

Braškės auginamos šiltnamiuose ir lauke:

Pelėdgalviai (*Spodoptera sp.*)

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 500–1500 l/ha.

Gėlės ir dekoratyviniai augalai auginami šiltnamiuose ir lauke:

Pelėdgalviai (*Noctuidae sp.*)

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Obelys, kriaušės, svarainiai auginami lauke:

Lapsukiai (*Argyrotaenia spp.*, *Pandemis spp.*, *Archips podana*, *Adoxophyes orana*), sodinis šepetinukas (*Orgyia antiqua*), svarainių kandis (*Euzophera bigella*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Persikai, nektarinai, abrikosai, slyvos, vyšnios auginami lauke:

Vaisinė kandis (*Cydia molesta*), persikinis ūgliagraužis (*Anarsia lineatella*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Svogūnai, česnakai auginami lauke:

Svogūninė kandis (*Acrolepiopsis assectella*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki 50 proc. augalų lapų nulinkę (česnakų BBCH 11–48, svogūnų BBCH 11–49).

Sėklai auginamiems svogūnams ar česnakams purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Kmynai auginami lauke:

Kmyninė kandis (*Depressaria nervosa*)

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki visi augalai pasiekia brandą (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Šaltalankiai auginami lauke:

Šaltalankinė kandis (*Gelechia hippophaella*), neporinis verpikas (*Lymantria dispar*).

Norma: 0,75–1,5 kg/ha.

Purkšti pasirodžius kenkėjams, nuo tikrųjų lapelių augimo pradžios iki uogų auginimo pabaigos (BBCH 11–89).

Didžiausias purškimų skaičius: 3 kartai per sezoną.

Intervalas tarp purškimų: išlaikyti minimalų 7 dienų intervalą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 2 dienos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 600–1500 l/ha.

Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius draudžiama purkšti žydinčius augalus nuo 4 val. iki 21 val.

FITOTOKSIŠKUMAS

Esant įprastoms naudojimo sąlygoms, produktas nėra fitotoksiškas.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

Naudojimas kopūstinėms daržovėms (brokoliams, gūžiniams kopūstams, savojiniais kopūstams, žiediniams kopūstams, briuseliniais kopūstams, kininiams kopūstams, ropiniams kopūstams) auginamiems lauke, lapinėms daržovėms ir prieskoninėms žolelėms (salotoms, cikorinėms salotoms, salotinėms sultenėms, sėjamosioms gražgarstėms, salotinėms trūkažolėms, paprastosioms trūkažolėms, špinatams, lapiniams burokėliams ir mangoldams, lapiniams salierams, pankoliams, petražolėms, laiškiniams česnakams, bazilikams) auginamiems lauke, melionams, arbūzams, moliūgams, cukinijoms, agurkams auginamiems lauke, pomidorams, saldžiosioms paprikoms, baklažanams auginamiems lauke, braškėms auginamoms lauke, gėlėms ir dekoratyviniams augalams auginamiems lauke, obelims, kriaušėms, svarainiams, persikams, nektarinams, abrikosams, slyvoms, vyšnioms, svogūnams, česnakams, kmynams, šaltalankiams auginamiems lauke išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

MAIŠYMAS

Nemaišyti su šarminiais produktais, tokiais kaip bordo mišinys, kalcio polisulfidas ir pan.

Dėl nepatikrintų produktų suderinamumo – pasitarti su gamintoju.

Maišant su kitais produktais, laikytis ilgiausio laukimo termino. Taip pat laikytis labiausiai pavojingų produktų atsargumo taisyklių.

LEPINOX® PLUS mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Veiklioji medžiaga *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* yra bakterija, kuri pagal IRAC klasifikavimą priskiriama 11A grupei. Atsparumo išsivystymo rizika šiam insekticidui yra vertinama kaip maža. Šiuo metu Europoje nėra žinoma *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* atsparumo išsivystymo atvejų.

Siekiant išlaikyti produkto efektyvumą ir sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, rekomenduojama naudoti LEPINOX® PLUS integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) programoje, purkšti etiketėje nurodytu laiku ir normomis, neviršijant maksimalaus purškimų skaičiaus.

Naujausios informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo ($\geq 0,4 \text{ mm}$) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Purškiant lauko/sodo purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas $\geq 300 \text{ g/m}^2$) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas $\geq 245 \text{ g/m}^2$) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). Esant pavojui įkvėpti rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones, filtruojamąsias puskaukes nuo kietų dalelių ir skystinių aerozolių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba puskaukes/ketvirtines kaukes, atitinkančias standartą LST EN 140, su dalelių filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 143).

LEPINOX® PLUS naudojimas šiltnamiuose:

- **kai operatorius purškimo metu techniškai gali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:**

Saugos priemonės operatoriams ir darbuotojams tokios pačios kaip ir lauko sąlygomis.

- **kai operatorius, susiformavus tankiai augalų lapijai, purškimo metu techniškai negali išvengti sąlyčio su apdorota augalų lapija:** Purškiant rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina

dėvėti neperšlampamą ir cheminėms medžiagoms atsparų vientisą kombinezoną arba dviejų dalių kostiumą, užtikrinantį ne mažesnę apsaugą nei 3 tipo apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų (atitinkanti standartą LST EN 14605). Būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į lauką apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. **Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į šiltnamyje apdorotus plotus**, galima įeiti po 1 paros ir tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus ir būtina dėvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai, purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos. Purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

PURŠKIMO TECHNIKA IR PURŠKIMAS

LEPINOX® PLUS galima purkšti sodo, įprastais purkštuvais, kurie paskirsto pakankamai tirpalo, kad būtų visiškai padengtos užkrėstos augalų dalys. Kai kurioms kultūroms gali reikėti dvisraučių purkštukų. Naudoti įrangą su tūriniais siurbliais ir paskirstyti vidutinius–didesnius vandens kiekius. Naudoti įrangą ir vandens kiekius, užtikrinančius optimalų užkrėstų augalo dalių sudrėkinimą. Visiškas padengimas – būtinas veiksmingumui.

Vengti vandens, kurio pH didesnis nei 8; kitu atveju naudoti rūgštinantį priedą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį.

Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį LEPINOX® PLUS ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvą turi būti įjungtas.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje užrakintoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Kambario temperatūroje (20 °C) produktas išlieka stabilus 3 metus.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.

LEPINOX® PLUS yra registruotas CBC (Europe) S.r.l. prekės ženklas.