



**VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2026 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-558 „DĖL
INSEKTICIDO *ACEPTIR 200 SE* ĮREGISTRAVIMO PROFESIONALIAJAM
NAUDOJIMUI“ PAKAITIMO**

2026 m. spalio 14 d. Nr. A1-632
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bei atsižvelgdamas į Innvigo Sp. z o.o. 2026 m. spalio 12 d. prašymą:

1. P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2026 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. A1-558 „Dėl insekticido *Aceptir 200 SE* įregistravimo profesionaliajam naudojimui“ ir 1.3 bei 1.5 papunkčius išdėstau taip:

„1.3. Insekticidas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, klasifikuojamas ir ženklinamas jam priskiriant:

1.3.1. Signalinį žodį „Atsargiai“.

1.3.2. Pavojingumo frazes:

Kenksminga prarijus.

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

1.3.3. Atsargumo frazes:

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti veido apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

1.3.4. Papildomas ir specialiasias frazes:

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke, auginant žieminius rapsus, žieminius kviečius, kanapes, linus, svogūnus, česnakus, baltagūžius kopūstus, šaknines daržoves, uogas ir vaiskrūmius.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra acetamiprido, dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke, auginant vaismedžius, dekoratyvinius augalus ir miško sodinukus.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių yra didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais, kai purškiami vaismedžiai, dekoratyviniai ir miško augalai, tabakas, žieminiai kviečiai, vasariniai rugiai, vynuogės, uoginiai augalai aukštesni nei 50 centimetrų, vaiskrūmiai ir medžiai su valgomomis uogomis.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 90 proc. dulksną mažinančią įrangą, kai purškiami vaismedžiai, dekoratyviniai ir miško augalai, tabakas.

Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną ir naudoti 50 proc. dulksną mažinančią įrangą, arba išlaikyti 3 metrų apsaugos zoną ir naudoti 75 proc. dulksną mažinančią įrangą, kai purškiami vynuogės, uoginiai augalai aukštesni nei 50 centimetrų, vaiskrūmiai ir medžiai su valgomomis uogomis.

1.5. Insekticidas naudojamas:

Bulvėms.

Norma: 0,1 – 0,15 l/ha.

Saugo nuo kolorado vabalų ir jų lervų.

Purkšti pavasarį – vasarą, išplitus kenkėjams, kai tarpuvagiuose lapais susidengia 50 proc. augalų iki visiško žydėjimo tarpsnio (BBCH 35 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,25 l/ha + 0,1 l/ha „Asystent“.

Saugo nuo kopūstinių amarų, rapsinių pjūklelių, rapsinių spragių, kopūstinių musių.

Purkšti rudenį, 1 – 7 lapelių tarpsnyje (BBCH 10 – 17), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 39 dienoms.

Pastaba. Produktą rekomenduojama naudoti su paviršiaus aktyviaja medžiaga Asystent+.

arba

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,12 – 0,25 l/ha.

Saugo nuo rapsinių žiedinukų.

Purkšti pavasarį, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau dar neišsiskleidę iki visiško žydėjimo tarpsnio (BBCH 55 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 39 dienoms.

arba

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,12 – 0,25 l/ha.

Saugo nuo ankštarinių paslėptastraublių ir ankštarinių gumbauodžių.

Purkšti pavasarį, žydėjimo tarpsnyje, kai 20 proc. žiedų žydi ant pagrindinio stiebo iki žydėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH 62 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 39 dienoms.

arba

Žieminiam rapsams.

Norma: 0,12 – 0,25 l/ha.

Saugo nuo kopūstinių paslėptastraublių.

Purkšti pavasarį, kai pagrindinio žiedyno butonai išsiskirstę, tačiau dar neišsiskleidę iki tada, kai žydėjimas baigiasi, dauguma žiedlapių krenta (BBCH 55 – 67), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 39 dienoms.

Obelims.

Norma: 0,125 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti išplitus kenkėjams, nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių užsimezgimo pradžios, kai vaisiai padidėja iki 10 mm, dalis vaisių po žydėjimo krenta (BBCH 69 – 71), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

arba

Obelims.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo obuolinių vaisėdžių.

Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vystymosi, kai vaisių diametras padidėja iki 40 mm, vaisius status (T – stadija) (BBCH 69–74), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau kaip 14 dienų.

Žieminiam kviečiams.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti rudenį, nuo 3 lapelių iki krūmijimosi tarpsnio pradžios (matomas pirmas šoninis ūglis) (BBCH 13 – 21), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 30 dienų.

arba

Žieminiam kviečiams.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo raudonkrūčių lelių, javinių amarų.

Purkšti pavasarį – vasarą, nuo plaukėjimo pradžios iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 51 – 77), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 30 dienų.

Vasariniams rugiams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti pavasarį, nuo plaukėjimo pradžios iki vėlyvosios pieninės brandos tarpsnio (BBCH 51 – 77), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 30 dienų.

Lėšiams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo daiginių žiedenių, daiginių muselių, amarų, pupinių grūdinukų.

Purkšti nuo tarpsnio, kai nėra šoninių ūglių, iki tarpsnio, kai matomi 9 ar daugiau tarpubamblių (BBCH 20 – 39), arba nuo tarpsnio, kai matomi pirmieji žiedlapiai ir daugelis atskirų žiedpumpurių dar neužsimezgę iki tarpsnio, kai beveik visos ankštys tamsios, o sėklos sausos ir kietos (BBCH 50 – 89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 10 dienų.

Pupelėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo daiginių žiedenių, daiginių muselių, žirinių tripsų, tabakinių tripsų, grūdinukų, žolblakių, amarų.

Purkšti nuo tarpsnio, kai nėra šoninių ūglių, iki tarpsnio, kai matomi 9 ar daugiau tarpubamblių (BBCH 20 – 39), arba nuo tarpsnio, kai matomi pirmieji žiedlapiai ir daugelis atskirų žiedpumpurių dar neužsimezgę iki tarpsnio, kai beveik visos ankštys tamsios, o sėklos sausos ir kietos (BBCH 50 – 89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 10 dienų.

Lubinams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo sitonų, amarų, tripsų, įvairiaspalvių žolblakių, žirinių vaisėdžių.

Purkšti nuo skrotelių vystymosi pradžios iki ūglių vystymosi (ilgėjimo) pabaigos (BBCH 20 – 39) arba nuo žiedyno vystymosi pradžios, kol 75 proc. ankščių pasiekia tipiską ilgį (BBCH 50 – 79), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 10 dienų.

Vyšnioms, trešnėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,125 l/ha.

Saugo nuo vyšninių musių, amarų.

Purkšti, nuo tada kai vaisiai pasiekia 90 proc. įprasto dydžio iki nokimo pradžios, vaisiaus nusispalvinimo pradžia (BBCH 79 – 81), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Kriaušėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,125 – 0,2 l/ha.

Saugo nuo žaliųjų ir pilkųjų obelinių amarų.

Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vartojimo brandos (BBCH 69 – 87), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Slyvoms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,125 – 0,2 l/ha.

Saugo nuo amarų, obuolinių vaisėdžių, slyvinių pjūklelių, serbentinių skydamarių.

Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę) iki vaisių vartojimo brandos (vaisius turi būdingą skonį ir tvirtumą) (BBCH 69 – 89), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Baltažiedėms šliandroms, paprastosioms cidonijoms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo amarų.

Purkšti nuo žydėjimo tarpsnio pabaigos (visi vainiklapiai nukritę), iki kai vaisių diametras padidėja iki 40 mm, vaisius status (T – stadija) (BBCH 69 – 74), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Vynmedžiams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo gluosninių pandemių, tinkliškųjų adoksofijų, lapsukių, amarų, sodinių grambuolėlių – grikinukų.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki visiško žydėjimo tarpsnio (50 proc. žiedų išsiskleidę) (BBCH 51 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Gervuogėms, avietėms, ilgosioms gervuogėms, aviečių ir gervuogių hibridams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo tinkliškųjų adoksofijų, lapsukių, amarų, avietinių purpurinių kandžių, avietinių žiedgraužių, paprastųjų avietinukų, avietinių ūglinių gumbauodžių.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki visiško žydėjimo tarpsnio (50 proc. žiedų išsiskleidę) (BBCH 51 – 65), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Avietėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo avietinių stiklasparnių.

Purkšti augalus ir po jais esančią dirvą nuėmus derlių (BBCH > 89), ne daugiau kaip 1 kartą.

Šilauogėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,15 l/ha.

Saugo nuo gluosninių pandemių, tinkliškųjų adoksofijų, lapsukių, amarų, sodinių grambuoliukų, šilauoginių gumbauodžių.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios (pasirodo pirmieji žiedpumpuriai) iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Braškėms, žemuogėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,15 l/ha.

Saugo nuo braškinių amarų, žolblakių, avietinių žiedgraužių, sodinių grambuoliukų, žemuoginių ir braškinių lapsukių, tripsų.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Braškėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,15 l/ha.

Saugo nuo pjovėjų, tripsų.

Purkšti augalus ir po jais esančią dirvą nuėmus derlių (BBCH > 89), ne daugiau kaip 1 kartą.

Aronijoms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo liucerninių pjovėjų, vynuoginių pjovėjų, lapsukių, amarų, sodinių grambuoliukų, rožinių tripsų.

Purkšti nuo žiedyno formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 7 dienoms.

Tabakui *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo tabakinių tripsų.

Purkšti nuo šoninių ūglių formavimosi ant pagrindinio ūglio pradžios iki 50 proc. sėklų dėžučių subrendę (BBCH 20 – 85), ne daugiau kaip 2 kartus.

Pluoštui auginamiems linams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,12 – 0,25 l/ha.

Saugo nuo amarų, melsvųjų ir juodųjų spragių.

Purkšti nuo tarpsnio, kai susiformuoja 50 proc. žiedinių pumpurų iki žydėjimo pabaigos (BBCH 55 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą.

Pluoštui auginamoms kanapėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,12 – 0,25 l/ha.

Saugo nuo amarų, melsvųjų ir juodųjų spragių.

Purkšti nuo tarpsnio, kai susiformuoja 50 proc. žiedinių pumpurų iki žydėjimo pabaigos (BBCH 55 – 69), ne daugiau kaip 1 kartą.

Svogūnams, askaloniniams česnakams, česnakams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo svogūninių vakarinių paslėptastraublių, svogūninių kandžių, tripsų, daiginių muselių, daiginių žiedenių, svogūninių musių, amarų.

Purkšti nuo lapų vystymosi pradžios, bet ne vėliau kaip iki derlingųjų vegetatyvinių dalių vystymosi pradžios (BBCH 10 – 39), ne daugiau kaip 1 kartą iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 14 dienų.

Baltagūžiams kopūstams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo spragių, kopūstinių paslėptastraublių, rapsinių paslėptastraublių, rapsinių pjūklelių, tripsų, kopūstinių musių, amarų.

Purkšti nuo galutinio lapų vystymosi tarpsnio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki gūžių formavimosi pradžios (BBCH 20 – 39), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 27 dienoms.

Pašariniams runkeliams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo skersadryžių runkelinių straubliukų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Burokėliams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo runkelinių spragių, runkelinių daigagraužių, amarų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Gumbiniams salierams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo kopūstinių baltukų, ropinių baltukų, gaminių žvilgūnų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, salierinių minamusių, morkinių musių, žolblakių, stepinių dykrinukų, afrikinių dykrinukų, amarų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Valgomiesiems krienams *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo kopūstinių baltukų, ropinių baltukų, gaminių žvilgūnų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, krieninių kopūstinukių, kryžmažiedžių spragių, lenktajuosčių kopūstinukių, juodųjų ir melsvųjų kopūstinukių, amarų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Griežčiams, ropėms *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo kopūstinių baltukų, ropinių baltukų, gaminių žvilgūnų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, kopūstinukių, amarų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Cikorijoms (šakninėms) *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,25 l/ha.

Saugo nuo gaminių žvilgūnų, kopūstinių pelėdgalvių, amarų.

Purkšti nuo antrojo lapo tarpsnio iki devintojo lapo tarpsnio (BBCH 12 – 19), ne daugiau kaip 1 kartą.

Baklažanams (auginamiems šiltnamiuose) *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,24 – 0,3 l/ha.

Saugo nuo baltasparnių, tabakinių tripsų, vakarinių tripsų, minamusių, amarų, žolblakių, spragių.

Purkšti nuo tada kai išsiskleidžia pirmasis tikrasis lapelis ant pagrindinio stiebo iki tada kai visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 11 – 89), ne daugiau kaip 1 kartą, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 3 dienoms.

arba

Norma: 0,12 – 0,2 l/ha.

Saugo nuo baltasparnių, tabakinių tripsų, vakarinių tripsų, minamusių, amarų, žolblakių, spragių.

Purkšti nuo tada kai išsiskleidžia pirmasis tikrasis lapelis ant pagrindinio stiebo iki tada kai visi vaisiai yra tipiškos spalvos (BBCH 11 – 89), ne daugiau kaip 2 kartus, iki derliaus nuėmimo likus ne mažiau nei 3 dienoms.

Dekoratyviniams augalams ir miško sodinukams, miško medžių atnaujinimui, įmišrinimui *Aceptir 200 SE* registruotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsnį.

Norma: 0,2 l/ha.

Saugo nuo amarų, podūrų, maumedinių makštikandžių.

Purkšti nuo pirmųjų lapelių atsiradimo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 11 – 69), ne daugiau kaip 2 kartus.“

2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktorius

Simonas Pusvaškis