Telaron Boost

FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: boskalidas 350 g/kg (35 %), protiokonazolas 200 g/kg (20 %).
Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Telaron Boost – fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio (*Sclerotinia sclerotiorum*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Smarkiai pažeidžia akis
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
13,5 proc. mišinio sudaro medžiagos, kurių ūmus toksiškumas susilietus su oda nežinomas.
Sudėtyje yra sieros rūgšties mono-C12–18-alkilesterių natrio druskų.
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrių / kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai purkšdami lauko purkštuvais, privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112.

Pakuotės: 2,5 kg, 10 kg.
Registracijos numeris: AS2-69F(2026).
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.

Registracijos savininkas:
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Claudius Prinsenlaan 144 A 4818 CP,
Breda, NOORD-BRABANT,
Nyderlandai

Platintojai:

UAB Scandagra
Veiverių g. 139, LT- 46389 Kaunas
Tel.: +370 37 395511
El. paštas info@scandagra.lt

AB Linas Agro
Brastos g. 14, LT-47185 Kaunas
Tel.: +370 45 507 333
El. paštas info@linasagro.lt

UAB Baltic Agro
Ukmergės g. 322, LT-12106 Vilnius
Tel.: +370 5 2701187
El.paštas: biuras@balticagro.lt

UAB Agrokoncernas
Vėrupės g. 1, Babtų k., LT-54328 Kauno r.
Tel.: +370 37 490490
El. paštas: info@agrokoncernas.lt

UAB Agrodema
Dainavos g. 5-40, LT-01400 Vilnius
Tel.: +370 5 2402291
El. paštas: info@agrodema.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant ir saugant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

VEIKIMO BŪDAS

Fungicido Telaron Boost sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos boskalidas ir protiokonazolas. **Boskalidas** augale juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys. Pagal veikimo būdą boskalidas skiriasi nuo strobilurinų ir triazolų. Jis sustabdo energetinių resursų gamybą ir taip blokuoja patogeninių grybų augimą ir taip pat neleidžia vykti kitų svarbių ląstelių dalių cheminei sintezei.
Protiokonazolas yra ilgo veikimo sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Pagal veikimo būdą jis yra demetilinimo inhibitorius (DMI). Šį veikimo būdą turinčios veikliosios medžiagos blokuoja sterolių biosintezę grybo ląstelių membranose. Po apdorojimo jis patenka į audinius ir tolygiai pasiskirsto augale.

NAUDOJIMAS

Žemės ūkio augalai	Ligos	Produkto norma l/ha	Vandens kiekis l/ha	Purškimo laikas	Didžiausias purškimų skaičius	Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo
Žieminiai ir vasariniai rapsai	Baltasis (sklerotinis) puvinys (*Sclerotinia sclerotiorum*)	0,35-0,7 kg/ha	100 – 400	Purkšti vieną kartą nuo žydėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 61-69) *arba* purkšti du kartus nuo žydėjimo pradžios iki 30% ankštarų išsivysčiusios (BBCH 61-73)	2 (išlaikant minimalų 14 dienų intervalą tarp purškimų)	35 dienos

***Pastaba*.** Mažesnę Telaron Boost normą rekomenduojama naudoti pastebėjus pirmuosius ligos požymius arba kai aplinkos sąlygos yra mažiau palankios ligos plitimui.

Dėmesio! Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius draudžiama purkšti vasarinius ir žieminius rapsus nuo 4 val. iki 21 val.

SĖJOMAINA

Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Fungicido Telaron Boost sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos boskalidas ir protiokonazolas. Boskalidas priklauso sukcinatų dehidrogenazės inhibitorių (SDHI) grupei (FRAC kodas 7). Protiokonazolas priklauso triazolų cheminei grupei (FRAC kodas 3).

Vertinant patogenų ir agronominius rizikos veiksnius kartu, laikoma, kad bendroji atsparumo susidarymo rizika naudojant veikliąsias medžiagas yra maža ir priimtina, jei produktas naudojamas laikantis gerosios žemės ūkio praktikos ir etiketėje pateiktų rekomendacijų.

Siekiant sumažinti ligų atsparumo produktui išsivystymo riziką, rekomenduojama laikytis FRAC rekomendacijų:

- purkšti tik tada, kai manoma, kad tai būtina, remiantis klimato ir pasėlių sąlygomis, lauko stebėjimais ir sprendimų palaikymo sistemomis;
- produktą naudokite pagal rekomendacijas, t.y nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku ir nepurkškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje;
- SDHI fungicidų produktų panaudojimų skaičius bendroje purškimo programoje turi būti ribotas;
- purkškite produktą profilaktiškai arba ankstyvosiose ligos vystymosi tarpsniuose, pagal gamintojo rekomendacijas;
- tvarkyti išsamius lauko įrašus, kad būtų žinoma pasėlių ir fungicidų naudojimo istorija;
- siekiant išvengti atsparumo išsivystymo populiacijose naudoti skirtingą veikimo būdą turinčius mišinius;
- taikykite integruotąją kenksmingųjų organizmų kontrolės sistemą: rinkitės atsparesnes ligai veisles, ypač ankstyvojoje sėjoje, sumažinkite ražienų kiekį ant dirvos paviršiaus, kad būtų

apribotas ligų užkrėtimas, sėjomaina, ražienų skutimas ir rudeninis gilus arimas, dirvos purenimas, optimalus sėjos laikas, subalansuotas tręšimas, dirvos kalkinimas;
- nepaisant tinkamų valdymo strategijų, neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą Telaron Boost, gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų padermės.

Visada naudokitės FRAC (www.frac.info) naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/ platintoją.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 4 m/s. Jei naudojama augalų apsaugos produktų apdorojimo įranga, kurios technologija sumažina purškimo dulksną, tai vėjo greitis turi būti ne didesnis kaip 5 m/s.

SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m^2) bei avėti tvirtą avalynę. Apsauginės aprangos C1 lygio veiksmingumo reikalavimus LST EN ISO 27065 atitinkanti apranga yra lygiavertė darbo drabužiams. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės, atitinkančias standartą EN 374): pvz., butadiennitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).
Purškiant lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas ≥300 g/m^2) arba medvilninio ir poliesterio audinio, kuriame yra ne mažiau kaip 65% poliesterio (tankumas ≥245 g/m^2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
Darbuotojams, kurie darbo tikslais eina į apdorotus plotus, galima įeiti tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
DĖMESIO! Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus, operatoriai purkšdami lauko purkštuvais, privalo naudoti ne mažiau kaip 50 proc. dulksną mažinančius purkštukus ir privalo laikytis ne mažesnės kaip 10 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.
Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Informacija apsinuodijimo atveju +370 52 362 052.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Reikalingas vandens kiekis tirpalo ruošimui yra 100 – 400 l/ha. Niekada neruoškite tirpalo daugiau nei reikia. Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį.
Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, purkštuvo talpą tris ketvirtadalius pripildyti švariu vandeniu. Įjungti maišytuvą. Kad produktas gerai susimaišytų, prieš atidarydami indą kelis kartus apverskite. Į purkštuvo baką įpilkite reikiamą kiekį Telaron Boost. Į purkštuvą supilti likusį vandens kiekį. Paruoštą tirpalą nepertraukiamai maišant išpurkšti nedelsiant.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai. Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus reikalavimus.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo užšalimo. Taip pat laikytis kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.