

Titus 25 DF naudojimo rekomendacijos šilauogių pokrūmiams

Šilauogių pokrūmiams (*Titus 25 DF* registruotas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1381, 51 straipsnį). Gamintojas neatsako už produkto veiksmingumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

| Panaudojimas | Laikas / Augimo fazė | Veiklioji medžiaga | Produkto pavadinimas | Norma |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Purkšti šilauogių pokrūmius iki pilno žydėjimo tarpsnio (BBCH 65), apsaugant žaliąsias šilauogių dalis, užtikrinant, kad uogos būtų skinamos, o ne renkamos nuo žemės – 1 kartą 0,05 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, varpučiai – 10–15 cm aukščio; | Rimsulfuronas 250 g/kg | <i>Titus 25 DF</i> | 0,05 kg/ha |
| 2 | Purkšti šilauogių pokrūmius iki pilno žydėjimo tarpsnio (BBCH 65), apsaugant žaliąsias šilauogių dalis, užtikrinant, kad uogos būtų skinamos, o ne renkamos nuo žemės, per 2 kartus po 0,025 kg/ha + 200 ml/ha paviršiaus aktyviosios medžiagos Trend, pirmą kartą, kai dviskiltės piktžolės yra nuo skilčialapių iki 2–4 lapelių tarpsnio, antrą kartą – po 7–10 dienų. | Rimsulfuronas 250 g/kg | <i>Titus 25 DF</i> | 0,025 kg/ha |

Jautrios piktžolēs

- žalioji šerytė (*Setaria viridis*),
- vienmetė miglė (*Poa annua*),
- paprastoji rietmenė (*Echinochloa crus-galli*),
- daržinė žliūgė (*Stellaria media*),
- vaistinė ramunė (*Matricaria recutita*),
- bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum perforatum*),
- kibasis lipikas (*Galium aparine*),
- rapsas (*Brassica napus*),
- aklės (*Galeopsis sp.*)